ISSN: 1693-7368
ISSN elektronik: 1907-9281

JURNAL PENELITIAN

BIDANG ILMU PERTANIAN

Volume 7, Nomor 2, Agustus 2009

BIDANG ILMU PERTANIAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH-I
(NAD-SUMATERA UTARA)

JURNAL PENELITIAN BIDANG ILMU PERTANIAN

Volume 7, Nomor 2, Agustus 2009

ISSN: 1693-7368

ISSN elektronik: 1907-9281

<http://www.geocities.com/jurnalpend>

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Tanggap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Cabai (<i>Capsicum annuum</i> L.) Organik terhadap Pemberian Bokashi dan Pupuk Organik Cair <i>Nini Rahmawati</i>	81
Pemanfaatan Fungi Mikoriza Arbuskula dalam Upaya Peningkatan Produksi Kedelai Organik <i>Yaya Hasanah</i>	85
Pertumbuhan Bibit Jeruk pada Perlakuan Varietas Batang Bawah dan Pemberian Mikoriza pada Tanah Andisol <i>Rosmalina Sinaga</i>	92
Pengaruh Pemberian Pupuk Pelengkap Cair Organik SPM terhadap Produksi Tanaman Kedelai (<i>Glycine max</i> L. Merr) <i>Elli Afrida</i>	98
Penengaruh Sistem Pertanian Organik pada Tanaman Padi Sawah terhadap Kesuburan Tanah dan Lingkungan <i>Emitha</i>	101
Preferensi dan Pengaruh Jenis Makanan terhadap Pertumbuhan Larva <i>Crocidolomia binotalis</i> Zell <i>Sulamo</i>	108
Studies on Calcium-Phosphate and Proximate Carcass Composition in Muscle, Bone, Scale and Gill Separately in Red Tilapia <i>Eriyusni</i>	112
Analisis Alih Fungsi Lahan dan Faktor-Faktor yang Menyebabkannya: Studi Kasus di Sumatera Utara <i>Riantri Barus</i>	117
Petunjuk Penulisan Naskah untuk Jurnal Penelitian Pertanian.....	128

PREFERENSI DAN PENGARUH JENIS MAKANAN TERHADAP PERTUMBUHAN LARVA *Crocidolomia binotalis* Zell

Sularno

Staf Pengajar FKIP-Biologi UISU Medan
e-mail: Svlarno@yahoo.co.id

ABSTRAK

Crocidolomia binotalis Zell., merupakan hama tanaman cruciferae. Ketertarikan hama ini pada cruciferae dapat disebabkan karena rangsangan nutritif maupun non nutritif. Pilihan inang akan menentukan pertumbuhan, perkembangan dan aktifitas normal hama. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 3 ulangan. Masing-masing perlakuan tersebut adalah Pemberian daun kubis berkrop (*B. oleracea* var. *capitata*), pemberian daun kubis bunga (*B. oleracea* var. *botrytis*) dan pemberian daun kubis China (*B. chinensis*) data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam dan dilakukan uji lanjut dengan DNMRT pada taraf nyata 5 %. Dari Penelitian ini menunjukkan bahwa *Crocidolomia binotalis* Zell. Mempunyai preferensi makanan yang lebih tinggi pada kubis bunga (*Brassica oleracea* var. *botrytis*), dari pada kubis krop (*Brassica oleracea* var. *capitata*) dan kubis china (*brassica chinensis*). Ketiga jenis daun tanaman kubis yang diberikan tidak menghambat pertumbuhan dan aktifitas normal dari larva *Crocidolomia binotalis* Zell Rata-rata luas daun yang dimakan oleh larva berpengaruh terhadap pertambahan berat rata-rata larva sedangkan rata-rata berat daun yang dikonsumsi tidak berkorelasi terhadap rata-rata pertambahan berat larva *C. binotalis* Zell.

Kata kunci: *Crocidolomia binotalis* Zell, Preferensi makanan, Pertumbuhan larva

1. PENDAHULUAN

Crocidolomia binotalis Zell., merupakan hama yang menyerang tanaman kubis dan kubis-kubisan lainnya. Memiliki kisaran inang yang luas diantaranya dapat menyerang sawi, kubis, petsai lobak dan nasturtium liar. Penyebaran serangga ini sangat luas meliputi benua Asia, Australia, Afrika dan Kepulauan Pasifik (Kalshoven, 1981).

Crocidolomia binotalis Zell. di Indonesia merupakan hama utama Cruciferae disamping *Plutella xylostella*, dan dapat dianggap kompleks hama *Plutella-crocidolomia*. Hal ini disebabkan karena dua jenis hama tersebut seringkali didapat saling bergantian menempati kedudukan sebagai hama utama (Sastrosiswojo dan Setiawan, 1991).

Ketertarikan *Crocidolomia binotalis* Zell. Pada tanaman Cruciferae dapat disebabkan pada dua hal yaitu karena rangsangan yang bersifat nutrisi dan rangsangan senyawa non nutrisi berupa senyawa sekunder (Semiochemical) (Chapman, 1971).

Rangsangan nutritif berkaitan dengan kandungan unsur-unsur makanan yang terkandung pada tanaman tersebut, karena

kualitas nutrisi dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan, kesuburan, mortalitas maupun keperidian serangga sekaligus dapat mempengaruhi perkembangan populasinya (Sanjaya, 1970).

Crocidolomia binotalis Zell. diduga mempunyai preferensi diantara inang-inangnya dari Cruciferae dan jenis inang tertentu mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhannya dibanding jenis inang lainnya. Untuk menguji bagaimana pengaruh inang-inang yang berbeda terhadap pertumbuhan dan preferensi *C. binotalis* Zell. dilakukan penelitian ini.

2. BAHAN DAN METODE

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah larva *Crocidolomia binotalis* Zell., kubis krop (*Brassica oleracea* var. *capitata*), kubis bunga (*Brassica oleracea* var. *botrytis*), kubis china (*brassica chinensis*) dan kapas.

Alat-alat yang digunakan adalah kotak plastik serangga, timbangan elektrik, kuas kecil, gunting, leaf area meter atau kertas grafik, label dan alat tulis.

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 3 ulangan. Masing-masing perlakuan tersebut adalah Pemberian daun kubis berkrop (*B. oleracea* var. *capitata*), pemberian daun kubis bunga (*B. oleracea* var. *botrytis*) dan pemberian daun kubis China (*B. chinensis*) data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam dan dilakukan uji lanjut dengan DNMRT pada taraf nyata 5 %.

3. PELAKSANAAN PENELITIAN

Larva didapat dari kelompok telur pada daun kubis bunga, kubis berkrop dan kubis cina dari perkebunan pasca panen. Untuk melihat preferensi serangga, tiap kotak serangga dimasukkan ketiga jenis makanan dengan jarak yang sama sesuai dengan perlakuan, di tengah-tengah kotak diinfestasikan 15 ekor larva instar ke 3 *Crociodolomia binotalis* Zell. Percobaan menggunakan 3 ulangan. Untuk perlakuan Pengaruh Jenis Makanan Terhadap Pertumbuhan Serangga, larva instar ke 2 yang menetas dari telur dan 1 kali molting, diambil sebanyak 5 ekor dengan 3 ulangan dan setiapnya dimasukkan ke dalam kotak serangga yang telah disediakan 1 jenis makanan yang berbeda sesuai perlakuannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Preferensi larva *Crociodolomia binotalis* Zell. Pada ketiga jenis inang dapat dilihat pada Tabel 1.

Dari Tabel 1 terlihat bahwa *C. binotalis* Zell. Mempunyai preferensi terbesar pada *Brassica oleracea* var. *botrytis*. Ketertarikan ini bisa jadi karena tanaman-tanaman ini mempunyai senyawa-senyawa sekunder (semio chemical) non nutritif yang tidak terdapat pada kedua jenis inang lainnya. Banyak tanaman khusus yang diserang serangga tertentu karena adanya zat tertentu yang menarik serangga tersebut dan juga tidak adanya zat penolak (repellen) pada tanaman (Partosoedjono, 1984). Inang yang kurang khas bagi pilihan serangga, jika makanan yang khusus jarang atau bahkan tidak dapat diperoleh maka mereka akan beralih ke inang lainnya (Borror, et.al., 1989).

Pengaruh jenis makanan terhadap pertumbuhan serangga:

1. Jumlah larva yang mati

Dari Tabel 2 tidak terlihat adanya pengaruh makanan terhadap kematian larva.

Hal ini terjadi karena kebutuhan dasar gizi serangga seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, air dan sebagainya dapat diperoleh dari ketiga jenis makanan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan *C. binotalis* Zell, pada larva yang tidak mati secara morfologi memiliki ukuran tubuh dan aktifitas gerak yang relatif sama. Tanaman tidak bersifat antibiosis terhadap pertumbuhan larva. Kematian larva yang terjadi lebih banyak diakibatkan faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, cahaya dan sebagainya.

2. Pertambahan rata-rata berat larva

Dari Tabel 3 terlihat bahwa pertambahan berat larva rata-rata tidak jauh berbeda. Pertambahan rata-rata berat larva tertinggi pada inang *Brassica oleracea* var. *botrytis* (kubis bunga), kemudian *Brassica oleracea* var. *capitata* (kubis krop) dan terakhir pada *Brassica chinensis* (kubis Cina). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga jenis inang memiliki kandungan dasar gizi yang memadai dan relative sama. Di lapangan, ketiga jenis inang ini dapat menjadi inang utama bagi *C. binotalis* Zell.

3. Luas daun yang dikonsumsi

Dari Tabel 4 terlihat bahwa pada perlakuan non preferensi pada makanan, larva memiliki kemampuan makan yang relatif sama. Luas daun yang dikonsumsi berkorelasi terhadap pertambahan berat larva.

4. Berat daun yang dikonsumsi

Dari Tabel 5 terlihat adanya perbedaan yang nyata pada berat daun yang dikonsumsi larva *C. binotalis* Zell. Perbedaan berat daun tampaknya bukan karena *Brassica oleracea* var. *capitata* (kubis krop) memiliki kandungan dasar gizi yang lebih baik dibandingkan 2 jenis inang lainnya. Hal ini terlihat dengan tidak adanya korelasi antara berat daun yang dimakan dengan berat tubuh larva. *Brassica oleracea* var. *capitata* (kubis krop) memiliki berat yang lebih besar dibandingkan dengan kedua jenis kubis lainnya pada ukuran luas yang sama. Hal ini karena *Brassica oleracea* var. *capitata* (kubis krop) memiliki ketebalan dan kadar air yang lebih banyak dari kedua kubis lainnya. Tidak adanya korelasi antara berat daun yang dikonsumsi dengan berat larva *C. binotalis* bisa jadi karena banyaknya air yang dikonsumsi larva sebanding dengan jumlah air yang dikeluarkan bersama dengan ekskremen serangga, sehingga berat larva rata-rata pada ketiga jenis makanan relatif sama.

Tabel 1. Preferensi *Crociodolomia binotalis* Zell. pada 3 Jenis Inang

Perlakuan	Preferensi larva (ekor)
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> (kubis bunga)	7,32 a
<i>Brassica chinensis</i> (kubis Cina)	3,63 b
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> (kubis krop)	3,53 b
KK = 11,45 %	

Angka-angka pada kolom yang diikuti huruf-huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata pada taraf nyata 5 % menurut DNMRT

Tabel 2. Jumlah Kematian Larva *C. binotalis* Zell. pada Ketiga Jenis Tanaman Inang

Tanaman inang	Larva Mati (ekor)	Waktu Kematian (hari ke)
<i>Brassica chinensis</i> (kubis Cina)	2	6
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> (kubis krop)	1	5
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> (kubis bunga)	1	5

Tabel 3. Pertambahan Berat Larva *C. binotalis* Zell. pada Ketiga Jenis Inang

Jenis inang	Pertambahan berat larva rata-rata (g)
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> (kubis bunga)	0,030
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> (kubis krop)	0,023
<i>Brassica chinensis</i> (kubis Cina)	0,017

Tabel 4. Luas Daun yang Dikonsumsi *C. binotalis* dari Ke-3 Inang

Jenis inang	Luas daun total yang dikonsumsi (cm ²)	Luas daun rata-rata yang dikonsumsi (cm ²)
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> (kubis bunga)	42,80	14,26
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> (kubis krop)	40,16	13,38
<i>Brassica chinensis</i> (kubis Cina)	39,98	13,32

Tabel 5. Berat Daun Rata-Rata yang Dikonsumsi *C. binotalis* Zell.

Jenis inang	Rata-rata berat daun yang dikonsumsi (gram)
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> (kubis krop)	3,89 a
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> (kubis bunga)	1,45 b
<i>Brassica chinensis</i> (kubis Cina)	1,06 c

Angka-angka pada kolom yang sama tidak diikuti huruf kecil yang sama berbeda nyata pada taraf nyata 5 % menurut DNMRT

5. KESIMPULAN

Dari ketiga jenis makanan yang diberikan *Brassica oleracea* var. *capitata* (kubis krop), *Brassica oleracea* var. *botrytis* (kubis bunga) dan *Brassica chinensis* (kubis Cina). Ketiga jenis daun tanaman kubis yang diberikan tidak menghambat pertumbuhan dan aktifitas normal dari larva *Crociodolomia binotalis* Zell. Preferensi terhadap makanan tertinggi pada *Brassica oleracea* var. *botrytis*, kemudian pada *Brassica chinensis* (kubis Cina) dan terakhir pada *Brassica oleracea* var. *capitata* (kubis krop) dan ketiga tanaman tersebut dapat menjadi inang bagi *C. binotalis* zell. Rata-rata luas daun yang dimakan

oleh larva berpengaruh terhadap pertambahan berat rata-rata larva sedangkan rata-rata berat daun yang dikonsumsi tidak berkorelasi terhadap rata-rata pertambahan berat larva *C. binotalis* Zell.

DAFTAR PUSTAKA

- Borror, D.J.C.A. Triplehorn, and F. Johnson. 1989. An introduction to the study of insect. By Saunders College Publishing, Rinehart and Winsons, Inc.
- Chapman, R.F. 1971. The Insect Structure and Function 2 ed. American Elsevier Publishing Company, Inc. New York.

Kalshoven, L.G.E. 1981. The Pest of Crop in Indonesia. Revised and Translated by P.A. Van der Laan. P.T. Ichisar Baru Jakarta.

Partosoedjono, S. 1984. Mengenal Serangga. Agromedia Bogor.

Sastrosiswojo, Sudarwohadi dan Wiwin Setiawati. 1993. Hama-hama Tanaman Kubis dan Pengendaliannya *dalam* KUBIS. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balai Penelitian Holtikultura Lembang.