Buletin Guaca Antariksa

ISSN 2303-2707

Di Balik Kesuksesan Pengamatan Hilal 1 Ramadhan 1438 H

Basis Data Medan
Magnet Bumi : Data Mining

Mengamati Kerapatan Elektron dan
Ketinggian Lapisan Ionosfer

Eureka, Saat Peralatan Astronomi Bertemu
Fenomena Geofisika di Lapisan Ionosfer

**TTS
BERHADIAH**

Diterbitkan oleh
Pusat Sains Antariksa (Pussainsa)
LAPAN

Pelindung
Kepala LAPAN

Penanggung Jawab
Kepala Pusat Sains Antariksa

Redaktur
Drs. Bambang Suhandi

Editor
T. Dani
Asnawi
F. Nuraeni
V. Wellyanita
R. Kesumaningrum

Kontributor
Jiyo
T. Dani
V. Dear
Elyyani
F. Nuraeni
M. Juangsih
S. Anggarani
S.C. Pranoto
A.S. Mardiani
C.E. Haryanto
E.R. Saptianna
F. Mumtahana
M.Z. Nurzaman
R. Kesumaningrum
D.R. Martiningrum

Penata Letak
Endah Oktaviani, S.Ds.

Sekretariat
S. Rachman

Alamat
Jl. Dr. Djundjuran No.133
Bandung 40173
Telepon: (022) 6012 602
Fax: (022) 6014 998

Untuk pemesanan Buletin
Cuaca Antariksa
Kirim faks permohonan
langganan Buletin Cuaca
Antariksa ke :

(022) 6012 602

- 3 Di Balik Kesuksesan Pengamatan
Hilal 1 Ramadhan 1438 H
- 5 Basis Data Medan
Magnet Bumi : Data Mining
- 8 Mengamati Kerapatan Elektron dan
Ketinggian Lapisan Ionosfer
- 10 Monitoring Data Pengamatan
Sains Antariksa

Cuaca Antariksa

- 12 Aktivitas Matahari
- 15 Aktivitas Geomagnet
- 17 Aktivitas Sintilasi Ionosfer diatas
Bandung dan Biak, Indonesia
- 17 Koneksitas Jaringan ALE-LAPAN
dan Indeks T Regional
- 18 *Review* Cuaca Antariksa

Salam Redaksi

Umat Islam baru saja melaksanakan kewajiban ibadah puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan terdapat pada kalender Islam yang penanggalannya ditentukan berdasarkan peredaran bulan. Agar ibadah puasa dapat dimulai tepat pada hari tanggal 1 Ramadhan, maka dari itu saat menjelang bulan ramadhan dilakukan pengamatan hilal. LAPAN memiliki peran dalam melaksanakan pengamatan hilal. Cuaca antariksa dan faktor - faktor lainnya mempengaruhi kelancaran proses pengamatan hilal. Bagaimana kondisi kegiatan pengamatan hilal yang dilaksanakan LAPAN pada 1 Ramadhan 1438 H yang lalu? Hal tersebut akan diketahui pada bahasan pertama artikel didalam buletin kali ini yaitu "Dibalik kesuksesan Pengamatan Hilal 1 Ramadhan 1438 H. Salah satu balai milik LAPAN yang ikut serta melakukan pengamatan hilal, berbagi pengalamannya juga dimuat pada artikel "Rukyatul Hilal Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang di Bukit Syekh Bela-Belu Yogyakarta.

Pada edisi ini, pembaca di perkenalkan dengan salah satu sistem informasi pengolahan data magnet bumi. Bahasan tersebut akan ditemukan pada artikel yang berjudul Basis Data Medan Magnet Bumi. Beberapa data yang diperoleh melalui propagasi lapisan ionosfer, kemungkinan akan dipengaruhi oleh kerapatan elektron. Pada ketinggian tertentu, nilai / karakter kerapatan elektron mungkin berbeda - beda. Penjelasan mengenai kerapatan elektron dan ketinggian Lapisan juga akan dibahas dalam buletin edisi ini.

Pusat Sains Antariksa - LAPAN memiliki peralatan pengamatan yang tersebar di

daftar isi

- 20 Rukyatul Hilal Balai
Pengamatan Antariksa dan
Atmosfer Sumedang
di Bukit Syekh Bela-Belu
Yogyakarta
- 21 Eureka, Saat Peralatan
Astronomi Bertemu
Fenomena Geofisika di Lapisan
Ionosfer
- 22 Kunjungan ke Fasilitas Riset
Astronomi Untuk
Persiapan Membangun
Observatorium Nasional
- 24 *Space Weather Information and
Forecast Services (SWIFTS) -
LAPAN menghadiri
Pertemuan Tahunan
International Space
Environment Service (ISES)
2017*
- 26 Kalender Astronomi
- 28 Teka Teki Silang Berhadiah

wilayah Indonesia. Hasil pengamatannya disimpan dalam suatu server dan diolah menggunakan suatu aplikasi. Pada artikel Monitoring Data Pengamatan Sains Antariksa akan dijelaskan lebih lanjut tentang pengolahan hasil pengamatannya.

Artikel rutin tentang aktivitas matahari, geomagnet, sintilasi, koneksitas jaringan ALE-LAPAN dan Indeks T Regional, dan review Cuaca Antariksa tetap dimuat pada buletin ini. Selain itu, Salah satu peneliti LAPAN yang baru saja kembali setelah melakukan kunjungan ke Fasilitas Riset Astronomi untuk Persiapan Membangun Observatorium Nasional akan berbagi pada tulisan yang berjudul "Kunjungan ke Fasilitas Riset Astronomi Untuk Persiapan Membangun Observatorium Nasional".

Tak lupa kami muat juga informasi kalender astronomi untuk bulan Juli, Agustus dan September 2017. Selain itu sebagai pelengkap, kami tantang anda untuk mengisi TTS dengan benar karena semua jawaban terdapat pada isi buletin ini. Jangan ragu untuk mengirimkan jawabannya karena kami menyediakan hadiah menarik.

Akhir kata, Selamat Membaca dan Tetaplah Bersemangat dalam Berkarya. Selamat Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir dan Bathin.

Bandung, Juli 2017
Salam Redaksi BCA

Di Balik Kesuksesan Pengamatan Hilal 1 Ramadhan 1438 H

Oleh :

F. Mumtahana

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

Hilal merupakan salah satu fenomena astronomis yang penting diamati dan sering ditunggu kenampakannya terutama ketika menjelang ramadhan dan syawal. Menurut KBBI sendiri, hilal adalah Bulan sabit yang terbit pada tanggal satu bulan Kamariah. Dapat dikatakan juga bahwa hilal merupakan Bulan sabit muda pertama setelah terjadinya konjungsi/ijtimak/Bulan baru pada arah dekat Matahari terbenam sebagai acuan permulaan bulan dalam kalender Islam. Menurut Kepala LAPAN, Prof. Thomas Djameluddin, dalam tulisannya mengenai hilal, bentuk hilal tampak sangat tipis dan melengkung ke arah Matahari, karena hilal adalah

bagian Bulan yang tercahayai Matahari. Bagian ujung ("tanduk") lebih tipis dari bagian tengahnya dan seringkali tidak terlihat. Jadi, hilal bisa jadi tampak hanya seperti goresan cahaya yang sangat tipis, yang sangat sulit dilihat apalagi oleh pemula. Meskipun demikian, para pengamat hilal 1 Ramadhan 1438 H kali ini tergolong beruntung karena karakteristik Bulan baru pada saat itu cukup memudahkan. Menurut hisab, sudut elongasi atau sudut yang dibentuk antara Bulan dan Matahari pada saat itu cukup besar, yaitu 9° , kemudian umurnya sekitar 15 jam. Dengan kriteria tersebut seharusnya hilal tidak terlalu sulit untuk dikonfirmasi dengan rukyat/pengamatan. Rukyat hilal ini penting dilakukan karena biasanya datanya dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam sidang itsbat pemerintah sebagai penentuan awal kalender islam yang seringkali terdapat perbedaan kriteria antar golongan. Namun Prof. Thomas juga telah menyampaikan bahwa hingga tahun 2021, tidak ada perbedaan

penentuan awal puasa karena posisi Bulan sudah di atas 2° . Meskipun demikian, pengamatan harus tetap terus dilakukan karena pemerintah dan golongan tertentu mengharuskan hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan.

Walaupun pengamatan hilal bukanlah suatu tugas pokok dan fungsi utama di Pusat Sains Antariksa LAPAN, tim hilal Ramadhan 2017 mempersiapkan pengamatan dengan maksimal karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tidaklah mudah untuk memperoleh citra hilal yang sangat tipis. Ekspedisi kali ini dikoordinatori oleh M. Zamzam Nurzaman beranggotakan Farahhati Mumtahana, Herli Mia Haqu, dan pelaksana *streaming* oleh Ahmad Zulfiana. Pada mulanya, lokasi yang diusulkan adalah di Anyer dengan pertimbangan kemudahan sarana dan prasarana.

Gambar 1 : Simulasi lintasan Matahari dan Bulan dilihat dari Anyer (atas) dan Tanjung Lesung (bawah) (sumber aplikasi).

Gambar 2 : Peta visibilitas Hilal 1 Ramadhan 1438 Hijriyah / 26 Mei 2017 Masehi (Sumber: Accu Times).

- G. Conjunction Time: 26/05/2017 CE, 02:44 LT
- Julian Date at Time of Calculations: 2457899.94726

- Sunset: 17:44 LT G. Moon Age: +15H 00M
- Moonset: 18:24 LT Moon Lag Time: +00H 40M

- G. Moon Right Ascension: +04H 54M 25S G. Moon Declination: +17° 44' 22"
- G. Sun Right Ascension: +04H 13M 50S G. Sun Declination: +21° 11' 41"

- G. Moon Longitude: +74° 20' 52" G. Moon Latitude: -04° 48' 32"
- G. Sun Longitude: +65° 22' 38" G. Sun Latitude: -00° 00' 01"

- G. Moon Altitude: +09° 00' 37" G. Moon Azimuth: +289° 07' 18"
- G. Sun Altitude: -00° 56' 30" G. Sun Azimuth: +291° 13' 08"

- G. Relative Altitude: +09° 57' 07" G. Elongation: +10° 10' 08"
- G. Relative Azimuth: -02° 05' 50" G. Phase Angle: +169° 48' 26"

- G. Crescent Width: +00° 00' 16" G. Moon Semi-Diameter: +00° 16' 43"
- G. Illumination: 00.79 % G. Horizontal Parallax: +01° 01' 22"

- G. Magnitude: -04.99 G. Distance: 357357.31 Km

- According to Odeh Criteria, using the following values at Best Time:
* Moon-Sun Topocentric Relative Altitude = +09° 02' 39" (09.0°)
* Topocentric Crescent width = +00° 00' 13" (0.22")
* q = 3.25

* The Crescent Visibility is: Visible With Optical Aid, Could Be Seen By Naked Eye.

Gambar 3 : Simulasi posisi Matahari dan Bulan *software stellarium* dan data ephemeris.

Namun atas saran fotografer profesional mengenai alternatif lokasi pantai yang sering cerah dan kajian lokasi yang dilakukan oleh penulis, ditemukan lokasi baru untuk pengamatan hilal tersebut yaitu di Tanjung Lesung. Lokasi dengan koordinat geografis 6.50 LS, 105.60 BT tersebut saat ini sudah menjadi Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) di Provinsi Banten.

Kajian lokasi secara sederhana dapat dilakukan dengan membandingkan probabilitas hilal teramati dari masing-masing lokasi, di mana dalam hal ini adalah studi lokasi Tanjung Lesung dan Anyer. Dengan menganalisis lintasan terbit dan tenggelam Matahari, ditemukan fakta bahwa pengamatan hilal yang dilakukan di Anyer tidak murni lepas pantai, karena arah Barat terhalang pulau Sumatera dan kepulauan di Krakatau (Gambar 1). Se jauh ini, tim Pussainsa LAPAN yang sering melakukan pengamatan hilal di Anyer dan beberapa lokasi lainnya belum pernah memperoleh data hilal baik syawal maupun ramadhan. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi tantangan bagi tim hilal tahun ini untuk memperoleh data hilal tersebut mengingat faktor elongasi dan umur Bulan yang cukup mendukung.

Di samping itu, tampak dari peta visibilitas hilal Ramadhan yang disimulasikan menggunakan *software Accurate Times* pada tanggal 1 Ramadhan 1438 (Gambar 2), wilayah Indonesia yang baik untuk pengamatan hilal kali ini adalah wilayah Barat. Pada peta tersebut warna oranye tua menandakan lokasi terbaik di mana hilal bahkan dapat terlihat dengan mata telanjang, sedangkan semakin kuning muda semakin kurang baik dan butuh instrumen khusus.

Tanjung Lesung merupakan pilihan yang tepat karena masih berada dalam zona oranye, yang berarti jika cuaca cerah hilal dapat diamati dengan teleskop. Meskipun termasuk dalam zona sedang, lokasinya di wilayah Jawa bagian ujung Barat yang lepas samudera menjadikan lokasi tersebut bebas jarak pandang tanpa halangan kepulauan.

Persiapan dilakukan oleh tim dalam waktu sekitar dua minggu sebelum kegiatan antara lain yaitu uji instrumen yang digunakan (Takahashi FSQ 85ED, *Mounting*

Vixen SXD2, dan beberapa komponen teleskop lain), kemudian uji coba detektor (ZWO cmos dan DSLR) dengan *filter* Infra Merah (IR). Tim pengamat juga melakukan latihan *alignment finder* yaitu menyejajarkan posisi objek teramati pada *finder* dan tabung, kemudian *polar align* dengan memposisikan tabung tepat pada objek sekali mengarahkan (arah Utara - Selatan nya harus benar-benar tepat), serta simulasi *streaming* dengan *web cam* dan kamera DSLR. Dengan menggunakan beberapa *software* simulasi dan data *ephemeris*

Gambar 4 : Tim hilal ramadhan 1438 H Pussainsa - LAPAN

Gambar 5 : Citra hilal yang diamati dan diproses secara sederhana untuk dipublikasikan langsung ke masyarakat.

untuk tanggal 26 Mei 2017 saat masih 29 Sya'ban 1438H, diketahui bahwa posisi Bulan dan Matahari adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. Pengamatan hilal idealnya dilakukan ketika Matahari mulai tenggelam, karena dengan cahaya tipis hilal akan terlalu terganggu atau kalah oleh cahaya Matahari jika dilakukan saat Matahari masih melintas di meridian. Pada hari itu, matahari terbit pukul 05:55 WIB dan tenggelam pukul 17:44 WIB, sedangkan Bulan baru tenggelam pada pukul 18:24 WIB. Jeda waktu tenggelam Matahari dan Bulan cukup lama yaitu 40 menit. Dengan jeda waktu yang cukup lama dan juga elongasi serta umur Bulan yang cukup tinggi, diperkirakan hilal ramadhan tahun ini tidak terlalu sulit untuk diamati.

Dalam ekspedisi ini, tim Pussainsa melakukan survey lokasi terlebih dahulu pada tanggal 25 Mei 2017 dan disambut baik oleh

General Manager pemilik resort Tanjung Lesung Beach Hotel. Setelah memilih lokasi dengan mengamati terbenamnya Matahari serta simulasi akhir pengamatan yang dilakukan malam harinya, pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 26 Mei 2017 dilakukan persiapan dan pengamatan hilal. Kegiatan pengamatan dari persiapan hingga proses pengambilan data hilal ini direkam dan disiarkan secara langsung kepada khalayak umum melalui akun *youtube* Pusat Sains Antariksa. Proses pengamatan dilakukan sesuai dengan latihan sebelumnya, diawali dengan *assembly* semua komponen teleskop dan detektor, *balancing*, *alignment finder* untuk memudahkan pencarian objek, dilanjutkan dengan tahap yang terpenting yaitu *polar alignment* agar teleskop tepat mengarah ke objek pengamatan dan mengikutinya dengan presisi. Ketika menjelang sore, cuaca cukup cerah namun

berawan di bagian *horizon* hingga sekitar pukul 17:40 WIB, Matahari sudah terbenam di balik awan.

Akhirnya dengan segala persiapan dan latihan uji coba yang dilakukan, tim Pussainsa berhasil memperoleh citra hilal 1 Ramadhan 1438 H pada pukul 17:49 WIB dengan cukup baik. Jadi, beberapa faktor penentu kesuksesan hilal kali ini dimulai dari perencanaan yang matang, pengkajian lokasi dan kriteria hilal, persiapan instrumen serta latihan dan simulasi. Cuaca cerah juga menjadi faktor penentu utama meskipun saat itu cukup berawan di *horizon*. Penggunaan filter infra-merah sendiri memberikan kontribusi yang cukup besar karena dapat menembus awan tipis. Selain itu kesuksesan pengamatan hilal tersebut juga buah dari *team work* dengan pembagian tugas yang jelas serta semangat pengamatan demi kontribusi untuk negara pada umumnya dan lembaga pada khususnya. ■

Basis Data Medan Magnet Bumi : Data Mining

Oleh :

S. C. Pranoto

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

Informasi merupakan hasil pemrosesan yang berasal dari data mentah (*raw data*) menjadi sesuatu yang lebih bernilai informatif, dapat berupa suatu kesimpulan, argumentasi, ataupun analisa sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Sumber dari informasi adalah data. Data umumnya diperoleh dalam bentuk yang masih mentah, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah menggunakan suatu model dan atau metode tertentu untuk menghasilkan informasi.

Hubungan data dan informasi didefinisikan sebagai bahan baku dan produk jadi. Data sebagai bahan baku, diolah melalui suatu proses transformasi atau pengolahan data menjadi informasi. Dengan kata lain bahwa informasi merupakan keluaran-keluaran (*outputs*) dari proses transformasi, dimana data berfungsi sebagai masukan-masukannya (*inputs*). Jadi jika ditinjau sebagai suatu sistem, maka sistem informasi akan menerima masukan-masukan yang berupa

data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi-instruksi, dan mengeluarkan hasilnya berupa informasi.

Fungsi pengolah data menjadi informasi sering kali memerlukan data yang telah dikumpulkan dan diolah sebelumnya. Oleh karena itu pada model sistem informasi perlu ditambahkan alat penyimpanan yang biasa disebut *bank data* (*storage*). Terdapat dua jenis data yang tersimpan dalam suatu *bank data* yaitu; (a) data lama baik berupa data mentah maupun data pengolahan sebelumnya dan (b) data baru yang merupakan hasil dari proses pengolahan dengan metode-metode yang berbeda. Bagan dari model sistem transformasi informasi ditunjukkan dalam Gambar 1.

Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan. Suatu sistem informasi pada dasarnya terbentuk melalui suatu kelompok kegiatan operasional yang tetap yaitu mengumpulkan data, mengelompokkan data, menghitung data, menganalisa data, dan menyajikan laporan.

Sistem informasi dapat terdiri dari beberapa komponen-komponen yang disebut dengan istilah blok bangunan (*building block*). Sebagai suatu sistem blok-blok tersebut saling berinteraksi membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuannya, blok bangunan tersebut terdiri dari beberapa komponen diantaranya:

- Blok Masukan (*Input Block*)

Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Data yang digunakan di bagian ini meliputi data 11 stasiun pengamatan khususnya data jaringan magnetometer di LAPAN.

- Blok Model (*Model Block*)

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan memanipulasi data *input* dan data yang tersimpan di basis data dengan metode tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Beberapa contoh dari model terkait dengan data medan magnet Bumi diantaranya; model penentuan *solar quiet* (Musafar, 2010), model indeks Pc3 (Setyanto, 2011) dan model indeks Pc5 (Bangkit, 2014), serta model-model lain yang sedang dikembangkan seperti model reduksi *noise* dan model indeks K.

- Blok Keluaran (*Output Block*)

Produk dari sistem informasi berupa *output* yang berguna untuk semua pengguna sistem. Beberapa jenis *output* atau informasi yang dihasilkan diantaranya variasi harian, indeks K, indeks Pc3 dan indeks Pc5.

- Blok Teknologi (*Technology Block*)

Teknologi digunakan untuk menerima *input*, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirim keluaran serta membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Blok ini biasanya terdiri atas dari tiga bagian utama, yaitu teknisi (*humanware* atau *brainware*), perangkat lunak (*software*), dan perangkat keras (*hardware*).

- Blok Basis Data (*Database Block*)

Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Data perlu disimpan di dalam basis data secara terorganisasi untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut.

- Blok Kendali (*Control Block*)

Agar sistem informasi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan maka perlu diterapkan pengendali-pengendali di dalamnya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan dapat segera diatasi. Untuk kegiatan ini biasanya dilakukan oleh seorang administrator.

Sistem manajemen basis data (*database management system, DBMS*) merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan kumpulan program untuk mengakses data. Tujuan utama sistem manajemen basis data adalah menyediakan cara menyimpan dan mengambil informasi basis data secara mudah dan efisien. (Silberschatz, dkk; *Database System Concepts*). Beberapa keuntungan dalam sistem manajemen basis data diantaranya adalah akses yang efisien, cepat dalam pengembangan aplikasi, integritas dan keamanan data,

Gambar 1 : Bagan sistem transformasi informasi

Gambar 2 : Bagan blok bangunan (*building block*) dari sistem informasi

administrasi keseragaman data, serta dapat melakukan akses bersamaan.

Secara definisi *data mining* adalah suatu proses untuk menemukan *interesting knowledge* dari sejumlah besar data yang disimpan dalam *database*, *data warehouse* atau media penyimpanan lainnya (Han, Kamber, 2001). Dengan melakukan *data mining* terhadap sekumpulan data, bisa didapatkan *interesting pattern* yang akan disimpan sebagai *knowledge* yang baru. *Pattern* yang diperoleh digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap data tersebut sehingga dapat diperoleh informasi yang berguna dalam mendukung proses pengambilan keputusan.

Diagram berikut merupakan ringkasan dari tahapan serta proses yang dilakukan pada saat melakukan *data mining* dan proses untuk menemukan *knowledge* atau sebuah informasi. Adapun tahapan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Selection*, yaitu proses memilih dan memisahkan *raw data* (berdasarkan tipe data bineri atau ascii; dan resolusi data).

2. *Pre-processing*, yaitu mempersiapkan data dengan cara membersihkan data dari *noise*. Untuk tahap ini masih dikembangkan metode dengan menggunakan transformasi wavelet.

3. *Transformation*, data yang telah melalui proses *select and pre-processing* tidak begitu saja langsung digunakan, tetapi ditransformasikan terlebih dahulu ke bentuk yang lebih *navigable and useable*, misalnya format data IAGA.

4. *Data mining*, tahap ini dipusatkan untuk mendapatkan jenis/pola pengolahan data (*extraction of data*) misalnya variasi, indeks Pc, indeks K, dll.

Interpretation and evaluation, dalam proses ini *pattern* atau pola-pola yang telah diidentifikasi oleh sistem kemudian diterjemahkan atau diinterpretasikan ke dalam bentuk *knowledge* yang lebih mudah dimengerti oleh *user* untuk membantu pengambilan keputusan, misalnya menunjukkan adanya anomali atau gangguan di magnetosfer baik dalam bentuk plot grafik atau tabel indeks yang lebih mudah dimengerti.

Salah satu bentuk *pattern* untuk menyatakan korelasi data yang dihasilkan oleh *data mining* adalah dalam bentuk *association rule mining*. *Association rule mining* adalah suatu *conditional statement* untuk menyatakan hubungan antara items dalam suatu *dataset* yang ditentukan. Dalam menentukan suatu *association rule*, ada dua hal yang perlu diperhatikan:

- *Support Value* : suatu ukuran yang menunjukkan hubungan antara dua *item*. Misal: dari keseluruhan transaksi, seberapa sering *item A* dan *item B* muncul bersamaan.

$$\text{Support } (A \Rightarrow B) = (A \cup B) \quad (1)$$

- *Confidence Value* : suatu ukuran yang menunjukkan hubungan antara dua *item* secara *conditional*. Misal: seberapa sering *item B* terjadi jika terjadi *item A*.

$$(A \Rightarrow B) = \frac{\text{support}(A \cup B)}{\text{support}(A)} \quad (2)$$

Kedua ukuran ini nantinya berguna dalam menentukan *interesting association rule*, yaitu untuk dibandingkan dengan batasan yang ditentukan oleh *user*. Batasan tersebut umumnya terdiri dari *minimum_support* dan *minimum_confidence*. *Minimum_support* menyatakan batas minimum hubungan antara dua buah *data/item* yang muncul secara bersamaan sedangkan *minimum confidence* menyatakan

batas minimum suatu data mempengaruhi data yang lain.

Contoh: Suatu *association rule* dalam *remove noise data* :

If A then B [*support* = 2%, *confidence* = 60%],
dimana A dan B adalah kumpulan *data/item* yang diolah terkait dengan *noise*. Artinya: *noise data A* dan data B yang diolah minimal sebesar 2% dari keseluruhan data yang dianalisa dan memiliki tingkat keberhasilan dari proses *remove noise* minimal sebesar 60%. Dari contoh di atas, jika *support*-nya $\geq \text{min_support}$ dan *confidence*-nya $\geq \text{min_confidence}$, maka *rule* tersebut bisa dikatakan sebagai *interesting rule*. ■

Gambar 3 : Diagram Sistem Manajemen Basis Data (DBMS)

Gambar 4 : Tahap-tahapan dalam *data mining*. (Sumber : *Data Mining: Concepts and Techniques*, Jiarwei Han)

Mengamati Kerapatan Elektron dan Ketinggian Lapisan Ionosfer

Oleh :

Jiyo

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

1. Definisi

Lapisan ionosfer adalah bagian dari antariksa yang menempati ruang di sekeliling Bumi, dari ketinggian ~ 60 km hingga ketinggian ~1000 km di atas permukaan Bumi (lihat Gambar 1). Lapisan yang terbentuk dari kumpulan ion, elektron, dan partikel bermuatan sehingga termasuk kedalam materi yang berwujud plasma. Plasma merupakan salah satu dari empat wujud materi yaitu padat, cair, gas, dan plasma. Plasma memiliki ukuran/parameter kerapatan elektron (N), yaitu banyaknya elektron per satuan volume lapisan ionosfer. Kerapatan elektron merupakan parameter utama lapisan ionosfer yang dapat dikonversikan menjadi frekuensi plasma (fN). Hubungan antara kerapatan elektron dengan frekuensi plasma mengikuti persamaan (1).

$$N = \frac{1}{80,5} f_N^2 \dots \dots \dots (1)$$

dengan N adalah kerapatan elektron ionosfer dalam satuan elektron/m³, fN adalah frekuensi ionosfer dalam satuan Hz. Jika fN dikonversikan kedalam satuan MHz (=10⁶ Hz), maka persamaan (1) menjadi persamaan (2).

$$N = \frac{1}{80,5} 10^{12} f_N^2 \dots \dots \dots (2)$$

Selain kerapatan elektron, terdapat parameter ionosfer lainnya yang masih berkaitan erat dengan elektron atau ion di lapisan tersebut. Parameter lainnya yang digunakan dalam riset ionosfer antara lain: (i) ketinggian lapisan

(h), (ii) kandungan elektron total (*Total Electron Content, TEC*), (iii) indeks sintilasi ionosfer, dan (iv) citra *airglow*. Masing-masing parameter berkaitan dengan perilaku dinamis (dinamika) lapisan ionosfer.

Karena letaknya jauh dari permukaan Bumi, maka lapisan ionosfer jarang diamati secara langsung di tempat obyek berada (*in-situ*), tetapi lebih banyak diamati menggunakan metode pengamatan jarak jauh yang termasuk kelompok *remote sensing*. Pengamatan secara langsung biasanya menggunakan roket atau wahana antariksa lainnya (misalnya satelit dan *space station*) dan dilakukan secara insidental (tidak kontinu). Metode pengamatan jarak jauh yang dilakukan secara kontinu biasanya menggunakan radar ionosfer (ionosonda), *radar back scatter*, resiver sinyal satelit, pencitra langit (*All Sky Imager, ASI*), dan perangkat lainnya.

Gambar 1 : Grafik temperatur (bagian kiri) dan kerapatan elektron dari permukaan Bumi hingga ketinggian 600 km atau lebih (*Sumber : Wikipedia*).

Lapisan ionosfer terdiri dari beberapa sub-lapisan yang dalam pembahasan ini disebut sebagai lapisan saja. Bagian-bagian lapisan ionosfer adalah lapisan D (h : 60 - 90 km), lapisan E (h : 90 - 150 km), dan lapisan F (h : 150 - 1000 km). Pada waktu-waktu tertentu muncul lapisan tambahan pada rentang ketinggian lapisan E yang disebut lapisan E-Sporadis (Es). Lapisan tambahan juga muncul pada rentang ketinggian lapisan F dan lapisan tambahan tersebut adalah lapisan F1, lapisan F1.5, dan lapisan F3. Sesuai dengan konvensi, jika

Gambar 2 : Skema prinsip kerja perangkat ionosonda.

muncul lapisan tambahan tersebut, maka lapisan F disebut sebagai lapisan F2.

1. Perangkat Pengamatan dan Data Mentah

Pengamatan lapisan ionosfer dapat dilakukan di permukaan Bumi (*ground based observation*) dan di antariksa (*space based observation*). Pada tulisan ini, pembahasan akan difokuskan pada metode pengamatan di permukaan Bumi (landas Bumi) yang digunakan di Indonesia. Pengamatan lapisan ionosfer landas Bumi tersebut umumnya dilakukan menggunakan perangkat ionosonda, *receiver* GNSS (*Global Navigation System Satellite*), dan pencitra langit. Pada tahap awal tulisan ini akan dibahas tentang pengamatan lapisan ionosfer menggunakan ionosonda dan pada tahap selanjutnya akan diuraikan metode untuk membaca dan menginterpretasikan data yang diperoleh.

Salah satu sifat lapisan ionosfer adalah memantulkan gelombang radio pada frekuensi HF (*High Frequency*: 3 - 30 Mhz). Sifat ini yang digunakan sebagai metode pengamatan di dalam sistem perangkat ionosonda. Prinsip kerja radar ini adalah memancarkan sinyal gelombang radio (pulsa gelombang pembawa) pada frekuensi 2 MHz hingga 22 MHz menuju lapisan ionosfer (Gambar 2). Gelombang radio dengan frekuensi f_1 , f_2 , ..., f_n dipancarkan secara berurutan ke arah vertikal melalui antenna dengan tipe delta bagian pemancar (Tx). Jika frekuensi gelombang radio tersebut sama dengan frekuensi plasma lapisan ionosfer, maka gelombang radio akan dipantulkan kembali ke permukaan Bumi dan diterima oleh ionosonda melalui bagian penerima (Rx). Jadi perangkat ionosonda berperan sebagai

pemancar dan sekaligus penerima sinyal gelombang radio (*transceiver*).

Data yang diperoleh dari pengamatan menggunakan ionosonda berbentuk grafik/gambar yang disebut ionogram (Gambar 3). Sumbu horizontal pada ionogram menunjukkan frekuensi gelombang radio (dalam satuan MHz) yang dipantulkan oleh lapisan ionosfer dan diterima kembali oleh ionosonda. Besaran frekuensi dalam sumbu horizontal memiliki arti sebagai frekuensi plasma lapisan ionosfer (f_N) yang memantulkan gelombang radio pada frekuensi tersebut. Ionogram merupakan data mentah yang perlu dibaca dan diinterpretasikan menjadi parameter lapisan ionosfer, menggunakan konvensi khusus.

Waktu tempuh ($Dt = t_0 - t_1$) gelombang radio dari ionosonda pada saat dipancarkan (t_0), dipantulkan oleh lapisan ionosfer pada ketinggian tertentu, dan diterima kembali oleh ionosonda (t_1) digunakan untuk mengestimasi ketinggian lapisan dengan persamaan (3).

$$h' = c \frac{\Delta t}{2} \dots \dots \dots (3)$$

dengan h' adalah ketinggian semu (*virtual height*), c adalah kecepatan gelombang di medium hampa yang nilainya ~ 300 km/detik. Karena kecepatan gelombang di lapisan ionosfer (medium plasma) lebih

lambat dari c , maka waktu tempuhnya lebih singkat dari Dt dan konsekuensinya nilai ketinggian sebenarnya (*true height*, h) akan lebih rendah dari h' . Nilai ketinggian semu, h' , dinyatakan dengan sumbu vertikal pada ionogram.

Pada kebanyakan tipe ionosonda, sumbu horizontal dinyatakan dalam skala logaritmis berbasis $2\{x=2^{\log(f_N)} \text{ atau } f_N = 2^x\}$ dan sumbu vertikal menggunakan skala linear. Ini artinya, $x=0 \approx$ (ekivalen dengan) $f_N = 1$ MHz, $x=1 \approx f_N = 2$ MHz, $x=2 \approx f_N = 4$ MHz, dan seterusnya. Jadi skala pada sumbu horizontal dimulai dari 1 MHz, bukan 0 (nol) (Perhatikan Gambar 3(b)!), sedangkan skala sumbu vertikal dimulai dari angka 0 (nol). Dengan sistem sumbu seperti ini, maka dihasilkan lengkungan grafik yang khas seperti pada Gambar 3(b).

Dari sebuah ionogram dapat dikenali bentuk/pola jejak (*trace*) dari lapisan E dan lapisan F dengan masing-masing lapisan tambahannya jika muncul. Satu lengkungan jejak/grafik menunjukkan satu lapisan. Dalam hal ini lapisan D tidak bisa diamati menggunakan ionosonda, sehingga jejaknya tidak terlihat dalam ionogram. Ionogram seperti Gambar 3(b) adalah ciri khas (*typical*) lapisan ionosfer pada

Gambar 3 : Skema perekaman sebuah ionogram (a) dan contoh ionogram yang riil hasil pengamatan menggunakan ionosonda tipe CADI (b).

malam hari. Ionogram tersebut merupakan hasil pengamatan pada tanggal 9 Januari 2013, pukul 00 WITA, menggunakan ionosonda tipe CADI (*Canadian Advanced Digital Ionosonde*) di stasiun kerjasama Manado-Tomohon ($1,48^{\circ}\text{LU}$; $124,85^{\circ}\text{BT}$). Dari ionogram ini dapat dilihat bahwa pada malam hari hanya muncul satu lapisan pada ketinggian (terendah) semu sekitar 200 km dan disebut lapisan F. Lapisan E dan lapisan F tambahan (F1, F1.5, F3) tidak muncul pada malam hari karena proses ionisasi di lapisan ionosfer sedang dalam tingkatan rendah dan tidak cukup untuk membentuk lapisan tambahan tersebut.

Ionogram pada Gambar 4 menunjukkan ciri khas lapisan ionosfer pada siang hari. Pada siang hari tingkat ionisasi di lapisan ionosfer lebih tinggi dibandingkan tingkat ionisasi pada malam hari, karena pada siang hari intensitas energi ionisasi yang datang dari matahari lebih tinggi. Sebagai akibatnya, pada siang hari terjadi/muncul lapisan E, lapisan E-Sporadis, lapisan F1, dan lapisan F2, seperti terlihat pada gambar tersebut. Dari ionogram pada gambar ini juga dapat dilihat bahwa lapisan E dan E-Sporadis muncul pada ketinggian (semu) sekitar 100 km. Lapisan F1 muncul pada rentang ketinggian 200 km hingga ~ 400 km. Dari ketinggian

400 km hingga ~ 500 km muncul lapisan F2. Seperti disinggung sebelumnya, lapisan utama yang muncul pada siang hari dinamakan lapisan F2. ■

Gambar 4 : Ionogram hasil pengamatan menggunakan ionosonda tipe CADI di stasiun kerjasama Manado-Tomohon, pada tanggal 8 Juli 2013 pukul 9 WITA.

Pusat Sains Antariksa - LAPAN memiliki peralatan pengamatan yang tersebar di wilayah Indonesia seperti Pameungpeuk, Sumedang, Pasuruan, Agam, Biak selain itu ada juga lokasi pengamatan yang bersifat kerjasama seperti stasiun Manado dan Kupang. Semua data pengamatan dari setiap lokasi pengamatan tersebut dikumpulkan pada sebuah *server data* (*server BPD/LPD*) yang sudah terhubung ke *server* utama (*bank data*) LAPAN Bandung. *Server bank data* tersebut bisa diakses melalui situs www.bimasaksti.lapan.go.id. Kelengkapan, keakuratan dan ketersediaan data pengamatan sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pengembangan sistem basis data sains antariksa yang akan menyediakan data pengamatan melalui sebuah aplikasi. Kesiapan alat pengamatan dan proses transfer data yang lancar dari *server* di lokasi pengamatan ke *server bank data* menjadi indikator utama dalam ketersediaan layanan data pengamatan, dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.

Monitoring Data Pengamatan Sains Antariksa

Oleh :

Elyyani

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

Tabel 1 : Hasil *monitoring* Bulan September 2016

Data	September 2016																																	
Biak	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Ale	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Cadi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Gistm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Mwr	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Beacon	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Callisto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pontianak	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Ale	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Cadi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MFRadar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Winradio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Beacon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tj.Sari	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Celestron	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Fluxgate	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AWS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RTEC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sn4000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beacon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cadi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Callesito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kupang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Ale	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Cadi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Gistm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Manado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Ale	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fluxgate	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GPS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Beacon	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cadi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Esircadi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Winradio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Pada Tabel 1, tanda silang merah(x) menyatakan data pengamatan tidak ter-update yang disebabkan oleh masalah-masalah teknis bisa diakibatkan karena adanya kerusakan peralatan pengamatan atau karena masalah jaringan dan *transfer data*. Selama bulan September 2016 lokasi pengamatan di Biak secara umum kondisi data pengamatan berjalan baik hanya untuk data ALE dan data Beacon ada sedikit gangguan dan setelah ditindak lanjuti data segera berjalan dengan baik. Di Pontianak, kondisi *monitoring data* secara umum berjalan lancar hanya data Winradio mengalami gangguan total. Hal yang sama untuk lokasi pengamatan Tanjungsari (Sumedang), umumnya data berjalan lancar hanya data Celestron dan Fluxgate sedang mengalami gangguan. Sedangkan pada bulan September 2016, *monitoring data* Kupang dan Manado seluruh data pengamatan tidak ter-update karena *transfer data* dari sisi *server* mengalami gangguan.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Lokasi	Alat	Jenis Alat															
		ALE	Cadi	Gism	MWR	Beacon	Fluxgate	GPS	Beacon	Winradio	MFRadar	LPS71	AWS	RTEC	SSN4000	Calisto	Celestron
Biak		✗		✗	✗				✗								
Kupang		✗	✗	✗													
Manado		✗					✗										
Pontianak		✗	✗														
Tanjung Sari												✗					✗

Pada Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan hasil monitoring data dan jenis data pengamatan selama bulan September 2016. Pada kedua tabel tersebut bisa dilihat bahwa alat pengamatan ALE, CADI, Fluxgate dan Winradio merupakan peralatan yang sering mengalami gangguan selama bulan September 2016 dan perlu perbaikan secepatnya.

Pada Tabel 3 menunjukkan hasil monitoring data selama bulan Oktober 2016, hasil *monitoring data* Biak secara keseluruhan berjalan baik hanya peralatan ALE mengalami kerusakan sejak awal bulan. Kondisi peralatan pengamatan di Pontianak berjalan lancar. Di Tanjungsari, kondisi data baik hanya data Celestron yang mengalami gangguan. Di Manado, monitoring data peralatan GPS, Beacon dan Callisto berjalan lancar.

Tabel 3 dan Tabel 4 menunjukkan kondisi beberapa alat pengamatan sudah mulai ada perbaikan walaupun data ALE,

GISTM, GPS dan Celestron masih mengalami gangguan.

Tabel 5 menunjukkan hasil monitoring data pengamatan bulan November 2016, data pengamatan di Biak untuk data GISTM, MWR dan Beacon tidak stabil. Di Pontianak, hasil *monitoring data* secara keseluruhan baik. Tanjungsari, secara umum kondisi monitoring data baik kecuali data celetron terganggu. Sedangkan di Manado peralatan data GPS dan ALE mengalami gangguan.

Tabel 5 dan Tabel 6 menunjukkan kondisi data pada bulan November 2016, gangguan kembali terjadi pada beberapa data yang bulan sebelumnya sudah mengalami perbaikan seperti data ALE, CADI dan GISTM.

Dilihat dari hasil pemantauan tiga bulan terakhir mulai September - November 2016 kondisi data pengamatan mengalami fluktuasi, akibat dari ketidakstabilan tersebut tentunya akan berpengaruh pada

kualitas data yang dihasilkan. Faktor penyebabnya bisa disebabkan oleh sumber penghasil data dalam hal ini alat pengamatan yang sedang mengalami gangguan ataupun kegagalan atau kesalahan pada saat proses transfer data. Dalam kegiatan monitoring data ini, tingkat kualitas data dapat dipantau perkembangannya. Hasil monitoring dapat dilaporkan secara rutin kepada pihak terkait untuk dievaluasi. Jika ditemukan permasalahan tentang kondisi kualitas data maka segera dilakukan perbaikan. Oleh karena itu kerjasama aktif antara pihak IT dan pihak pengguna alat pengamatan sangat memegang peranan penting agar dapat menghasilkan kualitas data yang baik dengan memperhatikan kelengkapan dan keakuratan data. ■

Aktivitas Matahari Februari - April 2017

Oleh :

R. Kesumaningrum

Peneliti Matahari dan Antariksa

Aktivitas Matahari dalam periode Februari 2017 hingga April 2017 pada awalnya berada pada kondisi tenang dan kemudian meningkat menjadi aktif. Pada bulan Februari 2017, aktivitas matahari berada pada level tenang dan eruptif dimana hanya terjadi 7 *flare* kelas C yang terjadi dari daerah aktif NOAA2635. Kondisi tenang dan eruptif ini masih berlanjut hingga bulan Maret dimana jumlah *flare* kelas C adalah 11 kejadian yang berasal dari daerah aktif NOAA

2644 dan NOAA 2645. Kondisi ini meningkat menjadi aktif pada bulan April 2017 dimana dua daerah aktif NOAA 2644 dan 2645 berkembang cepat menjadi kompleks dan luas, sehingga melepaskan 7 *flare* kelas M selain 47 *flare* kelas C.

Pada bulan Februari, terjadi 6 *flare* kelas C yang berasal dari NOAA 2635. Tanggal 9 Februari 2017, NOAA 2635 melepaskan 3 *flare* C yaitu C1.1, C1.3 dan C1.1. NOAA 2635 mencapai ukuran terbesarnya pada 11 Februari 2017 dengan konfigurasi magnetik *beta* dan luas 110 per sejuta hemisfer (mH) Matahari (Gambar 1). *Flare* kelas C berikutnya berasal dari NOAA 2638, terjadi pada 22 Februari 2017 (C4.1), 23 Februari 2017 (C1.3), dan 24 Februari 2017 (C1.1). NOAA

2638 mulai terlihat tanggal 20 Februari 2017 di tepi timur piringan matahari dan mencapai ukuran terbesarnya pada 24 Februari 2017 dengan luas 150 mH dan konfigurasi *beta-gamma* (Gambar 1). Keseluruhan *flare* pada bulan Februari tidak memicu terjadinya lontaran massa korona (CME).

Gambar 1 : Daerah aktif NOAA 2635 tanggal 11 Februari 2017 (kiri) dan NOAA 2638 tanggal 24 Februari 2017 (kanan) yang melepaskan *flare* kelas C bulan Februari 2017 (Sumber: www.solarmonitor.org).

Aktivitas Matahari pada bulan Februari 2017 cenderung rendah dimana umumnya bintik Matahari yang tampak di fotosfer Matahari berukuran kecil dan sederhana. Daerah aktif tersebut tidak menyebabkan *flare-flare* kuat. Sebaliknya, pada saat aktivitas bintik rendah, lubang korona Matahari tampak signifikan di lapisan korona Matahari. Lubang korona memiliki medan magnet terbuka dan meningkatkan aliran angin Matahari ke Bumi. Beberapa lubang korona di awal Februari berukuran sangat besar bahkan melintasi ekuator Matahari, umumnya terjadi saat aktivitas bintik Matahari rendah (Gambar 2). Aktivitas Matahari pada awal Maret 2017 masih cukup rendah dengan bintik yang berukuran kecil dan

Gambar 2 : Lubang korona (Coronal Hole - CH) trans-ekuatorial yang diamati pada 1 Februari 2017 (atas) dan 18 Februari 2017 (bawah) (Sumber: <https://sdo.gsfc.nasa.gov/> dan www.spaceweather.com).

Gambar 3 : Lubang korona (CH) berukuran besar tanggal 1 Maret, 21 Maret dan 25 Maret 2017 (Sumber: NASA/SDO dan www.spaceweather.com)

sederhana. Lubang korona pun masih terlihat berukuran besar di atmosfer Matahari seperti pada bulan sebelumnya. Pada Maret ini terjadi kondisi Matahari tanpa bintik secara berturut-turut selama 14 hari yaitu dari tanggal 16 hingga 20 Maret 2017. Kondisi Matahari tanpa bintik serupa terjadi sebelumnya pada April 2010 saat mendekati minimum Matahari. Kondisi tanpa bintik ini dapat mengindikasikan minimum Matahari atau saat siklus berikutnya dimulai.

Menjelang akhir Maret, aktivitas Matahari mulai meningkat dengan adanya NOAA 2644 yang berkembang pesat dan semakin kompleks. NOAA 2644 mulai terlihat tanggal 26 Maret 2017 dan terus melepaskan *flare* C sejak awal kemunculan hingga menghilang di balik piringan Matahari pada April

Gambar 4 : NOAA 2644 sejak awal kemunculan di fotosfer matahari tanggal 28 Maret 2017 dengan konfigurasi *beta-gamma* (kiri) dan pengamatan tanggal 3 April 2017 yang masih terus berkembang dan semakin kompleks hingga mencapai ukuran 540 mH dengan konfigurasi *beta-gamma-delta* (kanan) (Sumber: www.solarmonitor.org).

2017. Selama Maret 2017 beberapa *flare* C dari NOAA 2644 berasosiasi dengan semburan radio Matahari tipe III dan CME kecil berkecepatan rendah.

Gambar 5 : *Flare* M4.4 yang diamati pada panjang gelombang 131 Å dan 304 Å pukul 21.35 UT dari NOAA 2644 yang memicu adanya CME di sebelah barat Matahari (Sumber NASA/SDO dan www.solarham.net)

Gambar 6 : *Flare* M5.8 mulai pukul 14:19 UT dari NOAA 2644 pada panjang gelombang 131 Å dan 304 Å yang memicu CME di barat piringan Matahari dengan lebar sudut 46 derajat dan kecepatan maksimum mencapai 992 km/det (Sumber: www.solarham.net, www.spaceweather.com dan <http://sidc.oma.be/cactus/catalog>).

Selama kemunculannya sejak Maret 2017 NOAA 2644 telah melepaskan 22 *flare* kelas C dan 7 *flare* kelas M. NOAA 2644 mencapai maksimum dengan konfigurasi magnetik *beta-gamma-delta* dan menghilang di tepi barat piringan Matahari tanggal 4 April

Gambar 7 : CME halo terdeteksi pukul 20:00 UT yang dipicu oleh adanya *flare* C5.5 pukul 19:21 UT dari NOAA 2651.

Gambar 8 : Daerah aktif NOAA 2645 yang muncul dekat NOAA 2644 pada akhir Maret 2017 hingga awal April 2017 (Sumber: spaceweather.com)

Gambar 9 : NOAA 2646 pada panjang gelombang 6173 Å (kiri) dan magnetogram (kanan) pada saat mencapai maksimum tanggal 4 April 2017 dengan konfigurasi *beta-gamma-delta* dan luas 700 mH (sumber: www.solarmonitor.org).

2017 dengan kondisi aktif berukuran hingga 540 mH.

Pada tanggal 1 April 2017, NOAA 2644 (N16W53) menghasilkan *flare* secara berurutan dimulai dari *flare* C3.7 pukul 19:30 UT berakhir 20:13 UT dan kemudian *flare* M4.4 pada pukul 21:35 UT dan berakhir ada 22:05 UT. *Flare* tersebut memicu CME yang terdeteksi pukul 19:36 UT, berlangsung selama 5 jam dengan lebar sudut 88 derajat dan kecepatan maksimum 919 km/detik (Gambar 5).

Gambar 10 : Erupsi filamen yang memicu CME tanggal 9 April 2017 (atas) dan tanggal 23 April 2017 (Sumber: <https://sdo.gsfc.nasa.gov/data/> dan <http://sidc.oma.be/cactus/catalog/>)

Tabel 1 : Daftar kejadian *flare* dan CME halo parsial periode Februari hingga April 2017

Bulan/ <i>Flare</i>	C	M	X	CME halo parsial
Februari	6	-	-	
Maret	11	-	-	
April	47	7	-	1

Tabel 2 : *Flare* kelas M yang berasal dari NOAA 2644.

Tanggal	<i>Flare</i> Lokasi	Mulai (UT)	Puncak (UT)	Akhir (UT)
1 April 2017	M4.4 N16W53	21:35	21:48	22:05
2 April 2017	M5.3 N12W59	07:50	08:02	08:13
	M2.3	12:52	13:00	13:11
	M2.1 N16W68	18:18	18:38	19:28
	M5.7	20:26	20:33	20:38
3 April 2017	M1.2 N15W75	00:56	01:05	01:12
	M5.8	14:19	14:29	14:34

Flare M lainnya yang berasal dari NOAA 2644 ditampilkan pada Tabel 2. *Flare* terkuat adalah M5.8, dideteksi tanggal 3 April 2017 pada pukul 14:19 UT di lokasi tepi piringan matahari. *Flare* ini mengikuti *flare* C7.3 sebelumnya di hari yang sama pada pukul 13:13 UT, dan memicu terjadinya CME yang terdeteksi pada 13:36 UT dan berlangsung selama 6 jam.

Setelah melepaskan *flare* terkuat, NOAA 2644 menghilang di barat piringan Matahari dan kembali pada rotasi berikutnya tanggal 17 April 2017 sebagai NOAA 2651. Daerah aktif tersebut kemudian melepaskan 3 *flare* kelas C tanggal 17 dan 18 April 2017. Salah satu *flare* dari NOAA 2651 yaitu C5.5 pada pukul 19:21 UT dan berakhir pukul 20:49 UT, memicu CME halo

Tabel 3 : Prediksi bilangan sunspot bulanan periode April 2017 - Maret 2018

Bulan	Prediksi Bilangan Sunspot
April 2017	25,3 ± 3
Mei 2017	24,1 ± 4
Juni 2017	23,8 ± 4
Juli 2017	24,6 ± 5
Agustus 2017	26,8 ± 5
September 2017	26,6 ± 6
Oktober 2017	27,3 ± 7
November 2017	28,8 ±
Desember 2017	28,7 ± 8
Januari 2018	27,8 ± 8
Februari 2018	26,9 ± 9
Maret 2018	26,1 ± 9

(metode filter Kalman, <http://sidc.oma.be/products/kalfil/>).

tanggal 18 April 2017 pukul 20:00 UT (Gambar 7).

Daerah aktif lainnya yang eruptif sejak akhir Maret hingga April 2017 bersamaan dengan adanya NOAA 2644 adalah NOAA 2645 (Gambar 8).

Bintik terlihat mulai tanggal 28 Maret 2017 dan dalam 2 hari konfigurasinya meningkat menjadi beta-gamma. NOAA 2645 adalah daerah aktif terbesar pada periode ini dimana maksimum luas mencapai 700 mH dengan konfigurasi magnet *beta-gamma-*

delta ($\beta\gamma\delta$) tanggal 4 April 2017. Selama bulan Maret, NOAA 2645 melepaskan *flare* C sebanyak 14 kali sementara pada April 2017 melepaskan *flare* C sebanyak 23 kali. Bintik tersebut kemudian menghilang dari barat piringan Matahari tanggal 8 April 2017. Meskipun NOAA 2645 adalah daerah aktif terbesar pada periode ini, namun *flare* yang dilepaskan hanya pada kelas C.

Pada 9 April 2017 terjadi erupsi filamen di bagian timur piringan Matahari, sekitar pukul 23 UT yang

memicu CME terdeteksi pukul 01:25 UT dengan kecepatan maksimum hanya 272 km/detik. Erupsi filamen juga terjadi pada 23 April 2017 sekitar pukul 05:00 UT dan memicu CME yang terdeteksi pukul 06:00 dengan kecepatan maksimum mencapai 1953 km/detik (Gambar 10).

Pada akhir April 2017, aktivitas matahari kembali rendah dengan daerah aktif sederhana dan berukuran kecil di fotosfer matahari. ■

Aktivitas Geomagnet Februari - April 2017

Oleh :

F. Nuraeni

C. E. Haryanto

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

Pada bulan Februari hingga April 2017 kondisi aktivitas geomagnet dapat dikatakan relatif tenang. Terlihat pada bulan Februari 2017 aktivitas geomagnet paling kuat yang terjadi adalah level aktif seperti yang ditunjukkan di Gambar 1. Indeks Dst terendahnya terjadi pada tanggal 1 Februari 2017 yang mencapai -45 nT dan -43 nT pada 3 Februari 2017. Respon lokal berdasarkan indeks K dari Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (BPAA) Agam untuk tanggal 1 Februari 2017 adalah 3 yang menyatakan kondisi aktivitas geomagnet tenang dan 4 pada tanggal 3 Februari 2017 yang menyatakan kondisi aktif, seperti dapat dilihat pada Gambar 2. Sedangkan indeks K dari stasiun pengamat geomagnet kerjasama LAPAN dan BMKG di Stasiun Geofisika Kupang dapat dilihat pada Gambar 3, menunjukkan nilai 4 pada tanggal 1 Februari 2017,

hanya untuk tanggal 3 Februari 2017 tidak ada data yang diperoleh dari stasiun Kupang tersebut sehingga responnya tidak dapat diketahui. Kondisi aktif pada awal bulan Februari ini kemungkinan dipicu oleh aliran plasma berkecepatan tinggi yang berasal dari lubang korona geoeftif. Kecepatan angin surya pada tanggal 1 Februari 2017 mencapai 734 km/detik dan sedikit menurun pada tanggal 3 Februari 2017 menjadi 606,8 km/detik.

Pada bulan Maret 2017, kondisi geomagnet terganggu hingga level badai lemah sebanyak 2 kali dan 1 kali gangguan geomagnet dalam level aktif, diperlihatkan pada Gambar 4. Gangguan geomagnet dalam skala badai lemah puncaknya terjadi pada 1 Maret 2017 pukul 22:00 UT dengan indeks Dst terendah mencapai -61 nT. Di regional Indonesia gangguan pada tanggal 1 Maret tersebut tercatat sebagai kondisi aktif sebagaimana terekam pada indeks K dari BPAA Agam yang mencapai nilai 4, seperti dapat dilihat dalam Gambar 5. Hal berbeda ditunjukkan oleh indeks K dari stasiun kerjasama LAPAN dan BMKG di Kupang yang diperlihatkan pada Gambar 6, kondisi geomagnet lokal aktif baru

terjadi pada tanggal 2 Maret 2017 dini hari UT atau pukul 09:00 waktu lokal. Gangguan geomagnet berupa badai lemah tersebut disebabkan oleh aliran plasma berkecepatan tinggi yang berasal dari lubang korona geoeftif yang memanjang dari kutub selatan hingga ke bagian Barat ekuator Matahari. Kecepatan angin surya pada saat itu mencapai 655,3 km/detik.

Gangguan geomagnet selanjutnya memiliki level aktif, terjadi pada tanggal 21 Maret 2017 hingga 23 Maret 2017 dengan indeks Dst terendah adalah -35 nT. Di daerah lintang tinggi gangguan geomagnet yang terjadi mencapai level badai lemah ditandai dengan indeks Kp pada saat itu yang mencapai 5, meskipun begitu tampaknya energi gangguan tersebut tidak cukup kuat untuk mempengaruhi daerah ekuator dan lintang rendah. Penyebab gangguan pada saat itu diperkirakan berasal dari aliran plasma berkecepatan tinggi dari lubang korona geoeftif yang cukup besar dan berada di ekuator Matahari. Kondisi aktif ini berlangsung selama 3 hari ditandai juga dengan *trend* kecepatan angin surya yang menaik mulai dari 500 km/detik menjadi 900 km/detik pada tanggal 22 Maret 2017,

kemudian menurun pada tanggal 23 Maret 2017 mencapai 600 km/detik.

Badai geomagnet skala lemah berikutnya di bulan Maret 2017 yang terdeteksi di daerah lintang rendah dan ekuator terjadi pada 27 Maret 2017. Indeks Dst terendah pada saat itu adalah -74 nT. Badai geomagnet ini disebabkan oleh aliran plasma berkecepatan tinggi yang berasal dari lubang korona geoeftif yang memanjang dari bagian Tenggara hingga ekuator Matahari. Fasa pemulihan dari badai lemah ini berlangsung selama 6 hari hingga tanggal 2 April 2017. Hal ini disebabkan lubang korona yang menjadi sumber aliran plasma penyebab gangguan geomagnet ini bertahan cukup lama.

Pada bulan April 2017, gangguan geomagnet kembali terjadi dalam skala aktif dan badai lemah berdasarkan indeks Dst yang

dapat dilihat pada Gambar 7. Pada 4 April 2017 kondisi geomagnet dalam level aktif dengan indeks Dst minimum mencapai -44 nT. Kondisi aktif ini tidak berlangsung lama hanya selama 14 jam kondisi geomagnet sudah kembali tenang. Penyebab gangguan geomagnet ini adalah komponen Z medan magnet antar planet yang mengarah ke Selatan menyebabkan terjadinya celah pada magnetosfer yang dapat menyebabkan partikel dari angin surya dapat memasuki magnetosfer. Kondisi aktif juga terjadi pada tanggal 20 April 2017 dengan indeks Dst terendah mencapai -39 nT. Kondisi aktif ini tidak berlangsung lama, disusul dengan gangguan geomagnet dalam skala badai lemah pada tanggal 21 April 2017. Badai geomagnet skala lemah ini puncaknya terjadi pada 22 April 2017 pukul 17:00 UT dengan indeks Dst mencapai -50 nT. Penyebab

badai geomagnet skala lemah ini adalah aliran plasma berkecepatan tinggi yang berasal dari lubang korona geoeftif di bagian Barat ekuator Matahari. Fasa pemulihan gangguan geomagnet kali ini berlangsung selama 4 hari hal tersebut karena lubang korona sumber aliran plasma yang menjadi penyebab gangguan digantikan dengan lubang korona lain yang cukup besar dan berada di ekuator Matahari, sehingga sangat geoeftif.

Sepanjang Februari - April 2017 ini gangguan geomagnet lebih banyak disebabkan oleh aliran plasma berkecepatan tinggi yang berasal dari lubang korona yang geoeftif. Hal tersebut karena pada saat ini aktifitas Matahari sedang dalam fasa minimum sehingga *flare* dan lontaran massa korona jarang terjadi. ■

Gambar 1 : Indeks Dst Februari 2017 (http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_realtime/201702/index.html)

Gambar 4 : Indeks Dst bulan Maret 2017 (http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_realtime/201703/index.html)

Gambar 7 : Indeks Dst bulan April 2017 (http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_realtime/201703/index.html)

Gambar 2 : Indeks K bulan Februari 2017 dari BPAA Agam

Gambar 5 : Indeks K tanggal 1-10 Maret 2017 dari BPAA Agam

Gambar 3 : Indeks K bulan Februari 2017 dari Stasiun Geofisika Kupang BMKG

Gambar 6 : Indeks K tanggal 1-10 Maret 2017 dari Stasiun Geofisika Kupang BMKG

Aktivitas Sintilasi Ionosfer di Atas Bandung dan Biak Februari - April 2017

Oleh :

A. S. Mardiani

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

Aktivitas sintilasi ionosfer yang diamati di stasiun Bandung dan Biak periode Februari hingga April 2017 tersajikan pada Tabel 1. Aktivitas sintilasi tersebut diamati menggunakan perangkat *GPS Ionospheric Scintillation and TEC Monitoring* (GISTM). Pada tabel tersebut, aktivitas sintilasi dikelompokkan dalam enam skala berdasarkan nilai indeks S4 dan durasi terjadinya sintilasi. Skala quiet (tenang) mengindikasikan kondisi tenang yaitu tidak terjadi sintilasi pada lapisan ionosfer. Sedangkan skala *extreme* merupakan skala tertinggi yang mengindikasikan adanya sintilasi sangat kuat dengan durasi lebih dari 2 jam pada malam hari.

Pada bulan Februari 2017, aktivitas sintilasi ionosfer cenderung tenang dan mengalami peningkatan aktivitas pada akhir bulan dengan teramatinya sintilasi skala *moderate* baik di stasiun

Bandung dan Biak. Persentase sintilasi ionosfer skala *moderate* di atas Bandung adalah sebesar 21,43% dan di atas Biak adalah sebesar 10,71%. Peningkatan aktivitas sintilasi ionosfer ini dikarenakan pada akhir bulan Februari posisi pusat Matahari mendekati bidang ekuator Bumi.

Memasuki bulan ekuinoks, yakni bulan Maret, yang mana posisi pusat Matahari berada sebidang dengan ekuator Bumi, sintilasi ionosfer lebih sering teramati baik dari stasiun Bandung maupun stasiun Biak. Meskipun secara persentase kondisi tenang masih dominan pada bulan ini, yaitu sebesar 48% di stasiun Biak dan Bandung, kondisi sintilasi skala *moderate* juga sering terjadi. Di stasiun Biak, persentase kemunculan sintilasi *moderate* adalah sebesar 29% dan di stasiun Bandung sebesar 32%. Kejadian sintilasi skala *strong* tercatat muncul

selama 5 hari dalam satu bulan di stasiun Biak dan hanya satu kali terjadi di stasiun Bandung. Sintilasi dengan skala *severe* terjadi hanya satu kali di stasiun Biak yang ditunjukkan pada Gambar 1 (b). Pada gambar tersebut, terlihat adanya sintilasi dengan indeks S4 yang lebih besar dari 0,5 selama mencapai 2 jam. Peningkatan kemunculan sintilasi ionosfer pada bulan ini disebabkan oleh formasi pusat Matahari berada di bidang yang sama dengan ekuator Bumi. Pada posisi tersebut medan magnet dan terminator Matahari menyebabkan adanya *drift* EXB di lapisan ionosfer daerah ekuator sehingga meningkatkan ketidakteraturan plasma.

Pada bulan April, kemunculan sintilasi ionosfer mulai berkurang seiring dengan posisi pusat matahari yang perlahan menjauhi bidang ekuator Bumi. Kondisi tenang masih dominan pada bulan ini yaitu sebesar 71% di stasiun Bandung dan 84% di stasiun Biak. Pada awal April, tanggal 1 dan 2 April, sintilasi skala *moderate* masih teramati di stasiun Bandung. Di stasiun Biak, aktivitas sintilasi ionosfer pada skala *strong* teramati pada tanggal 13 April 2017. ■

Koneksitas Jaringan ALE-LAPAN dan Indeks T Regional

Oleh :

S. Anggarani

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

Dari pengamatan jaringan komunikasi *Automatic Link Establishment* (ALE) sirkit komunikasi Watukosek - Bandung (jarak 571 km) selama bulan Maret 2017, frekuensi 7 MHz tercatat memiliki keberhasilan relatif tinggi

sepanjang siang dan malam hari, namun tidak dapat digunakan pada pukul 01.00 - 05.59 WIB. Frekuensi 10 MHz memiliki keberhasilan tinggi pada pukul 10.00 - 19.59 WIB serta memiliki keberhasilan rendah pada pukul 9.00 - 9.59 WIB & 20.00 - 20.59 WIB. Frekuensi 14 MHz memiliki keberhasilan rendah pada siang hari yaitu pukul 13.00 - 17.59 WIB.

Selama bulan April 2017, keberhasilan komunikasi tinggi pada frekuensi 7 MHz terjadi pada pukul 6.00 - 10.59 WIB, pukul 12.00 - 12.59 WIB, serta pada pukul 17.00 - 18.59 WIB. Keberhasilan komunikasi rendah pada frekuensi 7 MHz terjadi pada pukul 11.00 - 11.59 WIB, 14.00 - 16.59 WIB serta 19.00 - 19.59 WIB. Keberhasilan komunikasi rendah & tinggi pada frekuensi 10 MHz terjadi pada pukul 8.00 - 19.59 WIB sedangkan untuk frekuensi 14 MHz, hanya terjadi keberhasilan komunikasi

rendah pada pukul 12.00 - 18.59 WIB. Secara umum, terjadi penurunan keberhasilan komunikasi pada frekuensi 7 MHz & 10 MHz namun terdapat peningkatan durasi keberhasilan komunikasi tingkat rendah pada frekuensi 14 Mhz.

Untuk rekomendasi frekuensi terbaik dalam komunikasi HF,

dapat dilihat pada buku prediksi edisi triwulan III tahun 2017 yang diterbitkan LAPAN. LAPAN juga melayani prediksi frekuensi komunikasi HF dengan sirkit yang lebih spesifik, sesuai permintaan pengguna. Tabel 2 memuat indeks T Regional Indonesia untuk bulan Juli 2017 - Juni 2018. ▣

Tabel 2 : Keberhasilan komunikasi sirkit Watukosek - Bandung selama Maret - April 2017

SIRKUIT/FREKUENSI	WAKTU (WIB)																							
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Maret 2017																								
WATUKOSEK - BANDUNG																								
7.0495	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
7.102	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
10.1455	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
14.109	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
April 2017																								
7.0495	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
7.102	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
10.1455	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
14.109	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆

Keterangan : ☆ Keberhasilan komunikasi tinggi
☆ Keberhasilan komunikasi rendah
☆ Keberhasilan tidak berhasil

Tabel 1 : Indeks T Regional Indonesia periode April 2017 -

Review Cuaca Antariksa Februari - April 2017

Oleh :

M. Juangsih

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

Kondisi cuaca antariksa pada periode Februari-April 2017 mengalami beberapa kali peningkatan aktivitas Matahari dan peningkatan aktivitas geomagnet mulai dari aktif sampai badai lemah serta gangguan di ionosfer. Peningkatan aktivitas Matahari terlihat dari kejadian *flare* mulai dari kelas B sampai kelas M dan juga kemunculan lubang korona geoeftif yang mengakibatkan gangguan geomagnet.

Pada bulan Februari 2017, daerah aktif NOAA 2635 menghasilkan tiga kejadian *flare* dengan kelas maksimum C1.3 pada tanggal 9 Februari 2017, kemudian tanggal 22 Februari 2017 terjadi lagi *flare* dengan kelas C4.1 yang berasal dari daerah aktif NOAA 2638. Selain kejadian *flare*, kemunculan lubang korona yang cukup besar beberapa kali menyebabkan peningkatan kecepatan angin Matahari, peningkatan densitas, dan penurunan medan magnet antar planet.

Lubang korona yang cukup besar dan mulai geoeftif pada tanggal 30 Januari 2017,

menyebabkan terjadinya aliran plasma angin Matahari yang berkecepatan tinggi (*fast moving-stream of solar wind*) sehingga aktivitas geomagnet meningkat pada skala aktif dengan indeks K mencapai 4 dan indeks Dst mencapai -43. Gangguan geomagnet ini diikuti dengan gangguan ionosfer yang terlihat dengan adanya penurunan foF2 selama 5 jam, artinya termasuk kedalam kategori badai ionosfer tingkat menengah. Gangguan ionosfer ini dapat menyebabkan gangguan komunikasi radio. Selain itu, lubang korona geoeftif tanggal 13 Februari 2017 juga menyebabkan gangguan geomagnet pada skala aktif (Gambar 1).

Memasuki bulan Maret 2017, beberapa daerah aktif baru mulai muncul, akan tetapi daerah aktif tersebut memiliki kompleksitas yang relatif rendah dan cenderung stabil, sehingga kondisi aktivitas Matahari cenderung tenang. Pada akhir bulan terjadi peningkatan yang menghasilkan beberapa *flare* kelas C. Lubang korona yang cukup besar dan memanjang dari ekuator sampai kutub selatan Matahari muncul/tampak dan mulai geoeftif pada tanggal 25 Maret 2017 (Gambar 2) dan menyebabkan aliran plasma angin Matahari yang berkecepatan tinggi (*fast moving-stream of solar wind*) sehingga menimbulkan gangguan geomagnet pada skala badai lemah tanggal 27 Maret 2017, terlihat dari indeks Dst yang mencapai -74 nT dan indeks Kp mencapai 6.

Selama bulan April 2017, aktifitas Matahari, geomagnet dan ionosfer meningkat cukup signifikan. Awal April, Matahari menghasilkan sejumlah *flare* kelas-M, puncaknya adalah *flare* M5.8 pada tanggal 3 April 2017. *Flare* tersebut berasal dari daerah aktif NOAA 2644 (Gambar 3) dan menghasilkan CME dengan lebar sudut sebesar 78° dan kecepatannya

Gambar 1 : Lubang korona Matahari diamati oleh SDO/AIA pada panjang gelombang 193Å tanggal 13 Februari 2017. (Sumber: <https://solarmonitor.org/>)

mencapai 437 km/s (Gambar 4 kiri). Selain NOAA 2644, terdapat juga daerah aktif NOAA 2645 yang menghasilkan beberapa *flare* kelas C (Gambar 3). Kejadian ini mengakibatkan magnetosfer terganggu, medan magnet antar planet mengalami penurunan dan kondisi geomagnet meningkat ke level aktif pada tanggal 4 April 2017 dengan indeks Dst minimum -44 nT. Pada tanggal 5 April 2017, ionosfer mengalami gangguan kondisi minor yang terlihat dari penurunan foF2 selama 1.5 jam, kenaikan fmin lebih dari 30% dari nilai median, dan terbentuknya

Gambar 2 : Lubang korona Matahari diamati oleh SDO/AIA pada panjang gelombang 193Å tanggal 25 Maret 2017. (Sumber: <https://solarmonitor.org/>)

Gambar 3 : Citra *flare* M5.8 di atas daerah aktif NOAA 2644 dan *flare* kelas C di atas daerah aktif NOAA 2645 pada tanggal 2 April 2017. (Sumber : <https://solarmonitor.org/>)

lapisan E-Sporadis pada siang hari dengan nilai foEs dibawah foF2.

Pada tanggal 18 April 2017, terjadi lagi *flare* kelas C yang berasal dari NOAA 2651. *Flare* C5.5 ini menghasilkan CME tipe IV dengan lebar sudut sebesar 324° dan kecepatan mencapai 1008 km/s (Gambar 4 kanan). Selain *flare*, lubang korona yang juga terlihat di permukaan Matahari (Gambar5), menghasilkan aliran plasma berkecepatan tinggi. Kondisi ini, mengakibatkan gangguan geomagnet pada skala aktif tanggal 20 April 2017 dengan indeks Dst mencapai -44 nT. Dua hari kemudian, indeks Dst mengalami penurunan kembali menjadi -50 nT pada tanggal 22 April 2017 sehingga gangguan geomagnet berada pada skala badai lemah. ▣

Gambar 4 : Lontaran massa korona yang diamati oleh SOHO/LASCO. Kiri : CME pada tanggal 3 April 2017, kanan : CME tanggal 18 April 2017. (Sumber : <http://www.sidc.oma.be/cactus/>)

Gambar 5 : Lubang korona Matahari diamati oleh SDO/AIA pada panjang gelombang 193Å tanggal 18 April 2017. (Sumber : <https://solarmonitor.org/>)

Rukyatul Hilal Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang di Bukit Syekh Bela-Belu Yogyakarta

Oleh :

E. R. Saptianna

Balai Pengamatan Antariksa
dan Atmosfer Sumedang - LAPAN

Di Indonesia, metode yang digunakan untuk menentukan masuknya Bulan baru yang menandakan pergantian bulan dalam kalender Hijriyah adalah hisab rukyat. Hisab merupakan perhitungan astronomis dan matematis sedangkan rukyat merupakan pengamatan visibilitas hilal untuk menentukan awal bulan Hijriyah. Berbicara tentang rukyat, istilah tersebut sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Walaupun pada kenyataannya sebagian masyarakat tidak memahami pengertian istilah tersebut. Istilah rukyat sempat menjadi bahan pembicaraan hangat dimasyarakat. Hal itu tidak terlepas dari adanya selisih atau perbedaan pendapat di kalangan ahli. Namun belakangan ini masyarakat sudah mulai cerdas untuk tidak larut dalam polemik tentang rukyat.

Rukyatul hilal awal adalah kriteria penentuan awal bulan Hijriyah dengan melihat hilal secara langsung. Pada tahun 2017, beberapa institusi baik pemerintah maupun kalangan akademisi dan komunitas astronomi melakukan pengamatan rukyatul hilal di beberapa lokasi untuk menentukan jatuhnya 1 Ramadhan 1438 Hijriyah. Tidak terkecuali LAPAN yang secara rutin terus melaksanakan kegiatan tersebut. Beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di LAPAN juga terlibat secara langsung di beberapa lokasi pengamatan yang berbeda.

Ada sekitar delapan institusi melaksanakan rukyatul hilal awal Ramadhan di daerah sekitar Yogyakarta pada tanggal 26 Juni 2017 dimana salah satunya adalah Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (BPAA) LAPAN Sumedang yang beranggotakan tiga personil, yaitu Aries Kurniawan, S.T., Gerhana Puannandra Putri, S.Si., dan Adhitia Wiguna. Acara ini dibawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan dilaksanakan di Bukit Syekh Bela-belu Pantai Parangtritis Bantul, Bukit Patuk Gunung Kidul dan Pantai Trisik Kulon Progo. BPAA LAPAN Sumedang memilih lokasi tersebut merupakan hasil koordinasi dengan pihak Kanwil Kemenag Yogyakarta dan BMKG Yogyakarta. Acara ini juga diikuti oleh komunitas astronomi setempat.

Acara dimulai dengan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Yogyakarta. dan dilanjutkan dengan penjelasan

tentang hilal oleh Mutoha Arkanuddin dari komunitas astronomi, Jogja Astro Club (JAC). Terdapat sekitar delapan buah teleskop yang terpasang di lokasi pengamatan yang berasal dari berbagai institusi dan komunitas astronomi. Tim dari BPAA LAPAN Sumedang menggunakan Teleskop Lunt Engineering 70ED, Mounting iOptron Mini Tower II, dan Detektor CCD Kamera ZWO ASI 174MC.

Kondisi cuaca cerah sejak persiapan pemasangan teleskop tetapi mulai tampak awan tipis menyelimuti daerah bidikan teleskop menjelang Matahari terbenam. Hal ini mengakibatkan pengamatan hilal dengan mata biasa menjadi terganggu karena ketampakan hilal sangatlah tipis. Setelah berbagai upaya dilakukan, akhirnya hilal yang dinantikan terlihat dengan bantuan teleskop walaupun sangat sulit dan tidak begitu jelas karena terhalang oleh awan tipis. ■

Gambar 1 : Citra hilal yang diamati dan diproses secara sederhana untuk dipublikasikan langsung ke masyarakat.

Eureka, Saat Peralatan Astronomi Bertemu Fenomena Geofisika di Lapisan Ionosfer

Oleh :

D. R. Martiningrum

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

Para peneliti di bidang Ionosfer tentu sudah sangat mengenal fenomena yang disebut dengan *Equatorial Plasma Bubbles*, yaitu kondisi ketidakaturan di lapisan ionosfer yang prosesnya terjadi tidak lama sesudah Matahari terbenam. Saat Matahari mulai terbenam, penipisan kerapatan elektron dalam skala yang besar terjadi di bagian bawah lapisan F ionosfer. Gelembung plasma dengan kerapatan elektron lebih kecil mendorong ke lapisan dengan kerapatan elektron yang lebih besar. Gelembung-gelembung plasma tersebut, kita kenal sebagai *Equatorial Plasma Bubbles* (EPB), kemudian terus naik dan berkembang ke ketinggian lebih tinggi dan terjadi sampai beberapa jam. Gelembung-gelembung plasma inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya ketidakaturan plasma di lapisan ionosfer yang berpotensi mengganggu sistem komunikasi dan sistem navigasi pada daerah di sekitar ± 20 derajat lintang geomagnet ekuator (Gambar 1). Karena gelembung-gelembung plasma ini berinteraksi dengan garis-garis medan magnet Bumi maka dia akan terbentuk sepanjang medan magnet Bumi. (Gambar 2). Saat EPB berkembang, maka sinyal gelombang radio yang menjalar melalui daerah tersebut akan mengalami gangguan. Gangguan tersebut teramati dari alat ionosonda berupa *spreading frekuensi*, ketinggian, ataupun keduanya (frekuensi dan ketinggian), sehingga fenomena ini

dinamakan juga sebagai *Equatorial Spread F* (ESF). Di samping itu, ketika gelombang radio menjalar melalui lapisan tersebut, maka amplitudo dan fasenya akan terganggu sehingga menyebabkan terjadinya sintilasi dalam penalaran sinyal satelit.

Begitu menarik dan pentingnya memahami fenomena *Equatorial Plasma Bubbles* ini, sehingga sampai lebih dari 60 tahun masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, terutama terkait bagaimana variasi hariannya. Pemahaman lebih baik dan detail

Gambar 1 : Gambaran tentang fluktuasi kerapatan elektron di lapisan ionosfer pada saat Matahari mulai terbenam.

tentang karakteristik EPB akan sangat bermanfaat dalam pemodelan fenomena tersebut.

Saat para peneliti lapisan ionosfer sedang sibuk mencari jawab pertanyaan-pertanyaan terkait ketidakaturan di lapisan ionosfer, di suatu tempat lain di negara kanguru Australia, tepatnya di Universitas Sydney, seorang mahasiswa strata satu di bidang fisika (astronomi) sedang mendapat tantangan dari pembimbingnya untuk memecahkan masalah terkait peralatan yang mereka gunakan yaitu radioteleskop. Saat itu mereka sedang mengerjakan suatu penelitian tentang variabilitas bintang dan galaksi menggunakan radioteleskop yang baru, *the Murchison Widefield Array* (MWA). MWA terdiri dari 128 antenna 'tile'

Gambar 2 : Visualisasi gelembung plasma (EPB) di sekitar wilayah ekuator yang terbentuk di lapisan ionosfer, berkembang mengikuti garis-garis medan magnet Bumi (lengkungan2 berwarna kuning)

Gambar 3 : *The Murchison Widefield Array*

yang dibangun dalam area seluas kurang lebih 7 km² (Gambar 3). Antenna tersebut dibagi dua, setengah difungsikan sebagai 'right eye' di sebelah Barat dan setengahnya lagi sebagai 'left eye' di sebelah Timur. Merujuk dari cara manusia menggunakan matanya untuk melihat, maka dengan metode triangulasi dibuatlah peta dinamik 3D dari atmosfer atas yang mereka amati, yang kemudian menjadi hasil temuan terbaru tentang visualisasi dari ketidakstabilan plasma di atmosfer atas.

Pembimbing mahasiswa tersebut, Dr. Tara Murphy khawatir akan bermasalah dengan peralatan tersebut terutama karena sifat lapisan ionosfer yang akan membelokkan gelombang radio berfrekuensi rendah yang berasal dari luar angkasa. Oleh karenanya, Cleo Loi - nama mahasiswa tersebut mendapat tugas untuk mencari

tahu sejauh mana lapisan ionosfer akan mempengaruhi hasil pengamatan mereka menggunakan radioteleskop.

Cleo Loi dibantu oleh salah seorang peneliti *postdoctoral* dari Curtin University Natasha Hurley-Walker kemudian berusaha mengkompilasi dan mengolah data dari radioteleskop tersebut. Menandai setiap malam kapan lapisan ionosfer mempengaruhi pengamatan mereka dan mencoba mencari cara menggambarkan secara visual dampak pembelokan sinyal gelombang radio oleh lapisan ionosfer tersebut dalam bentuk peta dan animasi. Ketika melihat hasil yang sangat menarik tersebut, awalnya dianggap sebagai sesuatu yang kebetulan saja, apalagi Cleo Loi tidak punya latar belakang keilmuan di bidang fisika kebumih. Namun setelah berkomunikasi dengan para senior dan peneliti lainnya maka mereka

akhirnya diyakinkan bahwa telah ditemukan hal baru yaitu visualisasi fenomena ketidakaturan lapisan ionosfer dari pengamatan radioteleskop MWA. Hasil-hasil temuan itu kemudian dipublikasikan dalam jurnal Geophysical Research Letters vol. 42, tahun 2015 dengan judul *Real Time Imaging of Density Ducts between the Plasmaphase and Ionosphere*. ■

Referensi :

1. The Sidney Morning Herald, 1 Juni 2015, Technology <http://theconversation.com/how-an-undergraduate-discovered-tubes-of-plasma-in-the-sky-42810>
2. Geophys. Res. Lett., 42, 3707-3714, doi:10.1002/2015GL063699.
3. Geophys. Res. Lett., 42, 3707-3714, doi:10.1002/2015GL063699.
4. Jurnal Fisika dan Aplikasinya Vol 12, No. 1, tahun 2016

Kunjungan ke Fasilitas Riset Astronomi Untuk Persiapan Membangun Observatorium Nasional

Oleh :

M. Z. Nurzaman

Peneliti Matahari dan Antariksa

Pembangunan Observatorium Nasional (Obnas) merupakan salah satu program utama LAPAN. Dasar hukum dari program ini adalah UU No 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Obnas akan dibangun di Kabupaten Amfoang Tengah, Kupang, NTT.

Keberadaan Obnas yang tidak hanya menjadi ikon nasional serta membantu mengembangkan pendidikan di wilayah timur Indonesia juga diharapkan menjadi kebanggaan Indonesia di dunia internasional. Untuk mewujudkan Obnas yang mampu bersaing di

dunia internasional, diperlukan sumber daya manusia dan perencanaan pembangunan yang matang. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah dengan mempelajari langsung ke observatorium terbaik berkelas dunia.

Fasilitas pengamatan astronomi di Research School of Astronomy and Astrophysics (RSAA) dari The Australian National University (ANU) adalah salah satu tempat yang dikunjungi oleh tim (peneliti LAPAN dan dosen astronomi ITB). Observatorium yang dioperasikan

oleh RSAA adalah Observatorium Siding Spring dan Observatorium Mount Stromlo yang sudah dikenal dunia dengan berbagai hasil pengamatannya.

Di Observatorium Mount Stromlo, tim mempelajari hal-hal teknis mengenai pengelolaan sebuah observatorium, diantaranya manajemen organisasi observatorium, pengaturan waktu penggunaan sebuah teleskop, teknologi instrumentasi yang digunakan teleskop, kegiatan pendidikan untuk publik, serta hal-hal teknis lainnya. Di sini tim juga

berinteraksi langsung dengan para ahli di bidangnya masing-masing serta diajak berkeliling melihat fasilitas canggih untuk membuat instrumen seperti spektograf. Observatorium ini mengembangkan sendiri instrumen pengamatan untuk teleskopnya dan dapat menerima pesanan untuk teleskop lain di luar negeri.

Sementara di Observatorium Siding Spring informasi yang didapatkan adalah mengenai seluk-beluk teleskop 3,9 meter milik Australia Astronomy Observatory (AAO). Tim mendapat kesempatan melihat langsung ruang pengamatan, ruang penyimpanan spektograf dan CCD kamera, *vacuum chamber* untuk mengaluminisasi cermin, hingga lengan robotik untuk menggerakkan kabel fiber di teleskop (Gambar 1). Banyak hal yang bisa dipelajari disini untuk persiapan teleskop di Obnas yang rencananya mempunyai diameter 3,8 meter.

Kunjungan juga dilakukan ke teleskop 2,4 meter milik ANU yang sudah menggunakan sistem remote. Dengan sistem remote, pengamat tidak perlu datang ke observatorium untuk melakukan pengamatan. Kendali dapat dilakukan dari Sydney atau Canberra, yang berjarak 500-an km, untuk mengontrol teleskop dan kubahnya.

Selain teleskop berukuran besar 3,9 m, Observatorium Siding Spring memiliki teleskop penjejak langit berukuran 1 meter dan sejumlah teleskop berukuran di bawah 1 meter untuk berbagai keperluan. Bahkan terdapat juga teleskop milik *space agency* Korea Selatan dan negara lainnya. Jadi secara keseluruhan observatorium Siding Spring terdiri atas banyak teleskop dengan ukuran beragam untuk keperluan saintifik berbeda.

Teleskop-teleskop tersebut dimiliki oleh instansi yang berbeda-beda.

Berlokasi dekat dengan observatorium Siding Spring, ada teleskop radio Parkes yang berdiameter 64 meter yang bersejarah. Teleskop ini sudah berumur lebih dari 50 tahun dan merupakan salah satu penerima siaran radio saat misi Apollo 11 mendaratkan manusia di Bulan. Teleskop radio Parkes masih digunakan untuk penelitian ilmiah sampai saat ini khususnya penelitian tentang pulsar, yaitu Bintang yang mempunyai kecepatan rotasi hingga mili-detik.

Selama seminggu terakhir studi ini, tim mengunjungi kantor pusat AAO, kantor pusat *Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation* (CSIRO) bagian astronomi dan antariksa khususnya teleskop radio, dan Observatorium Sydney yang terletak di dekat pusat kota Sydney (Gambar 2). Kunjungan juga dilakukan kepada penggagas program pendidikan untuk siswa tentang sejarah lengkap alam semesta dan manusia itu sendiri, *The Big History*, Prof. David

Christian. Dari kunjungan tersebut, tim memperoleh berbagai informasi seperti manajemen organisasi penelitian astronomi serta sedikit informasi pengelolaan dananya, aspek edukasi untuk masyarakat umum dari sebuah observatorium, dan cara berbagai lembaga penelitian astronomi saling berkompetensi sekaligus berkolaborasi demi kemajuan astronomi.

Beberapa hal menjadi catatan penting dalam kunjungan ini yakni observatorium kelas dunia harus mempunyai manajemen organisasi yang transparan dan SDM yang baik, orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing, serta mau bekerja sama satu sama lain dengan etos kerja tinggi. Selain itu, kolaborasi dan kompetisi yang sehat dengan instansi dalam maupun luar negeri merupakan hal yang penting dan semuanya itu mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. Selain mendapatkan ilmu, tim juga menemukan adanya peluang kolaborasi dengan RSAA ANU dan AAO. Mereka sangat terbuka untuk

Gambar 1 : Kiri: Teleskop 3,9 meter di Observatorium Siding Spring.
Kanan: Lengan robotik teleskop 3,9 meter.

mem bantu kelancaran pembangunan Obnas Timau nanti. Beberapa peluang yang ditawarkan RSAA ANU antara lain instrumen spektograf buatan mereka untuk dipasang di obnas Timau, program pertukaran mahasiswa, serta kunjungan profesor-profesor astronomi ke Indonesia. ■

Gambar 2 : Observatorium Sydney yang sudah berumur lebih dari 100 tahun.

Space Weather Information and Forecast Services (SWIFtS) - LAPAN menghadiri Pertemuan Tahunan International Space Environment Service (ISES) 2017

Oleh :

T.Dani

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

Pusat Sains Antariksa, LAPAN adalah lembaga pemerintah yang berdasarkan amanat UU Keantariksaan No.21 tahun 2013 diberi tugas salah satunya untuk melakukan penelitian dan pelayanan terkait kondisi cuaca antariksa. Hal ini kemudian diatur kembali dalam Peraturan Presiden No.45 tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040 dimana salah satunya adalah tersedianya layanan terkait kondisi dan prediksi cuaca antariksa sebagai *Decision Support System* (DSS) dari LAPAN terkait mitigasi cuaca antariksa. Untuk itu, Pusat Sains Antariksa pada bulan Maret tahun 2015 membentuk layanan *Space Weather Information and Forecast Services* atau yang dikenal dengan

nama SWIFtS. Layanan ini selain memiliki orientasi terbesar kepada pengguna informasi dan layanan cuaca antariksa di Indonesia, juga memiliki tujuan untuk ikut berkontribusi di dunia Internasional terkait penelitian, informasi dan prediksi cuaca antariksa. Sejak bulan Juni 2016, SWIFtS resmi diterima sebagai salah satu *Regional Warning Center* (RWC) Indonesia oleh *International Space Environment Service* atau disingkat ISES. ISES merupakan satu-satunya organisasi internasional yang menaungi seluruh lembaga yang memberikan layanan terkait informasi dan prediksi cuaca antariksa. Saat ini ISES dipimpin oleh seorang Direktur, yaitu Dr. Terrance Onsager dari NOAA Amerika Serikat, dan Deputi

Direktur Dr. Clezio De Nardin dari EMBRACE Brasil. Lembaga layanan cuaca antariksa milik Amerika Serikat, yaitu *Space Weather Prediction Center* (SWPC) *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA) serta *Solar Influences Data Analysis Center* (SIDC) Belgia juga merupakan salah satu RWC dari ISES. Indonesia sendiri adalah RWC ke-18 yang diterima oleh ISES. ISES setiap tahun rutin mengadakan pertemuan untuk membahas hal-hal terkait layanan prediksi cuaca antariksa, bagaimana model-model *flare*, geomagnet, dan ionosfer yang dikembangkan, verifikasinya serta beberapa hal lain yang bersifat umum. SWIFtS sebagai RWC Indonesia dijadwalkan untuk mengikuti pertemuan tahunan ISES di Istanbul Turki pada tahun 2016 tetapi pertemuan tersebut dibatalkan karena Turki dilanda peristiwa kudeta. Di tahun 2017 ini, ISES mengadakan pertemuan tahunan pada tanggal 5 - 6 Mei 2017, setelah acara *Space Weather Workshop* (SWW) yang diadakan oleh NOAA pada tanggal 1 - 5 Mei 2017 di kota Broomfield, Colorado,

Amerika Serikat. RWC Indonesia turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Acara pertemuan tahunan 2017 ISES dihadiri oleh RWC Australia, RWC Belgia, RWC Brazil, RWC Kanada, RWC Tiongkok, *Associates Warning Center* (AWC) Tiongkok, *Collaborative Expert Center* (CEC) *European Space Agency* (ESA), RWC Indonesia, RWC Jepang, RWC Korea, RWC Meksiko, RWC Afrika Selatan, RWC Inggris, RWC Amerika Serikat, dan perwakilan dari WMO IPT-SWIESS (*Inter-Programme Team on Space Weather Information, Systems, and Services*) yang merupakan organisasi yang membawahi lembaga-lembaga meteorologi.

Acara yang berlangsung selama dua hari ini cukup padat karena beberapa agenda yang seharusnya dibahas pada pertemuan tahunan ISES tahun 2016 yang dibatalkan kemudian digabungkan dengan agenda pada tahun 2017 ini. Acara di hari pertama dimulai dari sambutan dan pembukaan dari Direktur ISES, Dr. Terrance Onsager. Setelah itu, dilanjutkan dengan presentasi dari RWC Meksiko tentang pengenalan SCIESMEX, yang merupakan layanan prediksi cuaca antariksa untuk daerah Meksiko. RWC Indonesia juga turut menyampaikan pengenalan tentang SWIFtS LAPAN yang merupakan layanan informasi dan prediksi cuaca antariksa untuk wilayah Indonesia, dan merupakan RWC satu-satunya, juga yang pertama di Asia Tenggara. Presentasi selanjutnya dari *Rutherford Appleton Laboratory* (RAL) dari Inggris tentang riset mereka dibidang cuaca antariksa dan keinginan mereka untuk bergabung sebagai CEC ISES dibawah koordinasi RWC Inggris. Acara kemudian dilanjutkan dengan laporan hasil kegiatan

masing-masing RWC dari setiap negara yang hadir dalam 2 tahun terakhir. Banyak hal berharga yang disampaikan, terutama terkait dengan perkembangan riset yang telah dilakukan, model-model prediksi yang terkait dengan cuaca antariksa, seperti model prediksi *flare*, model prediksi badai geomagnet dan model prediksi gangguan lapisan ionosfer.

Agenda pertemuan di hari ke kedua membahas mengenai draft perubahan konstitusi ISES diantaranya adanya jabatan baru posisi sekretaris untuk mengelola situs ISES, terkait voting dalam pengambilan keputusan, dan pembahasan syarat menjadi anggota ISES terutama harus adanya dukungan dari pemerintah negaranya. Agenda berikutnya adalah penyampaian dari masing-masing RWC terkait status spesifikasi dan metadata produk yang dihasilkan masing-masing RWC. Penyampaian dilanjutkan terkait produk data yang perlu untuk segera tersedia dari masing-masing RWC dan AWC jika terjadi peristiwa cuaca antariksa yang cukup besar. Agenda lain yang tak kalah penting adalah teknik untuk memverifikasi prediksi yang bersifat probabilistik. Hal ini sangat penting bagi masing-masing RWC untuk mengetahui tingkat akurasi

prediksi cuaca antariksa yang dihasilkan sehingga memudahkan pengembangan dan peningkatan akurasi dari model-model prediksi cuaca antariksa. Pertemuan tahunan ISES 2017 kemudian ditutup oleh Direktur ISES.

ISES merupakan organisasi dunia yang mewadahi seluruh badan yang menyelenggarakan layanan cuaca antariksa. Organisasi dunia yang lain seperti UN COPUOS dan WMO memandang ISES sebagai organisasi yang penting. Pertemuan tahunan ISES 2017 ini merupakan pertemuan pertama yang dihadiri RWC Indonesia sebagai negara yang baru bergabung dengan ISES. Banyak hal yang didapat dari pertemuan tersebut, dari sisi penelitian yang dapat dilakukan dan juga pelayanan yang dapat diberikan kepada *stakeholder* di Indonesia. RWC Indonesia dapat belajar dari RWC lain dalam hal peningkatan kualitas riset dan layanan yang terkait dengan cuaca antariksa. Diharapkan dengan rutin mengikuti pertemuan tahunan ISES, SWIFtS LAPAN dapat memberikan kontribusi dan peran di bidang cuaca antariksa dalam memberikan layanan cuaca antariksa berkualitas Internasional untuk para pengguna di Indonesia ataupun dunia. ▣

Gambar 1 : Peserta pertemuan tahunan ISES 2017 di Broomfield, Colorado, Amerika Serikat

Gambar 2 : Suasana pertemuan tahunan ISES di Hotel Omni Interlocken, Broomfield, Colorado, AS

KALENDER astronomi

Juli- September 2017

Oleh :

A. Gunawan Admiranto

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

30 Juli – Merkurius di Elongasi Timur Maksimum.

Planet Merkurius mencapai elongasi timur maksimum sebesar 27,2 derajat dari Matahari. Saat ini adalah waktu terbaik untuk melihat Merkurius karena akan berada di titik tertinggi di atas cakrawala di langit malam. Carilah planet ini di dekat cakrawala di langit barat setelah matahari terbenam.

28 Juli 29 – Hujan Meteor Delta Aquarids.

Delta Aquarids adalah hujan meteor dengan laju rata-rata yang dapat menghasilkan hingga 20 meteor per jam pada saat puncak. Hujan ini dihasilkan oleh debu yang ditinggalkan oleh komet Marsden dan Kracht. Hujan meteor ini berlangsung setiap tahun dari 12 Juli hingga 23 Agustus. Pada tahun ini puncaknya berlangsung pada malam 28 Juli dan pagi 29 Juli. Bulan sabit akan muncul di tengah malam, sehingga langit cukup gelap untuk mengamati hujan meteor ini, tetapi tampilan terbaik berlangsung setelah tengah malam. Meteor akan memancar dari konstelasi Aquarius, tetapi dapat muncul di mana saja di langit.

21 Agustus – Gerhana Matahari Total.

Sebuah gerhana matahari total terjadi ketika piringan Bulan sepenuhnya menutupi piringan Matahari, dan memunculkan atmosfer luar matahari yang dikenal sebagai korona. Ini adalah peristiwa langka, yang berlangsung sekali dalam seumur hidup untuk pengamat di Amerika Serikat. Gerhana matahari total terakhir yang terlihat di daratan Amerika Serikat terjadi pada tahun 1979 dan yang berikutnya tidak akan terjadi sampai tahun 2024. Jalur totalitas akan dimulai di Samudra Pasifik dan bergerak melalui pusat Amerika Serikat. Gerhana total akan terlihat di bagian Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Kentucky, Tennessee, North Carolina, dan Carolina Selatan sebelum berakhir di Samudra Atlantik. Sebuah gerhana parsial akan terlihat di sebagian besar Amerika Utara dan sebagian Amerika Selatan bagian utara.

J U L I

A G U S T U S

9 Juli – Bulan Purnama.

Bulan akan berada di sisi berlawanan dari Bumi dilihat dari Matahari. Sun dan permukaannya akan akan sepenuhnya diterangi. Fase ini terjadi pada pukul 04:07 UT. Bulan purnama ini dikenal oleh suku-suku asli Amerika kuno sebagai Bulan Full Buck karena rusa jantan akan mulai menumbuhkan tanduk baru mereka pada saat ini.

23 Juli – Bulan Baru.

Bulan akan berada pada sisi yang sama dari Bumi dilihat dari Matahari dan tidak akan terlihat di langit malam. Fase ini terjadi pada pukul 09:46 UT. Saat ini adalah waktu terbaik untuk mengamati benda-benda redup seperti galaksi dan gugus bintang karena tidak ada cahaya bulan yang mengganggu.

7 Agustus – Gerhana Bulan Parsial.

Sebuah gerhana bulan parsial terjadi ketika Bulan melewati sebagian bayangan Bumi. Gerhana akan terlihat di sebagian besar Afrika bagian timur, Asia Tengah, Samudera Hindia, dan Australia.

21 Agustus – Bulan Baru.

Bulan akan berada pada sisi yang sama dari Bumi dilihat dari Matahari dan tidak akan terlihat di langit malam. Fase ini terjadi pada pukul 18:30 UT. Saat ini adalah waktu terbaik untuk mengamati benda-benda redup seperti galaksi dan gugus bintang karena tidak ada cahaya bulan yang mengganggu.

12 Agustus 13 – Hujan Meteor Perseids.

Hujan meteor Perseids adalah salah satu hujan meteor yang terbaik untuk diamati, menghasilkan hingga 60 meteor per jam pada saat puncak. Hujan ini dihasilkan oleh komet Swift-Tuttle, yang ditemukan pada 1862. Perseids terkenal menghasilkan sejumlah besar meteor terang. Hujan meteor ini berlangsung setiap tahun dari 17 Juli hingga 24 Agustus. Puncak tahun ini berlangsung pada malam tanggal 12 Agustus dan pagi 13 Agustus. Bulan bungkuk yang memudar akan menghalangi banyak meteor yang redup, tapi Perseids begitu terang dan banyak sehingga cukup banyak meteor yang bisa diamati. Tampilan terbaik akan berasal dari lokasi yang gelap setelah tengah malam. Meteor akan memancar dari konstelasi Perseus, tetapi dapat muncul di mana saja di langit.

22 September – Ekuinoks September.

Equinoks September terjadi pada 20:02 UTC. Cahaya Matahari akan jatuh langsung di ekuator dan lama siang dan malam sama di seluruh dunia. Ini juga merupakan hari pertama musim gugur (musim gugur equinoks) di belahan bumi utara dan hari pertama musim semi (vernal equinoks) di belahan bumi selatan.

12 September – Merkurius di Elongasi Barat Maksimum.

Planet Merkurius mencapai elongasi barat maksimum sebesar 17,9 derajat dari Matahari. Saat ini adalah waktu terbaik untuk melihat Merkurius karena ia akan berada di titik tertinggi di atas cakrawala di langit pagi. Carilah planet ini di langit timur sebelum matahari terbit di dekat cakrawala.

20 September – Bulan Baru.

Bulan akan berada pada sisi yang sama dari Bumi dilihat dari Matahari dan tidak akan terlihat di langit malam. Fase ini terjadi pada pukul 05:30 UT. Ini adalah waktu terbaik bulan untuk mengamati benda-benda redup seperti galaksi dan gugus bintang karena tidak ada cahaya bulan yang mengganggu.

S E P T E M B E R

7 Agustus – Bulan Purnama.

Bulan akan berada di belakang dari Bumi dilihat dari Matahari dan permukaannya akan sepenuhnya diterangi cahaya Matahari. Fase ini terjadi pada pukul 18:11 UT. Bulan purnama ini dikenal oleh suku-suku asli Amerika sebagai Bulan Purnama Sturgeon bulan karena ikan sturgeon dari Danau-danau Besar lebih mudah ditangkap pada saat ini.

5 September – Oposisi Neptunus.

Planet raksasa biru ini akan berada di posisinya yang paling dekat ke Bumi dan permukaannya akan sepenuhnya diterangi oleh Matahari dan akan terlihat sepanjang malam. Saat ini adalah waktu terbaik untuk melihat dan memotret Neptunus. Karena jaraknya dari Bumi sangat jauh, itu hanya akan muncul sebagai titik biru kecil di semua teleskop kecuali teleskop yang sangat kuat.

6 September – Bulan Purnama.

Bulan akan berada di belakang Bumi bila dilihat dari Matahari dan permukaan akan sepenuhnya diterangi cahaya Matahari. Fase ini terjadi pada pukul 07:03 UT. Bulan purnama ini dikenal oleh penduduk asli Amerika sebagai Bulan Jagung Penuh karena jagung dipanen sekitar saat ini.

TEKA TEKI SILANG

Vol.6 / No.3 Juli - Agustus 2017

Oleh :

V. Dear

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

Mendatar

- 1 Kondisi ketidakteraturan di lapisan ionosfer yang prosesnya terjadi tidak lama sesudah matahari terbenam
- 5 Data yang diperoleh dari pengamatan menggunakan ionosonda
- 9 Lapisan ionosfer yang berada diketinggian 90-150 km
- 11 Noise
- 12 Pengamatan visibilitas hilal untuk menentukan awal bulan Hijriyah
- 13 Lokasi Pembangunan Observatorium Nasional
- 15 Perantara
- 16 Lokasi objek pengamatan
- 17 Perangkat pengamatan ionosfer dengan metoda visual
- 18 Merk Ionosonda
- 20 Layanan cuaca antariksa Indonesia

Menurun

- 2 Salah satu wujud materi
- 3 Pemantauan
- 4 Jejak
- 6 cakrawala
- 7 Tahapan dari proses pengamatan untuk mengatur teleskop tepat mengarah kepada objek yang diamati
- 8 Perhitungan astronomis dan matematis untuk menentukan awal bulan Hijriyah
- 10 suatu proses untuk menemukan interesting knowledge dari sejumlah besar data yang disimpan dalam database
- 14 Gerhana
- 19 Radio teleskop yang digunakan untuk visualisasi fenomena ketidakteraturan lapisan ionosfer

Jawaban TTS

Vol.5 / No.3 Juli - September 2017

Gunting dan Kirimkan Jawaban Anda melalui POS ke alamat :

Redaksi Buletin Cuaca Antariksa

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

Jl. Dr Djunjunan 133, Bandung 40173

atau melalui faksimili 022-6014 998 / 6038 005

Jawaban kami terima paling lambat tanggal 15 Oktober 2017

Disediakan 3 hadiah menarik untuk pengirim dengan jawaban yang benar. Nama pemenang diumumkan pada Buletin Cuaca Antariksa edisi Oktober - Desember 2017

ISSN 2303-2707

9 772303 270008