RINGKASAN

Universitas Muslim Indonesia Makassar
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Program Studi Kesehatan Masyarakat
Peminatan Epidemiologi
Hasil penelitian, April 2012

ISLAMIAH (1412800 66)

(xv + 94 Halaman + 29 tabel+ 9 lampiran)

“faktor yang berhubungan dengan kejadian Demam Berdarah Dengue di Kelurahan Bajo Kecamatan Bajo kabupaten Luwu Tahun 2012”

DBD adalah penyakit infeksi virus akut yang di sebabkan oleh virus dengue dan terutama menyerang anak-anak dengan ciri-ciri demam tinggi mendadak, dengan manifestasi pendarahan dan bertendensi menimbulkan shock dan kematian. Tahun 2011 jumlah kasus DBD di Kabupaten Luwu sebanyak 188 kasus dan tertinggi pada Puskesmas Bajo sebesar 38 Kasus.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kejadian DBD di Kelurahan Bajo kecamatan Bajo Kabupaten Luwu tahun 2012. Jenis penelitian yang digunakan adalah Survei analitik dengan pendekatan Cross sectional study. Variabel yang diteliti adalah kegiatan 3M (mengubur, menguras, dan menimbun), Kebiasaan menggantung pakaian, penggunaan bubuk abate, Tempat perindukan nyamuk. Pengambilan sampel dengan cara *simple Random Sampling*, besar sampel sebanyak 192 sampel.

Hasil penelitian kegiatan 3M (menguras, mengubur, menutup) berhubungan dengan kejadian DBD dengan nilai $p=0,004$. Kebiasaan menggantung pakaian tidak berhubungan dengan kejadian DBD dengan nilai $p=0,315$. Penggunaan bubuk abate berhubungan dengan kejadian DBD dengan nilai $p=0,031$. Tempat perindukan nyamuk tidak berhubungan dengan kejadian DBD dengan nilai $p=0,169$.

Kegiatan 3M dan penggunaan abate harus mendapatkan perhatian dari instansi terkait agar tempat perindukan nyamuk di perhatikan. Dan perlu dilakukan penyuluhan secara terus menerus dan berkesinambungan yang dilaksanakan secara terpadu untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan bahaya penyakit DBD dan faktor penyebabnya.

Kepustakaan : 45 (1992-2011)

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Untuk itu diselenggarakan pembangunan kesehatan secara menyeluruh agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.¹

Demam Berdarah *Dengue* adalah penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus *dengue* dan terutama menyerang anak-anak dengan ciri-ciri demam tinggi mendadak dengan manifestasi pendarahan dan bertendensi menimbulkan shock dan kematian. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti*. Nyamuk ini terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia

kecuali ketinggian lebih dari 1000 meter diatas permukaan laut. Masa inkubasi penyakit ini diperkirakan lebih kurang tujuh hari.²

DBD merupakan masalah utama penyakit menular diberbagai belahan dunia. Selama 1 dekade angka kejadian atau (IR) DBD meningkat dengan pesat di seluruh belahan dunia. Diperkirakan 50 juta orang terinfeksi DBD setiap tahunnya.³

DBD di Indonesia tahun 2011 tercatat sejumlah 49.868 kasus (IR 21 per 100.000 penduduk), menurun cukup jauh (66,43%). Jika dibandingkan dengan tahun 2010 dimana terdapat 148.560 kasus (IR 62.5 per 100.000 penduduk), sementara untuk

angka kematian (CFR) akibat DBD hanya terdapat sedikit penurunan, yaitu di tahun 2010 sebesar 0,87% dan di tahun 2011 sebesar 0,80%.⁴

Pada tahun 2007 di Sulawesi Selatan kasus DBD yang terbesar berada di Kab.Bone yaitu sebanyak 1030 kasus (46,48%), menyusul Kota Makassar 452 kasus (20,39%), Kab.Bulukumba 376 kasus (16,96%), dan Kab.Pangkep 358 kasus (16,15%).¹

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu pada tahun 2008 Penyakit DBD sebanyak 89 kasus namun semuanya dapat ditangani. Sementara tahun 2009 mengalami peningkatan kasus sebanyak 54 kasus menjadi 143 dan pada tahun 2010 jumlah kasusnya naik menjadi 188 kasus.⁵

Hasil penelitian Ekawati (2009) beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian demam berdarah *dengue* (DBD) di Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Tahun 2009 menunjukkan bahwa dari 75 responden ada 36 responden (48,0%) pernah sakit DBD dan tidak terdapat tutup pada kontainernya. Oleh sebab itu dengan kondisi tidak adanya tutup kontainer tersebut maka dapat menggambarkan kejadian DBD disebabkan oleh tidak adanya tutup pada kontainer.⁶

Sementara itu berdasarkan Data dari Puskesmas Bajo tahun 2010 jumlah kasus DBD Sebanyak 27 kasus, sementara tahun 2011 jumlah kasus DBD meningkat menjadi 38, dari wilayah kerja Puskesmas Bajo kasus DBD banyak terjadi di Kelurahan Bajo, pada bulan Juli kasus DBD menyebabkan 2 orang meninggal dunia.⁹

Berdasarkan kajian sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian faktor yang berhubungan dengan kejadian Demam Berdarah Dengue di Kelurahan Bajo Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Tahun 2012.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik dengan pendekatan *cross sectional study* yaitu penelitian untuk mempelajari dinamika kolerasi antara faktor-

faktor risiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (*point time approach*). Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Maret di Kelurahan Bajo Kabupaten Luwu tahun 2012.

Populasi dalam penelitian Ini adalah jumlah KK yang ada di Kelurahan Bajo yaitu sebanyak 479 KK. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode random sampling didapatkan besar sampel adalah 192 KK.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dan checklist: Kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Checklist digunakan untuk mengecek informasi sesuai dengan pengamatan langsung di lokasi.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan responden/sampel dengan menggunakan kuesioner sedangkan Data sekunder diperoleh dari Puskesmas Bajo maupun data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, serta data penduduk atau monografi yang diperoleh dari Kelurahan Bajo.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan komputer dengan program *Microsoft office* dengan harapan Analisis univariat dilakukan untuk mendeskripsikan dan memperoleh informasi secara umum dari variabel yang diteliti dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Analisis bivariat digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis dua variabel. Uji statistik yang digunakan adalah *Chi-Square*. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 95% dengan nilai kemaknaan 0,05 (p value).⁷

HASIL

Tabel 1 menunjukkan hasil uji statistik diperoleh nilai probabilitas (p value = 0,004 < alpha (α =0,05) sehingga H_0 ditolak, artinya ada hubungan antara Kegiatan 3M dengan kejadian demam berdarah *dengue*. Tabel 2 Hasil uji statistik diperoleh nilai

probabilitas ($p \text{ value} = 0,315$) $>$ α ($\alpha = 0,05$) sehingga H_0 diterima, artinya tidak ada hubungan kebiasaan menggantung pakaian dengan kejadian Demam Berdarah *Dengue*.

Tabel 3 hasil uji statistik diperoleh nilai probabilitas ($p \text{ value} = 0,031$) $<$ α ($\alpha = 0,05$) sehingga H_0 ditolak, artinya ada

hubungan antara penggunaan bubuk abate dengan kejadian Demam Berdarah *Dengue*. Tabel 4 Hasil uji statistik diperoleh nilai probabilitas ($p \text{ value} = 0,169$) $>$ α ($\alpha = 0,05$) sehingga H_0 diterima artinya tidak ada hubungan antara tempat perindukan nyamuk dengan kejadian Demam Berdarah *Dengue*.

Tabel 1
Hubungan Kegiatan 3M Dengan Kejadian Demam Berdarah *Dengue*
di Kelurahan Bajo Kecamatan Bajo
Tahun 2012

Kegiatan 3M	Kejadian DBD				Total		P Value
	DBD		Tidak DBD				
	N	%	N	%	N	%	
Melakukan 3M	17	33,3	34	66,7	51	100	0,004
Tidak melakukan 3M	19	13,5	122	86,5	141	100	
Jumlah	36	18,8	156	81,3	192	100	

Sumber : Data primer

Tabel 2
Hubungan Kebiasaan Menggantung Pakaian Dengan Kejadian Demam Berdarah *Dengue*
(DBD) di Kelurahan Bajo Kecamatan Bajo Tahun 2012

Menggantung Pakaian	Kejadian DBD				Total		P Value
	DBD		Tidak DBD				
	N	%	N	%	N	%	
Menggantung pakaian	26	17,0	127	66,7	153	100	0,315
Tidak menggantung pakaian	10	25,6	27	74,4	39	100	
Jumlah	36	36,0	156	81,3	192	100	

Sumber : Data primer

Tabel 3
 Hubungan Penggunaan Bubuk Abate Dengan Kejadian Demam Berdarah *Dengue*
 di Kelurahan Bajo Kecamatan Bajo Tahun 2012

Penggunaan Abate	Kejadian DBD				Total		p Value
	DBD		Tidak DBD				
	N	%	N	%	N	%	
Menggunakan abate	15	30,0	35	70,0	50	100	0,031
Tidak menggunakan abate	21	14,8	121	85,2	142	100	
Jumlah	36	18,8	156	81,3	192	100	

Sumber : Data primer

Tabel 4
 Hubungan Tempat perindukan Nyamuk Dengan Kejadian Demam Berdarah *Dengue*
 di Kelurahan Bajo Kecamatan Bajo Tahun 2012

Pemeriksaan Jentik	Kejadian DBD				Total		p Value
	DBD		Tidak DBD				
	N	%	N	%	N	%	
Ada jentik	7	29,2	17	70,8	24	100	0,169
Tidak ada jentik	29	17,3	139	82,7	168	100	
Jumlah	36	18,8	156	81,3	192	100	

Sumber : Data primer

PEMBAHASAN

Hubungan Pemberantasan sarang nyamuk dengan kejadian DBD.

Gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) secara massal dan nasional. PSN dilakukan dengan menerapkan 3M (Menutup wadah atau tempat penampungan air, mengubur atau membakar benda-benda yang sudah tidak digunakan lagi yang dapat menjadi sarang nyamuk, dan menguras atau mengganti air di tempat penampungan air). Keseluruhan pelaksanaan 3M yang dilaksanakan (menguras, mengubur dan menimbun) sebanyak 51 responden dan yang pernah menderita DBD sebanyak 17 responden. Sedangkan yang tidak melakukan kegiatan 3M dan menderita DBD sebanyak 19 responden dan yang tidak menderita DBD sebanyak 122 responden.

Dari hasil uji *chi square* diperoleh nilai $p=0,004 < \alpha$ ($\alpha=0,05$) H_0 ditolak menunjukkan bahwa ada hubungan antara kegiatan 3M dengan kejadian DBD. Ini dimungkinkan karena kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam membersihkan lingkungan dan upaya pemberantasan sarang nyamuk harus melaksanakan kegiatan 3M secara keseluruhan dengan mengubur benda-benda yang tidak digunakan lagi yang dapat menjadi tempat bersarang nyamuk dan menguras atau mengganti air di tempat penampungan air serta menutup dengan rapat tempat penampungan air yang dimiliki masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian mengenai pemberantasan sarang nyamuk (3M) memiliki hubungan yang bermakna terhadap kejadian DBD di Puskesmas Walio dimana nilai $p=0,000 < \alpha$ ($\alpha=0,05$) yang berarti ada

hubungan. Hal ini juga karena kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam membersihkan lingkungan dan upaya pemberantasan sarang nyamuk hanya dilakukan di dalam rumah saja sedangkan di sekitar rumah dan tempat umum tidak dilakukan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Rosmina tahun 2007 yang menemukan bahwa ada hubungan antara kegiatan 3M dengan kejadian DBD di Kelurahan Tamangamaung Kota Makassar. Masyarakat tahu tetapi masih ada masyarakat yang malas menguras tempat penampungan airnya, terlebih jika bak air yang dimiliki besar, sering menampung air dalam waktu lama dan tidak menutup pada TPA masyarakat.⁸

Hubungan kebiasaan menggantung pakaian dengan kejadian demam berdarah *dengue*

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari 192 responden yang menggantung pakaian ada sebanyak 153 responden (79,9%), yang mana di antara 153 responden tersebut yang pernah menderita DBD yaitu sebanyak 26 responden (17,0%) dan yang tidak menderita DBD sebanyak 127 responden (83,0%). Kemudian yang tidak menggantung pakaian sebanyak 39 responden (20,3%), yang mana yang pernah menderita DBD sebanyak 10 responden (25,6%) dan yang tidak menderita DBD sebanyak 29 responden (74,4%).

Penelitian ini diperoleh hasil uji statistik dengan *chi-square* diperoleh nilai $p=0,315$. Karena nilai $p > 0,05$ maka H_0 diterima artinya tidak ada hubungan antara kebiasaan menggantung pakaian dengan kejadian demam berdarah *dengue* di Kelurahan Bajo. Hal ini tidak sesuai

dengan teori yang menyatakan bahwa kebiasaan menggantung pakaian yang ada pada masyarakat dapat mengakibatkan tingginya kepadatan vektor dan kejadian DBD dimasyarakat, karena pakaian yang tergantung sangat disukai oleh vektor sebagai tempat untuk beristirahat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Riyanti (2011) faktor yang berhubungan dengan kejadian demam berdarah di wilayah Kerja Puskesmas Wergu Wetan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus menemukan bahwa tidak ada hubungan antara kebiasaan menggantung pakaian dengan kejadian Demam Berdarah Dengue ($p=0,428$).

Hasil penelitian Aida (2008) faktor yang berhubungan dengan kejadian demam berdarah *dengue* di Kabupaten Jeneponto menunjukkan hasil uji statistik dengan chi-square diperoleh nilai $p=0,432$, karena nilai $p>0,05$ maka H_0 diterima, hal ini juga menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kebiasaan menggantung pakai dengan kejadian DBD di Kabupaten Jeneponto. Penelitian yang berbeda didapatkan oleh Arfan (2009) faktor yang berhubungan dengan kejadian demam berdarah dengue di Puskesmas Walio Kota Bau Bau dengan menggunakan chi-square test diperoleh nilai koefisien $\phi=0,208$ dengan nilai $\text{value}=0,001(<0,05)$, yang berarti bahwa ada hubungan yang bermakna antara kebiasaan menggantung pakaian responden dengan kejadian DBD. Hal ini kemungkinan karena kebiasaan masyarakat menggantung pakaian tersebut dapat mengakibatkan tingginya kepadatan vektor dan kejadian DBD di masyarakat.

Hubungan penggunaan bubuk abate dengan kejadian demam berdarah dengue

Pelaksanaan abatisasi merupakan salah satu variabel bebas dalam penelitian ini. Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 192 responden yang memberikan bubuk abate kedalam tempat penampungan airnya kurang dari 3 bulan sekali sebanyak 50 responden (26,0%) sedangkan yang tidak pernah memberikan bubuk abate selama <3 bulan sekali sebanyak 142 responden (74,0%) masyarakat hanya menggunakan bubuk abate jika mendapatkan dari pembagian puskesmas, atau ada yang membeli di pasar, sehingga banyak yang tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. karena tempat penampungan air yang masyarakat gunakan banyak yang terbuat dari plastik yang airnya cepat habis digunakan, maka apabila diberikan bubuk abate banyak yang tidak bertahan lama, karena airnya cepat habis.

Penggunaan bubuk abate banyak yang tidak memenuhi syarat di Kelurahan Bajo ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum tahu bagaimana cara menggunakan bubuk abate yang memenuhi syarat. kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya manfaat dari bubuk abate. selain itu masyarakat hanya menunggu pembagian abate secara gratis dari pihak Puskesmas.

Hasil analisis chi-square didapatkan hasil $p \text{ value}= 0,031 < \alpha$ ($\alpha=0,005$) maka H_0 ditolak, itu artinya ada hubungan antara penggunaan bubuk abate dengan kejadian DBD di Kelurahan Bajo. Responden yang tidak memberikan bubuk abate pada tempat penampungan airnya < 3 bulan sekali mempunyai peluang untuk menderita DBD di Kelurahan Bajo Kecamatan Bajo.

Responden yang tidak memberikan bubuk abate pada tempat penampungan airnya < 3 bulan sekali mempunyai peluang untuk menderita

DBD di Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Tahun 2009 dimana hasil penelitian didapatkan nilai $p=0,001 < \alpha$ ($\alpha=0,005$) maka H_0 ditolak, itu berarti ada hubungan antara Kebiasaan menggunakan Bubuk abate dengan kejadian DBD.⁶

Hasil yang sama didapatkan oleh Quryawati (2008) yang menemukan bahwa ada hubungan antara pemberian bubuk abate dengan kejadian DBD di BTN Antara. Apabila masyarakat menguras bak mandi atau tempat penampungan air sebaiknya diberikan kembali bubuk abate .

Hasil yang berbeda didapatkan oleh Nurhaedah (2008) yang menemukan bahwa tidak ada hubungan antara penggunaan bubuk abate dengan kejadian DBD di Kecamatan Wara Kota palopo tahun 2007.

Hubungan Tempat perindukan nyamuk dengan kejadian demam berdarah dengue

Pemeriksaan tempat perindukan nyamuk yang dilakukan melalui pengamatan/observasi keberadaan jentik *Aedes aegypti* menunjukkan bahwa sebanyak 12,5% dari keseluruhan responden yang ditemukan ada jentik, dan sebanyak 87% responden yang tidak ditemukan ada jentik di dalam rumah maupun di luar rumah.

Ditemukan jentik nyamuk pada bak penampungan air dalam rumah, hal ini disebabkan karna walaupun responden menguras bak mandinya minimal 1 kali dalam seminggu, tetapi cara pengurasanya yang salah, sehingga dinding-dinding bak mandi tidak bersih dan untuk penampungan diluar rumah responden itu menggunakan drum dan ban yang sudah

tidak digunakan lagi yang ada disekitar rumah masyarakat yang terbuka sehingga jika hujan turun mengakibatkan air tertampung dan tidak dibuang.

Penelitian ini tidak ditemukan hubungan yang bermakna antara tempat perindukan nyamuk dengan kejadian DBD dimana p value 0,169 lebih besar dari nilai $\alpha=0,005$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mahardika (2009) yang menyebutkan bahwa tidak ada hubungan antara tempat perindukan nyamuk dengan kejadian DBD di Puskesmas Cepiring.⁸

Hasil penelitian Riyanti (2011) faktor yang berhubungan dengan kejadian demam berdarah *dengue* di wilayah kerja Puskesmas Wergu Wetan Kabupaten Kudus menemukan bahwa tidak ada hubungan antara keberadaan jentik pada kontainer dengan kejadian penelitian Demam Berdarah *Dengue* ($P=0,062$).¹¹

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk dalam hal ini melakukan kegiatan 3M (Mengubur, menguras dan menutup) memiliki hubungan dengan kejadian demam berdarah dengue dengan nilai $p=0,004$

Tidak ada hubungan antara Kebiasaan menggantung pakaian dengan kejadian DBD di Kelurahan Bajo Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Tahun 2012 dengan nilai $p=0,315$.

Ada hubungan antara Penggunaan bubuk abate dengan kejadian DBD di Kelurahan Bajo Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Tahun 2012 dengan nilai $p=0,031$

Tidak ada hubungan antara Tempat perindukan nyamuk dengan kejadian DBD di Kelurahan Bajo Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Tahun 2012 dengan nilai $p=0,169$

REFERENSI

1. Profil Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan tahun 2008(online)
www.dinkes-sulsel.go.id
Diakses 25 desember 2010
2. Profil Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Tahun 2007. [online]
www.dinkes-sulsel.go.id.
Diakses tanggal 20 Desember 2011
3. Marini, 2009 gambaran pengetahuan,sikap dan tindakan mengenai DBD pada keluarga di Kelurahan Padang Bulan,skripsi, fakultas kesehatan masyarakat, universitas Sumatra utara.Medan
4. Ditjen PP dan PL,Depkes RI,2010.www.infopenyakit.oran
g, Diakses 10 januari 2012
5. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten luwu,2011
6. Ekawati w.2009.beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian demam berdarah dengue di kelurahan plosok kecamatan pacitan. Surakarta
- 7.Notoatmodjo, 2010, Metode Penelitian Kesehatan, Edisi Revisi, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
8. Mahardika wahyu 2009 hubungan antara perilaku kesehatan dengan kejadian demam berdarah dengue (DBD) di wilayah kerja puskesmas cepiring kecamatan cepiring kabupaten Kendal, semarang.Diakses 10 januari 2012
9. Profil Puskesmas Bajo,2011
- 10.Noor Nasry Noor. 1997. Dasar Epidemiologi. Jakarta. Rineka Cipta
- 11.Riyanti 2011, faktor yang berhubungan dengan kejadian demam berdarah *dengue* di wilayah kerja Puskesmas Wergu Wetan Kabupaten Kudus