**STUDI KEBERLANJUTAN PERIKANAN LANDAK LAUT
BERDASARKAN DIMENSI BIOLOGI, EKOLOGI DAN TEKNOLOGI DI
SEKITAR PULAU TOLANDONO DAN PULAU SAWA KAWASAN
KONSERVASI WAKATOBI**

SKRIPSI

LA NANE

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
JURUSAN PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

Judul Skripsi : Studi Keberlanjutan Perikanan Landak laut Berdasarkan Dimensi Biologi, Ekologi dan Teknologi di sekitar Pulau Tolandono dan Pulau Sawa Kawasan Konservasi Wakatobi

Nama Mahasiswa : La Nane

Nomor Pokok : L211 09 256

Program Studi : Manajemen Sumberdaya Perairan

Skripsi telah diperiksa
dan disetujui oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam Ali, MS
NIP. 195501141983011001

Ir. Bachrianto Bachtiar, M.Si
NIP. 1965050219900221001

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan

a.n. Ketua Program Studi
Manajemen Sumberdaya Perairan,
Ketua Jurusan Perikanan

Prof. Dr. Ir. Jamaluddin, M.Sc
NIP. 196703081999031001

Prof. Dr. Ir. Musbir, M.Sc
NIP. 196508101989111001

Tanggal Lulus :

ABSTRAK

La Nane. L211 09 256. Studi Keberlanjutan Perikanan Landak laut Berdasarkan Dimensi Biologi, Ekologi dan Teknologi di sekitar Pulau Tolandono dan Pulau Sawa Kawasan Konservasi Wakatobi.

Landak laut merupakan salah satu sumberdaya perairan yang melimpah dan telurnya merupakan komoditas ekspor. Di wakatobi, landak laut sudah dimanfaatkan secara intensif bahkan dikhawatirkan akan mengalami degradasi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai status keberlanjutan perikanan Landak laut berdasarkan pendekatan biologi, ekologi, dan teknologi penangkapan.. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode RAPFISH (*Rapid Apraisal for Fisheries Sustainability*) dan AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Hasil penelitian menunjukkan nilai indeks keberlanjutan dimensi Biologi (sumberdaya ikan) adalah 85,10 (sangat baik), dimensi Ekologi 88,39 (sangat baik) dan indeks keberlanjutan dimensi teknologi 67,54 (baik). Nilai secara keseluruhan indeks keberlanjutan pengelolaan perikanan landak laut berdasarkan pendekatan Biologi, Ekologi dan Teknologi penangkapan di Perairan P. Tomia dan Tolandono adalah 82,40 yang tergolong kategori pengelolaan baik dan berkelanjutan. Strategi pengelolaan yang perlu dilakukan untuk menjaga pengontrolan ukuran modifikasi alat tangkap, penentuan ukuran tangkapan Landak laut. membatasi *fishing capacity* serta membuat RPP landak laut.

Kata Kunci : *Landak laut, Wakatobi dan Rapfish*

ABSTRACT

La Nane. L211 09 256. Sea Urchin Sustainability Studies Based on Dimension Biology, Ecology and Technology at Around of Tolandono Island and Sawa Island at Wakatobi Conservation Area.

Sea urchin is the one of abundant resources in Indonesia. It is an economical organism because its eggs has been export. Wakatobi islands is one regency at southeast Sulawesi which exploitation it for seafood. Sea urchin has been used intensively however worrisome to be degraded. This study aims to asses the sustainability status of sea urchin based on biology, ecology, and technology. The study used RAPFISH Method (*Rapid Appraisal for Fisheries Sustainability*) and AHP (*Analytical Hierarchy Process*). The results showed that value of sustainability index of Biology is 85.10 (very good), Ecology 88.39 (very good) and technology 67.54 (good). All value of sea urchin management sustainability index are 82, 40 (very good). Management strategy needs to keep sea urchin sustainability controlled the fishing size, fishing gear modifications, limiting fishing capacity and create regulation of sea urchin fishing.

Keywords: *Sea urchin, Wakatobi and Rapfish*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

La Nane, lahir di Nggale Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 12 Mei 1990. Penulis merupakan anak bungsu dari pasangan La Maeni dan Wa Jaharia. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Inpres 1 Nggele pada tahun 1996, Kab. Kepulauan Sula, Maluku Utara.

Kemudian penulis melakukan integrasi pendidikan ke Pulau Tomia, Kab. Wakatobi yaitu SD Negeri 1 Waitii dan lulus pada tahun 2002. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Tomia Kab. Wakatobi dan lulus pada tahun 2006. Setelah itu, penulis mendaftar di SMA Negeri 1 Tomia dan lulus pada tahun 2009.

Pada tahun 2009, penulis mendaftar di Universitas Hasanuddin, Makassar dan berhasil diterima sebagai mahasiswa melalui Jalur Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) pada pilihan pertama pada Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP), Jurusan Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan.

Selama kuliah di Jurusan Perikanan, penulis aktif sebagai Asisten Laboratorium pada mata kuliah Manajemen sumberdaya perairan, Avertebrata air, Biologi perikanan, Ekologi Ikan, Ekologi perairan tropis dan dinamika populasi ikan. Penulis juga aktif pada kegiatan organisasi kemahasiswaan, kegiatan penulisan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Kegiatan keprofesian baik di lingkup Universitas Hasanuddin maupun kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga dalam aktivitas kemahasiswaan penulis juga pernah menjabat sebagai Ketua Forum Kajian Pesisir (FKP) periode 2010-2012,

Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Keilmuan dan Penalaran Ilmiah (KPI), dan Anggota klub selam Makassar *Scuba School Internasional* (SSI). Adapun prestasi akademik yang pernah diraih selama menjadi mahasiswa yaitu :

- Juara II Lomba Ceramah Tingkat Fakultas, Universitas Hasanuddin. Tahun 2010.
- Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional, INPACT IPB, Bogor, 2012.
- Juara III Lomba Inovasi Teknologi, Intensive Sudent Technopreneurhip (ISTEP) Recognition and Menoring Program (RAMP) IPB. Tahun 2012
- Juara III Lomba karya Tulis Ilmiah Nutrition Fair 2012, Institut Pertanian Bogor, Tahun 2012.
- Mendapat Anugrah Piagam penghargaan Khusus dari RAMP-IPB sebagai Inovator dengan Desain Prototipe terbaik, 2013
- Selama kuliah penulis juga pernah menciptakan Mesin Teknologi Uritech (*Urchin Tchnology*) “Mesin Perontok Duri Landak laut” Tahun 2012, dan
- Menjadi Delegasi Indonesia Pada Ajang Inovator Muda One Young World (OYW) di Pittsburg, USA Tahun 2012.

Selain itu, penulis juga pernah menjadi pembicara pada kegiatan seminar Nasional dan internasional :

- Menjadi pembicara seminar Nasional ilmiah masyarakat pengolah hasil perikanan Indonesia di Universitas Brawijaya, Malang Tahun 2012.
- Menjadi pembicara seminar Internasional “1st Internatinal Seminar of the Indonesian Ichthyological Society” di Makassar Golden Hotel, Tahun 2012
- Menjadi pembicara seminar penulisan karya tulis ilmiah di Baruga A. Pettarani, Universitas Hasanuddin, Tahun 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan anugerah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Keberlanjutan Perikanan Landak laut Berdasarkan Dimensi Biologi, Ekologi dan Teknologi Penangkapan di sekitar Pulau Tolandono dan Pulau Sawa Kawasan Konservasi Wakatobi”, tepat pada waktunya.

Penulis menyadari, penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan yang perlu dilengkapi dan diperbaiki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan demi kesempurnaan dari penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berjasa dan membantu penulis baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Ir. Syamsu Alam Ali, MS selaku penasehat akademik dan pembimbing utama penelitian dan Bapak Ir. Bachrianto Bachtiar, MS selaku dosen pembimbing anggota yang telah memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini.
2. Ayahanda La Maeni dan Ibunda Wa Jaharia yang telah memberikan banyak perhatian, motivasi dan dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen dan seluruh jajaran Staf Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan khususnya Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan yang selama ini telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

4. Saudara Muhammad Saleh Nurdin, S.Pi dan mahasiswa Manajemen Sumberdaya Perairan Universitas Hasanuddin Angkatan 2009 yang telah memotivasi dan mebantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Kepala Balai Taman Nasional Kabupaten Wakatobi dan seluruh jajarannya yang telah memberikan arahan dan informasi kepada penulis sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga amalan kita semua mendapat ridha Allah SWT. Semoga rahmat, taufik dan hidayah-Nya senantiasa tetap tercurah kepada kita sekalian. Amin.

Makassar, 19 Agustus 2013

Penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACK.....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	
 I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Kegunaan	3
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 4
A. Taman Nasional Wakatobi	4
B. Taksonomi Landak laut	7
C. Morfologi Landak laut	7
D. Jenis-jenis Landak laut ekonomis	9
E. Reproduksi dan tanda Kelamin	11
F. Siklus Hidup Landak laut	11
G. Habitat dan Kepadatan Landak laut.....	12
H. Makanan Landak laut	13
I. Ukuran Landak laut	13
J. Produksi Landak laut.....	14
K. Pemanfaatan Gonad Landak laut	14
L. Teknologi Pemanfaatan Landak laut	15
M. Metode RAPFISH	16
N. Metode AHP (<i>Analitical Hierarchy Process</i>)	19
 III. METODE PENELITIAN	 21
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	21
B. Alat dan Bahan	21
C. Metode Sampling	22
D. Pengukuran Parameter Biologi	22
E. Pengumpulan Data	24
F. Analisis Data	25
 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 28
A. Aspek Biologi Landak laut	28
B. Dimensi Ekologi	31
C. Dimensi Biologi	37
D. Dimensi Teknologi	42
E. Analisis Status Keberlanjutan Multidimensi	48
F. Analisis Montecarlo	50

V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
C. Rekomendasi	53
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Jenis-jenis Landak laut yang dikonsumsi oleh masyarakat P. Tomia Kabupaten wakatobi	10
2. Skala perbandingan secara berpasangan.....	19
3. Ciri-ciri tingkat kematangan gonad	24
4. Kategori indeks keberlanjutan untuk setiap dimensi yang dikaji..	27
5. Rata-rata Landak laut yang ditemukan di P. Pulau Tolandono dan P. Sawa.....	28
6. Kepadatan <i>Tripneustes gratila</i> di P. Tolandono dan P. Sawa	30
7. TKG Landak laut jenis <i>T. gratila</i> yang ditemukan di P. Tolandono dan P. Sawa.....	31
8. Skor atribut pada dimensi ekologi.....	32
9. Skor atribut dimensi pada dimensi biologi	38
10. Skor atribut pada dimensi Teknologi	43
11. Nilai aspek keberlanjutan seluruh dimensi hasil analisis AHP	48
12. Perbedaan indeks keberlanjutan antara RAPFISH dan Monte Carlo	50
13. Pengukuran statistik dari nilai Stress dan R-squared dengan MDS	50

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Peta Zonasi Taman Nasional wakatobi	7
2. Morfologi Landak laut.....	9
3. Siklus Hidup Landak laut <i>T. gratila</i>	12
4. Tanggo alat tangkap Landak laut nelayan P. Tomia	16
5. Peta Lokasi Penelitian.....	21
6. Morfologi landak laut dari terkecil sampai terbesar	23
7. Tahapan aplikasi RAPFISH	26
8. Persentase jumlah jenis landak laut yang ditemukan di P. Tolandono.....	29
9. Persentase jumlah jenis landak laut yang ditemukan di P. Sawa	29
10. Pengukuran diameter cangkang <i>T. gratila</i>	30
11. Morfologi Landak gonad landak laut <i>T. gratila</i>	31
12. Ordinasasi pada dimensi ekologi.....	35
13. Sensitivitas setiap atribut pada dimensi ekologi.....	36
14. Ordinasasi pada dimensi biologi.....	41
15. Sensitivitas setiap atribut pada dimensi biologi.....	46
16. Ordinasasi pada dimensi teknologi.....	35
17. Sensitivitas setiap atribut pada dimensi teknologi.....	46
18. Hasil analisis RAPFISH	48
19. Nilai masing-masing atribut prioritas dalam pengelolaan Landak Laut di Perairan P. Tolandono dan P. Sawa	49

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Kuisisioner dimensi biologi, ekologi dan teknologi.....	59
2. Kuisisioner AHP	62

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah perairan Indonesia dikenal sebagai wilayah yang mempunyai keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Disamping itu, ekosistem dan sumberdaya perairan laut di wilayah pesisir diketahui sangat produktif. Salah satu sumberdaya alam yang memiliki potensi ekonomis dan cukup produktif adalah Landak laut (*Echinoidea*).

Landak laut merupakan hewan echinodermata yang seluruh permukaan tubuhnya ditutupi oleh duri. Landak laut merupakan salah satu komoditas hasil perairan yang telah dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Bagian dari Landak laut yang biasanya dimanfaatkan sebagai pangan adalah gonad (telurnya), baik gonad jantan maupun gonad betina. Pangan berbahan gonad Landak laut telah dikonsumsi secara luas oleh masyarakat Jepang, Eropa, Amerika, Chili dan Kanada.

Di perairan Indonesia khususnya di Taman Nasional Perairan Kabupaten Wakatobi ada 6 jenis sumberdaya Landak laut ekonomis yang sudah dimanfaatkan dan dikonsumsi yaitu dari jenis *Echinometra spp*, *Tripteneustes gratilla*, *Toxopneustes pileolus*, *Echinothrix calamaris*, *Mespilia globus* dan *Diadema setosum* yang dalam bahasa lokal masyarakat P.Tomia Landak laut tersebut dikenal dengan nama *Nee Kari'rij*, *Tihe Mpuu*, *Tihe Kenelua*, *Nee Bisa*, *Tihe Mouse*, dan *Nee Matam'mata*.

Pulau Tolandono dan Pulau Sawa adalah pulau yang termasuk dalam wilayah administratif Kab. Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara. Kawasan Kab. Wakatobi, oleh pemerintah telah ditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan SK Menhut No.7651/Kpts-II/2002, tanggal 19 Agustus 2002 dan dikelola dengan sistem zonasi (Balai Taman Nasional Wakatobi, 2012).

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. SK.149/IV-KK/2007, P. Tolandono termasuk dalam zona pariwisata sedangkan P. Sawa termasuk dalam zona pemanfaatan lokal. Wilayah ini adalah salah satu kawasan penyebaran terumbu karang dan padang lamun yang juga merupakan habitat dari Landak laut.

Masyarakat lokal Taman Nasional Peairan Wakatobi sudah lama memanfaatkan gonad Landak laut sebagai bahan makanan. Pemanfaatan gonad Landak laut oleh masyarakat P. Tomia sebagai pangan konsumsi telah dilakukan sejak tahun 1940-an sampai saat ini (Komunikasi Langsung, Wa Timaesa, 2013). Oleh karena itu, tingkat eksploitasi dan teknologi penangkapan yang digunakan oleh nelayan Landak laut juga terus meningkat. Pada tahun 1940, masyarakat P. Tomia masih menggunakan kayu bercabang berbenyuk “Y” sebagai alat tangkap, kemudian mereka mulai menggunakan *Kabali* (parang) *Karinda* (keranjang), *Embere* (ember) dan yang terakhir adalah *Tanggo* (jaring nilon). Modifikasi dan perkembangan alat tangkap ini sangat signifikan dengan peningkatan kuantitas produksi gonad Landak laut sehingga terjadi peningkatan intensitas penangkapan Landak laut.

Sementara itu, pemanfaatan sumberdaya alam yang dilakukan secara intensif dan kontinu akan memengaruhi keberlanjutan biologis perikanan Landak laut, baik komposisi jenis, kelimpahan maupun ukurannya. Berdasarkan hal tersebut serta belum adanya informasi ilmiah mengenai status keberlanjutan pemanfaatan perikanan Landak laut melalui pendekatan multidimensi di wilayah tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai status keberlanjutan perikanan Landak laut disekitar P. Tolandono dan P. Sawa.

B. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui komposisi jenis, kepadatan, tingkat kematangan gonad, dan diameter Landak laut di Perairan P. Tolandono dan P. Sawa Kawasan Konservasi wakatobi.
2. Mengetahui status keberlanjutan perikanan Landak laut melalui pendekatan biologi, ekologi, dan teknologi penangkapan.
3. Merumuskan alternatif kebijakan dalam pengelolaan perikanan Landak laut di P. Tolandoo dan P. Sawa.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi tentang status keberlanjutan perikanan Landak laut yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai data *base* dan pedoman dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pemanfaatan Landak laut secara berkelanjutan di P. Tolandono dan P. Sawa Kawasan Konservasi Wakatobi. Sementara itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pengelolaan dan pemanfaatan Landak laut secara berkelanjutan dengan tetap menguntungkan masyarakat nelayan Landak laut dalam jangka panjang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Taman Nasioal Wakatobi

Menurut UU No. 5 tahun 1990, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Kawasan Kepulauan Wakatobi beserta perairan di sekitarnya seluas $\pm 1.390.000$ Ha telah ditunjuk sebagai taman nasional pada tahun 1996 berdasarkan SK Menhut No.393/Kpts-VI/1996 dan ditetapkan sebagai taman nasional pada tahun 2002 berdasarkan SK Menhut No.7651/Kpts-II/2002. Secara geografis taman nasional tersebut terletak antara $123^{\circ} 20'$ - $124^{\circ} 39'$ BT dan $5^{\circ} 12'$ - $6^{\circ} 10'$ LS. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, sebelah barat berbatasan dengan Pulau Buton dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda (Balai Taman Nasional Wakatobi, 2012). Nama Wakatobi merupakan akronim dari nama empat pulau besar yang ada di wilayah tersebut, yaitu Pulau Wangi-wangi, P. Kaledupa, P. Tomia dan P. Binongko.

Taman Nasional Wakatobi dikelola dengan sistem zonasi, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. 198/Kpts/DJVI/1997 tanggal 31 Desember 1997, terdiri atas zona inti, zona pelindung, zona rehabilitasi, zona pemanfaatan, dan zona pemanfaatan tradisional. Namun, seiring berjalannya waktu dan demi optimalnya pengelolaan taman nasional, zonasi tersebut mengalami revisi melalui Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. SK.149/IV-KK/2007 berlakulah sistem zonasi Taman Nasional Wakatobi yang baru yang terdiri atas enam zona. Zona tersebut adalah zona inti, zona

perlindungan bahari, zona pariwisata, zona pemanfaatan lokal, zona pemanfaatan umum dan zona khusus/daratan (BTNW,2012).

1. Zona inti

Adalah bagian taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota atau fisiknya masih asli dan tidak atau belum terganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas. Zona ini seluas ± 1.300 ha yang meliputi wilayah perairan dan sebagian daratan P. Moromaho.

2. Zona perlindungan bahari

Adalah bagian dari taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung pelestarian zona inti dan zona pemanfatan. Zona ini seluas ± 36.450 ha meliputi sebagian wilayah perairan bagian utara P. Wangi-wangi, bagian utara dan timur P. Hoga, sebagian perairan sekitar P. Lentea dan P. Darawa, perairan P. Anano, perairan sekitar P. Lintea Selatan. Zona perlindungan bahari secara teoritis sama dengan Zona penyangga bahari seperti yang dikemukakan oleh Allain (2012).

3. Zona Pariwisata

Adalah bagian dari taman nasional yang letak, kondisi dan potensinya terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan lainnya. Zona ini seluas ± 6.180 ha yang meliputi wilayah perairan bagian timur P. Wangi-wangi (Matahora), perairan dan pantai di bagian barat P. Hoga, perairan Tanjung Sombano, mangrove di pesisir Sombano-Mantigola Kaledupa, mangrove di pesisir P. Derawa, perairan bagian barat Waha P. Tomia, perairan sekitar P. Tolandono Tomia, dan sebagian wilayah Karang Koromaha.

4. Zona Pemanfaatan Lokal

Adalah bagian dari taman nasional yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan terbatas secara tradisional untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitarnya yang biasanya menggantungkan hidupnya pada sumberdaya alam laut. Zona ini seluas ± 804.000 ha yang meliputi sebagian besar wilayah perairan pesisir pulau-pulau di Kepulauan Wakatobi selain zona lainnya dalam radius ± 4 mil.

5. Zona Pemanfaatan Umum

Adalah bagian taman nasional yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pemanfaatan perikanan laut dalam. Zona ini seluas ± 495.700 ha yang meliputi sebagian besar wilayah perairan di luar radius ± 4 mil dari pulau-pulau dan gugusan terumbu karang di Wakatobi.

6. Zona Khusus/ Daratan

Adalah wilayah daratan berupa pulau-pulau yang berpenduduk dan telah memiliki hak pemilikan atas tanah oleh masyarakat, karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik. Zona ini luasnya ± 46.370 ha.

B. Taksonomi Landak laut

Dalam sistem tatanama nomenklatur Landak laut diklasifikasikan ke dalam kelas Echinoidea. Klasifikasi Landak laut jenis *Tripneustes gratilla* menurut Brotowidjoyo (2000) adalah sebagai berikut :

Filum	: Echinodermata
Kelas	: Echinoidea
Ordo	: Tripnoida
Famili	: Tripnoidea
Genus	: <i>Tripneustes</i>
Spesies	: <i>Tripneustes gratilla</i>

C. Morfologi

Landak laut adalah hewan dari filum echinodermata yang seluruh permukaan tubuhnya ditutupi oleh duri. Landak laut mempunyai nama internasional *sea urchin*. Landak laut mempunyai bentuk yang khas yaitu berbentuk seperti bola atau bundar pipih dengan cangkang yang tersusun dari kapur dan dipenuhi dengan duri-duri yang tajam. Hewan tersebut bergerak menggunakan kaki tabung yang pipih dan panjang yang mencuat di antara duri-duri yang menempel pada cangkang Landak laut tersebut. Mulut Landak laut terletak di bagian bawah yang digunakan untuk menguyah makanan. Sementara itu, anusnya menghadap ke atas.

Selain itu, Landak laut juga memiliki 5 lengan berupa gonad yang membentuk garis vertikal dari arah anus menuju arah oral (Aziz, 1979) (Lihat Gambar 1).

Gambar 1. Morfologi Landak laut (a), dan lima garis gonad Landak laut (b)

D. Jenis-jenis Landak laut Ekonomis

Di Indonesia khususnya di P. Tomia, Kabupaten Wakatobi jenis-jenis Landak laut ekonomis ada 6 jenis (Lihat Tabel 1). Landak laut tersebut sudah dikonsumsi secara luas oleh masyarakat setempat sejak 1940-an (Komunikasi langsung degan nelayan P.Tomia, 2013). Landak laut tersebut juga memiliki nilai komersial dan dapat dimakan secara langsung (mentah) dan diperjual-belikan, terutama dari kelompok Landak laut regularia yang termasuk kedalam suku Arbaciidae, Diademantidae, Temnopleuridae, Toxopneustidae, Echinidae, Echniometridae, dan Strongylocentrotidae (Aziz,1979).

Tabel.1 Jenis-Jenis Landak laut yang dikonsumsi oleh masyarakat P.Tomia, Kabupaten Wakatobi (Anonim, 2013)

Jenis Landak laut	Gambar
<i>Echinothrix calamaris</i>
<i>Toxopneustes pileolus</i>
<i>Tripneustes gratilla</i>
<i>Mespilia globus</i>
<i>Diadema setosum</i>
<i>Echiometra Sp</i>

Di Jepang gonad Landak laut dikenal dengan sebutan *Uni* sedangkan di P. Tomia Kab. Wakatobi dikenal dengan nama *Kukure*. *Kukure* adalah produk olahan dari Landak laut yang hanya berupa gonad dan sudah dikemas dalam satu individu cangkang Landak laut yang sudah dirontokkan durinya. Produk *Uni* yang beredar di Jepang selain merupakan produk sendiri, juga di impor dari berbagai negara seperti Amerika, Kanada, Meksiko, Chili, Peru, Hongkong, Taiwan, Australia dan Filipina. Karena itu, produk gonad Landak laut sudah tersebar di dunia.

Sementara itu, jenis Landak laut yang kebanyakan digemari oleh masyarakat Indonesia untuk dikonsumsi hanyalah 4 jenis yaitu *Tripeustas gratilla*, *Diadema sitosum*, *Echinothrix calamaris* dan *Toxopneustes pileolus*. Di Bali, produk Landak laut yang banyak diolah untuk konsumsi hanyalah jenis *Tripneustes gratilla*. Sementara itu di Pulau Taliabu, Maluku Utara jenis Landak laut yang diolah dan banyak digemari untuk dikonsumsi selain *Tripneustes gratilla*, juga jenis *Echinothrix calamaris*, dan *Diadema sitosum*. Sedangkan di P. Tomia daya minat konsumsi terhadap pangan bulu lebih unggul dari masyarakat nelayan lainnya seperti jenis *Tripeustas gratilla*, *Diadema sitosum*, *Echinothrix calamaris*, *Toxopneustes pileolus*, *Mespilia globus* dan *Echiometra Sp* (Anonim, 2012).

E. Reproduksi dan Tanda Kelamin

Pada umumnya Landak laut berkelamin terpisah (*dioecious*), dimana jantan dan betina merupakan individu-individu tersendiri. Spesies *dioecious* secara khusus memiliki rasio seks (gonad) sendiri dan jarang bersifat hemafrodit. Gonad jantan dan betina pada Landak laut tidak sulit dibedakan. Dengan melihat warna gonad Landak laut kita bisa menentukan jenis kelamin dari hewan

tersebut. Misalnya pada Landak laut jenis *Tripneustes gratilla*, gonad jantan berwarna putih sedangkan betina berwarna orange.

F. Siklus Hidup Landak laut

Fertilisasi Landak laut terjadi di luar tubuh inangnya (*external*). Testis dan ovum bertemu dalam air dengan bantuan arus dan gelombang. Setelah bertemu maka terjadi pembuahan membentuk zigot dan membelah membentuk fase morula, blastula, juvenile, Landak laut muda dan dewasa. Pembelahan pertama berlangsung kurang lebih selama 60 menit untuk membelah menjadi 2 sel dan 4 sel. Pembelahan selanjutnya terjadi setiap 30 menit. Setelah 10 jam pada fase blastula, embrio akan mulai aktif berenang. Pada pembelaahan blastula terdapat *stereocilia* dan terdapat banyak silia mengelilingi embrio (Czhiak, 1971).

Pembentukan juvenile individu Landak laut jenis *Tripneustes gratilla* terjadi selama tiga minggu dan mengalami tingkat kematangan gonad pada umur satu tahun (Lihat Gambar 3).

Gambar 3. Siklus hidup Landak laut *Tripneustes gratilla* (Modifikasi dari Mahon dan Parker, 1999).

G. Habitat dan Kepadatan

Landak laut hidup di ekosistem terumbu karang dan lamun. Landak laut banyak dijumpai di daerah intertidal sampai kedalaman 10 m pada salinitas antara 30-34 ppt (Hasan, 2002). Landak laut termasuk hewan dasar perairan (Benthos).

Kepadatan Landak laut juga sangat tergantung pada jenis dan lokasi penyebarannya. Kepadatan Landak laut umumnya berkisar antara 1 individu/m² sampai 50 individu/m². Di Bali kepadatan Landak laut *Tripneustes gratilla* berkisar 1-60 per 50 m² (Aziz, 1979).

H. Makanan

Secara umum Landak laut merupakan herbivora. Landak laut termasuk hewan pemakan lamun. Namun demikian, ada juga Landak laut yang bersifat detritivora seperti *Diadema setosum*. Haerul (2011) megemukakan bahwa tingkat preferensi grazing makanan setiap jenis Landak laut berbeda satu sama lainnya terhadap jenis lamun yang dimakannya seperti *Enhalus acoroides*, *Halophila ovalis*, *Cymodocea rotundata*, *Thalassia hemprichii*, *Syringonium isoetifolium*, *Halodule uninervis*, dan *Halodule pinifolia*. Daya grazing Landak laut sangat beragam, misalnya *Diadema setosum* memakan lamun sebanyak 1.53 g/hr, *Tripneustes gratilla* sebanyak 2.24 g/hr, *Mespilia globulus* sebanyak 1.80 g/hr dan *Echinothrix calamaris* sebanyak 2.93 g/hr.

I. Ukuran

Di Perairan Pulau Barang Lompo, Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan, didapati ukuran Landak laut terbesar memiliki kisaran tinggi cangkang 50-61 mm, diameter cangkang 86-94 mm, berat total 148 - 331 g. Sedangkan ukuran Landak laut terkecil dengan ukuran tinggi cangkang 27,2 - 36,4 mm,

diameter cangkang 47,4 - 66 mm, dan berat total 41,4 - 110,9 g (Gunarto dan Setiabudi, 2002).

Landak laut termasuk organisme yang pertumbuhannya lambat. Umur, ukuran, dan pertumbuhan tergantung kepada jenis dan lokasi (Ratna, 2002). Pertumbuhan *Tripneustes gratilla* sangat cepat pada awal perkembangannya, tetapi jumlahnya terbatas. Hal ini diduga erat kaitannya dengan banyaknya predator seperti ikan Buntal dan ikan Pakol (Nontji, 2005).

J. Produksi

Produksi Landak laut di dunia antara tahun 1958 sampai dengan tahun 1968 berkisar antara 16.000 ton sampai dengan 31.000 ton (Allain, 1972). Pada tahun 1968 produksi Landak laut Jepang sekitar 27.000 ton, Chili 3.700 ton, Korea 600 ton dan Taiwan 300 ton (Allain, 1972). Produksi tersebut terus meningkat, sehubungan dengan makin meningkatnya permintaan gonad dari Jepang.

K. Pemanfaatan Gonad

Gonad Landak laut sebagai produk perikanan telah menjadi komoditi penting di beberapa negara tertentu seperti Jepang, Kanada, Amerika, dan lain-lain (Fuji 1967; Bernhard 1977; Kato & Schroeter 1985). Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan Pulau Tomia, Landak laut sudah lama dimanfaatkan yakni sejak tahun 1940-an. Dari 6 jenis Jenis Landak laut yang dimanfaatkan oleh masyarakat Pulau Tomia khususnya Desa Waitii, Desa Kollo, Kecamatan Onemay, Desa Patua, Desa Kahianga hayang paling dimianati oleh masyarakat adalah jenis *Tripneuses gratila*.

Pulau tomia terkenal dengan pemanfaatn gonad Landak lautnya. Produk Landak laut yang ada di pasar perikanan Pulau Tomia sangat beranekaragam. Mulai dari kukure mentah yang dalam bahasa Tomianya adalah (*kukure matta*),

kukure yang dimasak (*kukure mota'a*) maupun produk Landak laut yang masih utuh dari alam yang langsung dijual ke konsumen. Oleh karena itu, daya konsumsi masyarakat terhadap Landak laut sangat tinggi mulai dari anak-anak, remaja dan orang tua khususnya jenis *Tripneustes gratila*.

L. Teknologi Pemanfaatan

Pemanfaatan Landak laut di Kab. Wakatobi tidak terlepas dari peranan teknologi sebagai alat bantu nelayan dalam memanfaatkan gonad Landak laut. Sehingga teknologi yang digunakan pun mengalami perkembangan (modifikasi). Sampai saat ini, telah tercatat 5 kali terjadi modifikasi alat tangkap di Kab. wakatobi.

Pertama, alat tangkap yang digunakan oleh nelayan adalah ranting kayu bercabang berbentuk huruf "Y" yang dalam bahasa masyarakat nelayan P. Tomia adalah *Kau Pang'nga*. Kelemahan dari alat ini adalah sedikitnya jumlah tangkapan dan lambat dioperasikan sehingga jumlah tangkapan nelayan terbatas.

Kedua, alat tangkap yang digunakan adalah parang yang dalam bahasa masyarakat P. Tomia adalah *Kabali*. *Kabali* relatif lebih cepat dibandingkan *Kau Pang'nga*. Namun untuk kapasitas tangkapan *Kabali* juga tidak berbeda jauh dengan hasil tangkapan *Kau pangga*. Karena alat ini masih menangkap satu persatu Landak laut di alam sehingga masih membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan sejumlah landak laut.

Ketiga, alat tangkap yang digunakan adalah ember yang dalam bahasa Masyarakat nelayan P. Tomia adalah *Embere*. Jumlah tangkapan alat ini telah mengalami peningkatan dari alat tangkap sebelumnya. Alat ini mampu menangkap 20 - 35 ekor per tangkapannya. Kelemahan dari alat ini adalah tidak

bersifat multifungsi sehingga ketika digunakan untuk merontokkan duri landak laut cangkangnya banyak yang rusak.

Keempat, alat tangkap yang digunakan adalah keranjang yang dalam bahasa masyarakat nelayan P. Tomia adalah *Karinda*. Jumlah tangkapan alat ini, lebih besar dibanding *Embere*. Alat ini mampu menangkap 50-70 ekor per tangkapannya. Alat ini juga bersifat multifungsi. Kelebihan alat ini adalah cepat dalam menangkap landak laut dan bisa digunakan untuk merontokkan duri. Kelemahannya adalah pengolah landak laut masih tertusuk oleh duri yang jatuh dari lubang mata keranjang.

Kelima, alat tangkap yang digunakan adaalah jaring nilon yang dalam bahasa masyarakat nelayan P. Tomia adalah *Tanggo* (Gambar 4). Alat ini mampu menangkap 90-100 landak laut. Alat ini juga bersifat multifungsi. Kelebihan alat ini adalah jumlah tangkapan besar dan proses perontokann durinya relatif lebih cepat dibanding *Karinda*. Namun dari segi keamanan alat ini masih memiliki kelemahan yang sama dengan *karinda*. Karena nelayan penangkap dan pengolah landak laut masih tertusuk oleh duri dari lubang mata *Tanggo* tersebut.

Gambar 4. *Tanggo* alat penangkap Landak laut nelayan P.Tomia

M. Metode RAPFISH (*Rapid Appraisal for Fisheries*)

Menurut Pitcher dan Preikshot (2001), keberlanjutan perikanan untuk semua aspeknya, dievaluasi untuk mengetahui statusnya pada suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya berdasarkan statusnya, pengambilan keputusan atau kebijakan untuk mempertahankan dan mengembangkan status dimaksud dapat secara objektif dilakukan dengan cara perbaikan keadaan dari atribut-atribut keberlanjutan perikanan tersebut.

Metode RAPFISH (*Rapid Appraisal for Fisheries*) adalah teknik terbaru yang dikembangkan oleh *University of British Columbia Canada*, yang merupakan analisis untuk mengevaluasi keberlanjutan (*sustainability*) dari perikanan secara multidisipliner. Rapfish didasarkan pada teknik ordinasasi yaitu menempatkan sesuatu pada urutan atribut yang terukur dengan menggunakan *Multi-Dimensional Scaling* (MDS). Aspek dalam Rapfish menyangkut aspek keberlanjutan dari ekologi, ekonomi, teknologi, sosial dan teknologi (Nababan *et.al.*, 2007).

Untuk memenuhi kriteria data yang relevan dengan pendekatan aplikasi Rapfish, maka kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan cara : (1) pengumpulan laporan terkait atau publikasi ilmiah; (2) pengumpulan data yang sama dari sumber berbeda (klarifikasi pemutakhiran data); (3) verifikasi lapangan untuk observasi langsung dan wawancara informasi (dengan nelayan, pengolah, atau informan kunci lainnya) dalam rangka meningkatkan akurasi data; (4) penyiapan kuisioner yang terkait langsung dengan atribut Rapfish (Nababan *et al.*, 2007).

N. Metode AHP (*Analitycal Hierarchy Process*)

AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan

masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hierarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis (Saaty, 1993).

Metode PHA merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam sistem pengambilan keputusan dengan memperhatikan faktor-faktor persepsi, preferensi, pengalaman dan intuisi. PHA menggabungkan penilaian-penilaian dan nilai-nilai pribadi ke dalam satu cara yang logis (Pariakan, 2012). Menurut Saaty (1993), AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Struktur yang berhierarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkriteria yang paling dalam.
2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi ketidak konsistenan (inkonsistensi) berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan.
3. Memperhitungkan daya tahan luaran (*output*) analisis sensitivitas pengambilan keputusan.

Hasil perbandingan dari masing-masing elemen akan berupa angka dari 1 sampai 9 yang menunjukkan perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen. Apabila suatu elemen dalam matriks dibandingkan dengan dirinya sendiri maka hasil perbandingan diberi nilai 1. Skala 9 telah terbukti dapat diterima dan bisa membedakan intensitas antar elemen. Hasil perbandingan tersebut diisi pada sel

yang bersesuaian dengan elemen yang dibandingkan (Saaty, 1993), seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Skala perbandingan secara berpasangan

Intensitas Pentingnya	Definisi	Penjelasan
1	Kedua elemen sama pentingnya	Dua elemen yang menyumbang sama besar pada sifat itu
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada yang lainnya	Pengalaman dan pertimbangan sedikit menyokong satu elemen atas yang lainnya
5	Elemen yang satu esensial atau sangat penting daripada elemen yang lainnya	Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat menyokong satu elemen atas elemen yang lainnya
7	Satu elemen jelas lebih penting dari elemen yang lainnya	Satu elemen dengan kuat disokong, dan dominannya telah terlihat dalam praktik
9	Satu elemen mutlak lebih penting daripada elemen yang lainnya	Bukti yang menyokong elemen yang satu atas yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan
2, 4, 6, 8	Nilai-nilai antara di antara dua pertimbangan yang berdekatan	Kompromi diperlukan antara dua pertimbangan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j , maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i	

Sumber: Saaty (1993)

Untuk definisi kode 1, menunjukkan bahwa antara kedua faktor, sasaran maupun alternatif yang ditawarkan sama pentingnya (*equal importance*), definisi kode 3, menunjukkan faktor, sasaran maupun alternatif (A) sedikit lebih penting (*moderate importance*) dibandingkan dengan alternatif, sasaran maupun faktor (B), definisi kode 5, menunjukkan faktor, sasaran, maupun alternatif (A)

lebih penting (*strong importance*) jika dibandingkan dengan faktor, sasaran, maupun alternatif (B), definisi kode 7, menunjukkan faktor, sasaran maupun alternatif (A) sangat lebih penting (*very strong importance*) jika dibandingkan dengan faktor, sasaran, alternatif (B), sedangkan definisi kode 9 menunjukkan faktor, sasaran, alternatif (A) mutlak lebih penting (*extreme importance*) dibandingkan faktor, sasaran, alternatif (B). Kemudian apabila jawaban yang diperoleh tersebut masih ragu-ragu antara dua skala maka dapat diambil nilai tengahnya, misalkan ragu-ragu antara nilai 3 dan 5 maka dapat dipilih skala 4 dan seterusnya.

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2013. Lokasi penelitian adalah P. Tolandono dan P. Sawa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Gambar 5).

Gambar 5. Peta Lokasi Penelitian

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah meteran rol dan tali rafia untuk membuat transek kuadran, kapal sebagai alat transportasi, peralatan selam dasar untuk pengamatan landak laut, mistar ukur dan kaliper untuk mengukur diameter Landak laut, sabak dan alat tulis menulis untuk mencatat data di lapangan, kamera *under water* untuk mengambil gambar di bawah air dan *Uritech* sebagai alat perontok duri Landak laut.

C. Metode Sampling

Metode sampling yang digunakan yaitu metode transek pada 5 stasiun. Metode ini dilakukan pada dua pulau tersebut. Setiap lokasi pengambilan sampel akan diulang dua kali.

D. Pengukuran Paramater Biologi

a. Komposisi Jenis

Pengamatan sampel setiap lokasi menggunakan alat bantu berupa transek kuadran dengan luas 100 m². Setelah transek terpasang dilakukan pengamatan setiap Landak laut. Landak laut yang ditemukan selanjutnya diidentifikasi jenisnya berdasarkan deskripsi Aziz (1979).

b. Kepadatan

Kepadatan jenis Landak laut *T. gratia* ditentukan dengan menghitung jumlah individu yang ditemukan pada setiap transek di lokasi pengamatan. Selanjutnya dihitung kepadatannya dengan membandingkan jumlah individu per luas area pengamatan. Adapun formulasi yang digunakan adalah :

$$D_i = \frac{n_i}{A}$$

Dimana :

D_i = Kepadatan jenis ke-i

n_i = Jumlah individu ke-i

A = Luas daerah pengamatan.

c. Ukuran Landak laut

Ukuran Landak laut diukur menggunakan mistar ukur dan kaliper yang dilakukan secara insitu berketelitian 1 cm. Setiap Landak laut *T. gratia* yang ditemukan diukur diameter cangkangnya.

d. Tingkat Kematangan Gonad (TKG)

Data tingkat kematangan gonad diperoleh dengan mengurutkan landak laut dari ukuran terkecil sampai yang terbesar yang sudah dibedah (Gambar 6). Kemudian diukur diameter dan dilihat struktur perkembangan gonadnya secara morfologi. Sementara itu untuk menentukan Tingkat kematangan gonad (TKG) maka digunakan panduan tabel tingkat kematangan gonad landak modifikasi dari Metode Cassie, 2007 (Tabel 3)

Gambar 6. Morfologi gonad Landak laut

Tabel 3. Ciri-ciri Tingkat Kematangan Gonad (TKG) Landak laut modifikasi dari Metode Cassie, 2007.

TKG	Betina	Jantan
I	Ovari menyatu dengan panjang gonad kurang dari 2 mm, warnanya jernih.	Testis menyatu dengan panjang gonad kurang dari 2 mm
II	Ovari berwarna orange dan secara morfologis butirannya sudah bisa dilihat dengan kasat mata.	Testis berwarna putih dan butirannya sudah bisa dilihat dengan kasat mata.
III	Ovari berwarna kuning dengan butiran yang lebih jelas dari TKG II dan memanjang hingga $\frac{2}{4}$ bagian menuju arah oral.	Ovari berwarna putih dengan butiran yang lebih jelas dari TKG II dan sudah memanjang hingga $\frac{3}{4}$ bagian menuju arah oral.
IV	Butiran ovari makin besar dan menyatu, berwarna lebih kuning dari TKG III dengan panjang gonad $\frac{3}{4}$ bagian menuju arah oral.	Butiran testis makin besar dan menyatu, berwarna lebih kuning dari TKG III dengan panjang gonad $\frac{3}{4}$ bagian menuju arah oral.
V	Butiran Ovari tidak menyatu, dengan bulatan lebih besar, berwarna kuning tua dengan posisi gonad mencapai oral	Butiran testis tidak menyatu, dengan bulatan lebih besar, berwarna putih susu dengan posisi gonad mencapai oral

E. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui kegiatan wawancara dengan bantuan kuisisioner dan FGD (*Focus Group Discussion*). Responden yang diwawancarai adalah pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan Landak laut yaitu nelayan, tokoh nelayan, dan penyuluh perikanan. Selain itu, juga dilakukan wawancara dengan tenaga ahli berkaitan dengan status terumbu karang, lamun dan mangrove. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait

seperti Balai Taman Nasional Wakatobi Kota Bau-Bau, Kantor Balai Taman Nasional Wakatobi Wilayah III, dan LSM (Komunto dan Rare).

F. Analisis Data

Analisis keberlanjutan sumberdaya Landak laut menggunakan metode RAPFISH yang dimodifikasi dari program RAPFISH (*Rapid Apraisal for Fisheries Sustainability*) yang dikembangkan oleh *Fisheries Center University of British Columbia* (Kavanagh, 2001) yang telah digunakan oleh Fauzi dan Anna, 2002; Hartono et al, 2005; Nababan et al, 2007; Nur, 2011; Nadiarti, 2011. Dimensi dan atribut yang digunakan dalam penilaian kriteria keberlanjutan adalah modifikasi manual EAFM (*Ecological Aproach for Fisheries Management*) dari KKP, WWF, dan PKSPL-IPB (2012).

Analisis ordinasi Rapfish dilakukan melalui tahapan : (1) Penentuan atribut sistem yang dikaji dan pemberian skor; (2) Penilaian setiap atribut dalam skala ordinal berdasarkan kriteria keberlanjutan setiap dimensi; (3) Analisis ordinasi untuk menentukan ordinasi dan nilai stress; (4) Penyusunan indeks dan status keberlanjutan sistem yang dikaji setiap dimensi; (5) Analisis Sensifitas (*Leverage Analysis*) untuk melihat atribut atau peubah yang sensitif memengaruhi keberlanjutan, dan (6) Penilaian keberlanjutan menggunakan indeks keberlanjutan setiap dimensi (Gambar 7)

Gambar 7. Tahapan aplikasi Rapfish (Alder et all, 2000)

Penentuan skor setiap dimensi menggunakan skala likert (0,1,2) berdasarkan nilai indikator yaitu skor maksimum 2 untuk kondisi baik (*good*) dan 0 untuk kondisi jelek (*bad*) dan di antaranya untuk kondisi sedang. Skor definitif adalah nilai modus dari keseluruhan sampel. Penyusunan indeks dan status keberlanjutan pengelolaan Landak laut masing-masing dimensi serta kriteria baik dan buruk mengacu pada konsep yang digunakan oleh Pitcher dan Preikshot (2001), *Rapfish Group* (2006), dan Allahyari (2010) serta pendapat dari para pakar dan stakeholder yang terkait dengan sistem yang dikaji. Nilai indeks

keberlanjutan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 4 kategori seperti yang digunakan Nababan (2007) dimana skor perkiraan setiap dimensi dinyatakan dengan skala terburuk (*bad*) 0% sampai yang terbaik (*good*) 100% (Tabel 4)

Tabel 4. Kategori indeks keberlanjutan untuk setiap dimensi yang dikaji

No	Nilai Indeks	Kategori
1	$X < 25$	Sangat buruk
2	$25 < x < 50$	Buruk
3	$50 < x < 75$	Baik
4	$x > 75$	Sangat Baik

Status keberlanjutan setiap dimensi divisualisasikan dalam bentuk diagram layang-layang (*kite diagram*) yang menggambarkan keberlanjutan dari masing-masing dimensi sehingga status keberlanjutan secara keseluruhan dapat dinilai dan dibobotkan terhadap masing-masing dimensi dengan menggunakan pendapat minimal tiga orang pakar pengelolaan sumberdaya perikanan. Hasil pembobotan dianalisis dengan menggunakan program penentuan bobot dimensi dengan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dengan software *Expert Choice 9.5*. Kemudian masing-masing nilai indeks keberlanjutan dimensi dikalikan dengan bobot tertimbang setiap dimensi dari hasil analisis AHP, kemudian total dari hasil perkalian indeks keberlanjutan dimensi dengan bobot tertimbang menghasilkan nilai status pengelolaan secara multidimensi atau keseluruhan (Budiharsono, 2007). Selanjutnya untuk menentukan status keberlanjutan pengelolaan perikanan Landak laut secara keseluruhan digunakan klasifikasi sebagai berikut: a. Apabila nilai indeks < 50 , berarti status pengelolaan buruk, b. Apabila nilai indeks $50 - 75$, berarti status pengelolaan baik, dan c. Apabila nilai indeks > 75 , berarti status pengelolaan sangat baik.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Biologi Landak laut

Pada penelitian ini parameter biologi hanya difokuskan pada Landak laut jenis *Tripneustes gratila*. Hal ini dikarenakan jenis landak laut tersebut merupakan landak laut yang paling ekonomis dan banyak ditangkap oleh nelayan masyarakat P. Tomia. Oleh karena itu, untuk menilai keberlanjutan pemanfaatan landak laut tersebut maka dilakukanlah pemeriksaan dan pengukuran mengenai tingkat kematangan gonad, kepadatan, dan diameter landak laut jenis *T. gratila*.

1) Komposisi Jenis

Berdasarkan hasil pengamatan pada lokasi penelitian di P. Tolandono dan P. Sawa, Landak laut yang ditemukan ada 4 jenis dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Rata-rata Jumlah Landak laut yang ditemukan di P. Tolandono dan P. Sawa

No	Jenis	Lokasi			
		P.Tolandono		P. Sawa	
		N	%	N	%
1	<i>Tripneustes gratila</i>	40	20.62	47	22.27
2	<i>Echinotrix calamaris</i>	25	12.89	30	14.22
3	<i>Diadema setosum</i>	120	61.86	124	58.77
4	<i>Echinometra Sp</i>	9	4.64	10	4.74
Jumlah		194	100	211	100

Tabel diatas menunjukan bahwa dari keempat jenis Landak laut yang ditemukan di P. Tolandono dan P. Sawa jenis *Diadema setosum* lebih banyak dibanding jenis lain dengan jumlah rata-rata 120 ekor atau 61,86 % dari total jenis Landak laut di P. Tolandono dan 124 ekor atau 58,77 % di P. Sawa. Kemudian posisi kedua terbanyak setelah *Diadema*

setosum adalah jenis *Tripneustes gratila* dengan rata-rata 40 ekor atau 20,62 % dari jumlah total Landak laut yang ditemukan di P. Tolandono dan 47 ekor atau 22,77 % dari jumlah total Landak laut yang ditemukan di P. Sawa (Lihat Gambar 8 dan Gambar 9).

Gambar 8. Persentase jumlah jenis Landak laut yang ditemukan di P. Tolandono

Gambar 9. Persentase jumlah jenis Landak laut yang ditemukan di P. Sawa

Perbedaan jumlah *Diadema setosum* dan *Tripneustes gratila* diduga disebabkan oleh dua faktor yaitu ketersediaan makanan dan teknologi penangkapan. Kegiatan penangkapan landak laut jenis *Diadema setosum* di P.Tomia masih relatif lebih kecil dibanding jenis *Tripneustes gratila* karena *Diadema setosum* memiliki duri yang berbisa yang dapat menusuk nelayan pengolah sehingga banyak nelayan yang

tidak melakukan kegiatan pengolahan kukure jenis *Diadema setosum*. Sementara itu, jenis *Tripneustes gratila* banyak dimanfaatkan oleh nelayan karena lebih bernilai ekonomis dan tidak memiliki duri yang berbisa.

2) Kepadatan Landak laut

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di P. Tolandono dan P. Sawa, kepadatan Landak laut jenis *Tripneustes gratila* yang ditemukan cenderung homogen dengan tingkat kepadatan pada setiap lokasi 1 ekor/m² (Tabel 6).

Tabel 6. Kapadatan *T. gratila* di P. Tolandono dan P. Sawa

Transek	Jumlah Individu (ekor)		Luas area setiap pengamatan (m ²)	Kepadatan (ekor/m ²)
	P. Tolandono	P. sawa		
1	37	29	100	1
2	39	55	100	1
3	41	38	100	1
4	39	37	100	1
5	44	41	100	1

3) Diameter Landak laut

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di P. Tolandono dan P. Sawa diameter terkecil yang ditemukan di lapangan yaitu 2,5 cm dan 2,6 cm. sementara itu, diameter terbesarnya adalah 8,5 cm dan 9 cm

Gambar 10. Komposisi diameter Landak laut yang diteliti

Dari hasil hasil pengamatan morfologi gonad Landak laut jenis *T. gratila* yang sudah diatur dari diameter terkecil ke diameter terbesar kemudian dibedah (Gambar 11). Selanjutnya diukur diameter cangkang dengan kaliper lalu melihat panduan penentuan TKG modifikasi dari Metode Cassie, 2007 sehingga diperoleh kisaran diameter tingkat kematangan gonad (TKG) landak laut jenis *T. gratila* seperti yang terlihat pada Tabel 7.

Gambar 11. Morfologi gonad landak laut *T. gratila* yang sudah dibedah

Tabel 7. Diameter Tingkat Kematangan Gonad *T. gratila*

TKG	Diameter <i>Tripneustes gratila</i> (cm)
I	4,8 – 5
II	5,9 – 6,2
III	6,4 – 6,6
IV	6,8 – 7,5
V	8,5 – 9

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa landak laut jenis *Tripneustes gratila* memijah pada diameter cangkang 8,5 cm dan 9 cm.

B. Dimensi Ekologi

Atribut dimensi ekologi difokuskan pada atribut yang dipertimbangkan memberi pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap tingkat keberlanjutan landak laut. Adapun atribut yang dipilih dan diteliti yaitu : (1) Pencemaran, (2) Habitat khusus: Upwelling, (3) Kecerahan, (4) Tutupan Karang, (5) Eutrofikasi dan (6) Kecepatan Arus. Hasil skoring setiap atribut dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Skor atribut pada dimensi ekologi

No	Atribut	Penilaian	Skor
1	Pencemaran	0.Tercemar 1.Tercemar sedang 2.Tidak tercemar	2
2	Kecerahan	0. <i>Visibility</i> rendah (0 - 5 meter) 1. <i>Visibility</i> sedang (5 - 10 meter) 2. <i>Visibility</i> tinggi (>10 meter)	1
3	Tutupan Karang	0. Tutupan rendah, <29,9% 1. Tutupan sedang, 30-49,9% 2. Tutupan tinggi, >50%	2
4	Eutrofikasi	0.Konsentrasi klorofil a > 10 mg/m ³ 1.Konsentrasi klorofil a 5 -10 mg/m ³ 2.Konsentrasi klorofil a < 5 mg/m ³	2
5	Habitat khusus: <i>Upwelling</i>	0.Tidak diketahui adanya habitat khusus <i>Upwelling</i> 1.Diketahui adanya habitat pemijahan tapi tidak dikelola dengan baik 2.Diketahui adanya habitat pemijahan dan dikelola dengan baik	2
6	Kecepatan Arus	0. kecepatan (0 - 2 m/s) 1.Kecepatan (2 - 4 m/s) 2.Kecepatan (4 - 6 m/s)	2

Data skoring atribut pada Tabel 8 kemudian dianalisis dengan menggunakan *Rapfish*. Hasil analisis *Rapfish* menunjukkan indeks keberlanjutan dimensi biologi masih sangat baik yaitu 88,39 (Gambar 12).

Gambar 12. Ordinası pada dimensi ekologi

Sementara itu, hasil analisis leverage terhadap enam atribut yang diteliti terdapat tiga atribut yang paling sensitif sebagai faktor pengungkit utama yaitu kecerahan, *Upwelling* dan eutrofikasi (Lihat Gambar 13). Tiga atribut ini merupakan atribut yang paling sensitif dalam keberlanjutan dimensi habitat dan ekosistem.

Gambar 13. Sensitivitas setiap atribut pada dimensi ekologi.

Kecerahan perairan sebagai atribut paling sensitif terhadap keberlanjutan habitat dan ekosistem. Kecerahan perairan P. Tomia cukup tinggi yaitu berkisar 7-9 m. Untuk menjaga tingkat kecerahan yang tinggi ini maka perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya proses sedimentasi di kawasan pesisir. Sementara itu, sedimentasi yang tinggi disebabkan oleh erosi di lahan atas akibat kerusakan hutan, dan erosi di daerah pantai akibat penggundulan hutan atau kerusakan hutan mangrove. Oleh karena itu, program rehabilitasi hutan di lahan atas dan rehabilitasi hutan mangrove di daerah pantai sangat penting untuk mencegah terjadinya penurunan tingkat kecerahan. Sementara itu, penurunan tingkat kecerahan dapat memengaruhi nilai produktifitas perairan. Karena cahaya yang masuk tidak bisa menembus perairan secara optimal karena adanya partikel sedimentasi yang menghambat sinar cahaya matahari. Oleh karena itu, kecerahan perairan juga sangat memengaruhi produktifitas perairan.

Keberadaan ekosistem *Upwelling* di perairan P. Tomia sangat menunjang kesuburan perairan Taman Nasional Wakatobi sebagai tempat *nursery ground*, *spawning ground*, dan *feeding ground* untuk sumberdaya Landak laut. Dengan demikian, *Upwelling* menjadi habitat penting dalam menyediakan makanan untuk sumberdaya ikan di sekitarnya. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk melindunginya agar tidak terkontaminasi oleh bahan pencemar dan limbah yang dapat menurunkan nilai produktifitasnya.

Eutrofikasi sebagai salah satu faktor sensitif terhadap keberlanjutan habitat dan ekosistem Landak laut di wilayah pesisir perairan P. Tomia. Berdasarkan hasil penelitian dan sejumlah data sekunder yang diperoleh dari informan habitat Landak laut di kawasan tersebut belum mengalami eutrofikasi karena konsentrasi klorofil-a masih berkisar antara 0,25 - 0,70 mg/m³. Oleh

karena itu upaya pengelolaan dan pencegahan masuknya limbah pertanian dari darat atau pinggiran pantai perlu dijaga agar limpahan unsur hara maupun sedimen yang berlebihan tidak sampai ke daerah lepas pantai yang dapat memengaruhi habitat dan ekosistem Landak laut. Begitupun dengan hasil buangan limbah bahan organik dari kapal-kapal yang berlayar di wilayah pesisir P. Tomia diupayakan agar dapat diminimalisir untuk menghindari pengayaan nutrien yang berlebih (*eutrofikasi*). Perbaikan ekosistem pesisir seperti rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan lamun dapat menjadi pembatas hara dan nutrien untuk sampai ke daerah lepas pantai sehingga dapat mencegah terjadinya eutrofikasi pada habitat sumberdaya Landak laut yang berada di perairan P. Tomia.

C. Dimensi Biologi

Atribut dimensi biologi difokuskan pada atribut yang dipertimbangkan memberi pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap tingkat keberlanjutan landak laut. Adapun atribut yang dipilih dan diteliti yaitu: (1) Diameter landak laut, (2) komposisi spesies, (3) range collapse, (4) CPUE Landak laut (5) status eksploitasi, (6) proporsi Landak laut belum memijah, dan (7) pengayaan stok. Hasil skoring setiap atribut dimensi sumberdaya Landak laut berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang diperoleh disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Skor atribut pada dimensi biologi

No	Atribut	Penilaian	Skor
1	Diameter Landak laut	0. Ukuran menurun drastis >5mm 1. Ukuran menurun sedikit < 5mm 2. Ukuran relative tetap	2
2	Komposisi spesies	0. 1-5 jenis Landak laut 1. 6-12 jenis Landak laut 2. >12 jenis Landak laut	0
3	Range collaps	0. Fishing ground sangat jauh 1. Fishing ground jauh 2. Fishing ground relative tetap	2
4	CPUE Landak laut	0. Penurunan CPUE >100 kg/trip 1. Penurunan CPUE 25-100 kg/trip 2. Penurunan CPUE <25kg/trip	2
5	Status Eksploitasi	0. Over eksploited 1. Fully eksploited 2. Moderat/non eksploited	2
6	Proporsi Landak laut belum memijah	0. Banyak sekali (> 60%) 1. Banyak (30-60%) 2. Sedikit (30%)	2
7	Pengayaan stok	0. Belum ada kegiatan pengayaan stok. 1. Ada pengayaan stok masih dalam taraf ujicoba. 2. Ada pengayaan stok setiap tahun.	0

Hasil analisis Rappfish skor atribut Tabel 9 menghasilkan indeks keberlanjutan 85,10 yang berarti nilai keberlanjutannya sangat baik (Gambar 14).

Gambar 14. Ordinasasi pada dimensi biologi

Sementara itu, dari hasil analisis leverage pada atribut dimensi biologi diperoleh tiga atribut paling sensitif terhadap nilai indeks keberlanjutan landak laut yaitu: komposisi spesies, tingkat eksploitasi dan CPUE Landak laut (Gambar 15).

Gambar 15. Sensitivitas setiap atribut pada dimensi biologi

Atribut komposisi spesies muncul sebagai atribut sensitif pertama disebabkan karena populasi Landak laut di Perairan P. Tomia beranekaragam. Dari hasil penelitian ditemukan 4 jenis Landak laut. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk tetap menjaga keberlanjutannya dengan membatasi jumlah penangkapan Landak laut agar tidak mengalami degradasi spesies. Langkah-langkahnya adalah dengan membuat regulasi pembatasan jumlah tangkapan, serta melarang penangkapan Landak laut yang belum pernah memijah.

Atribut tingkat eksploitasi menjadi faktor sensitif kedua dikarenakan penangkapan Landak laut belum optimal. Kemampuan alam untuk memproduksi Landak laut tinggi sementara nelayan penagkap Landak laut masih sedikit. Di P.

Tomia, hanya terdapat enam orang nelayan yang mata pencaharian utamanya sebagai nelayan pengolah Landak laut. Dengan demikian, pemanfaatan sumberdaya Landak laut di perairan P. Tomia belum optimal sehingga belum mengalami overfishing. Namun demikian, perlu dilakukan upaya pengelolaan yang baik yaitu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dari Landak laut seperti upaya pembatasan jumlah tangkapan nelayan dan ukuran Landak laut yang akan ditangkap.

Atribut CPUE merupakan faktor pengungkit ketiga dikarenakan kegiatan penangkapan Landak laut di perairan P. Tomia belum optimal. Rata-rata nelayan hanya menangkap 2 dan 3 keranjang per harinya dengan isi per keranjangnya 30 ekor. Namun tetap diharapkan kegiatan pemanfaatan Landak laut bisa dikelola dengan baik sehingga pemanfaatan telur Landak laut dapat berkelanjutan meskipun pemanfaatannya belum optimal.

D. Dimensi Teknologi

Atribut dimensi teknologii difokuskan pada enam atribut yang dipertimbangkan memberi pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap tingkat keberlanjutan landak laut. Adapun atribut yang dipilih dan diteliti yaitu: (1) ukuran kapal; (2) penangkapan landak laut; (3) modifikasi alat tangkap; (4) tempat pendaratan; (5) penangkapan landak laut yang bersifat destruktif; dan (6) kualitas hasil penanganan telur Landak laut. Hasil skoring setiap atribut dimensi teknologi penangkapan berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang diperoleh disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Skor atribut pada dimensi teknologi

No	Atribut	Penilaian	Skor
1	Ukuran kapal	0. <10 m 1. 10-20 m 2. >20 m	0
2	Penangkapan Landak laut	0. Tidak ramah lingkungan 1. Berpotensi mencemari lingkungan 2. Ramah lingkungan	2
3	Modifikasi alat tangkap	0. Ada perubahan untuk meningkatkan kapasitas alat 1. Ada tapi sedikit perubahan kapasitas alat 2. Tidak ada perubahan kapasitas alat	0
4	Tempat pendaratan	0. Kampung nelayan 1. TPI Kecamatan 2. TPI Kabupaten	0
5	Penangkapan Landak laut bersifat destruktif	0. Frekuensi pelanggaran >10 kasus pertahun 1. Frekuensi pelanggaran 5 -10 kasus pertahun 2. Frekuensi pelanggaran < 5 kasus pertahun	2
6	Kualitas hasil penanganan telur Landak laut	0. Kualitas buruk 1. Kualitas sedang 2. Kualitas baik	2

Hasil analisis Rapfish skor atribut Tabel 10 menghasilkan indeks keberlanjutan 67,54 yang berarti nilai keberlanjutannya masih baik (Gambar 14).

Gambar 16 . Ordinasi pada dimensi teknologi

Sementara itu, berdasarkan hasil analisis leverage dari enam atribut dimensi teknologi terdapat dua atribut yang paling sensitif dan perlu menjadi perhatian utama yaitu modifikasi alat penangkapan dan ukuran kapal (Lihat Gambar 17).

Gambar 17. Sensitivitas setiap atribut pada dimensi teknologi penangkapan

Munculnya atribut modifikasi alat penangkapan sebagai atribut yang sensitif karena terjadi peningkatan kapasitas dari keranjang yang relatif kecil menjadi keranjang yang lebih besar sehingga dikhawatirkan akan mengakibatkan degradasi sumberdaya Landak laut. Begitu juga dengan penambahan satu alat tangkap baru seperti *Tanggo* dengan kapasistas besar yakni 90-100 ekor per alat. Sehingga kapasitas yang besar tersebut perlu ditangani dan dikelola dengan baik. karena penambahan tangkapan dari keranjang tradisional 50-70 ekor menjadi 90-100 ekor merupakan jumlah yang sangat besar. Maka berdasarkan indikator tersebut maka perlu langkah-langkah untuk mencegah terjadinya modifikasi alat untuk peningkatan kapasitas yang terlalu besar melalui peraturan pembatasan jumlah keranjang dan ukuran jaring nilon.

Atribut kedua yang sensitif atau menjadi faktor pengungkit adalah ukuran kapal. Perubahan ukuran kapal sangat memengaruhi jumlah muatan dan jarak penangkapan. Sehingga dengan peningkatan ukuran kapal dapat meningkatkan intensitas penangkapan dan perluasan area penangkapan (*fishing ground*) ke arah yang lebih jauh. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pembatasan ukuran kapal serta jumlah trip dalam kegiatan penangkapan sumberdaya Landak laut.

Pengukuran nilai-nilai keberlanjutan setiap dimensi pada pengelolaan Landak laut secara keseluruhan menunjukkan indeks keberlanjutan tertinggi adalah dimensi ekologi sebesar 88,39 (sangat baik) kemudian dimensi biologi 85,10 (sangat baik) dan indeks keberlanjutan teknologi penangkapan 67,54 (baik) (Gambar 18). Berdasarkan diagram layang-layang (*kite diagram*) dimensi biologi dan dimensi teknologi penangkapan perlu mendapat perhatian untuk diambil langkah-langkah perbaikan.

Gambar 18. Hasil analisis Rapfish (nilai indeks keberlanjutan masing-masing dimensi dalam pengelolaan landak laut di Wakatobi).

E. Analisis Status Keberlanjutan Multidimensi

Hasil analisis keberlanjutan secara keseluruhan dengan Program Penentuan Bobot Dimensi dengan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dari tiga orang pakar yang dianalisis dengan expert choice 9.5 diperoleh nilai keberlanjutan multidimensi sebesar 82,40 atau secara umum pengelolaan Landak laut berdasarkan pendekatan Biologi, Ekologi, dan Teknologi penangkapan di Perairan P. Tolandono dan P. Sawa tergolong kategori baik (Tabel 11).

Tabel 11. Nilai aspek keberlanjutan seluruh dimensi yang dihitung dari hasil analisis AHP dan indeks keberlanjutan setiap dimensi

Atribut	eC			Bobot	Bobot	Aspek	Jumlah
	R1	R2	R3	gabungan	tertimbang	keberlanjutan	nilai
Biologi	0.455	0.143	0.455	0.3094	0.3869	85.10	32.9291
Ekologi	0.091	0.714	0.455	0.3092	0.3868	88.39	34.1862
Teknologi penangkapan	0.455	0.143	0.091	0.1809	0.2263	67.54	15.2835
Jumlah	1	1	1	1	1	241.03	82.3988

Indeks ini menunjukkan bahwa status pengelolaan Landak laut di Perairan P. Tolandono dan P. Sawa berdasarkan pendekatan Biologi, Ekologi, dan teknologi sangat berkelanjutan. Namun demikian, ada beberapa atribut yang perlu mendapat perhatian serius yaitu pembatasan ukuran alat tangkap, ukuran kapal dan jumlah tangkapan Landak laut yang dikhawatirkan bisa mengurangi ketersediaan sumberdaya Landak laut di alam sehingga perlu dilakukan usaha budidaya (*aquaculture*) Landak laut dalam menyeimbangi kegiatan penangkapan yang semakin intensif akibat dari modifikasi alat tangkap seperti *Tanggo* dan *Uritech*. Berdasarkan nilai bobot gabungan) maka yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan status pengelolaan perikanan Landak laut saat ini agar dapat lebih baik lagi adalah perbaikan dimensi teknologi (gambar 19)

Gambar 19. Nilai keberlanjutan masing-masing

Strategi perbaikan dimensi teknologi antara lain melakukan kegiatan membatasi jumlah tangkapan, menentukan ukuran tangkapan, serta menangkap Landak laut minimal telah satu kali melakukan pemijahan. Sehingga dengan upaya perbaikan tersebut akan menunjang dan mampu memperbaiki dimensi keberlanjutan biologi dan ekologi.

F. Analisis Monte Carlo

Analisis Monte Carlo menunjukkan bahwa nilai status indeks keberlanjutan pengelolaan perikanan Landak laut di perairan P. Tolandono dan P. Sawa pada selang kepercayaan 95% untuk masing-masing dimensi memiliki perbedaan dengan MDS (%) dilihat pada (Tabel 12).

Tabel 12. Perbedaan indeks keberlanjutan antara Rapfish (MDS) dengan Monte Carlo

Dimensi Keberlanjutan	Indeks Keberlanjutan MDS(%)	Indeks Keberlanjutan Montecarlo (%)	Perbedaan (selisih)
Biologi	85.10	80.81	4,29
Ekologi	88.39	85,46	2,93
Teknologi	67.54	66,04	1,50

Menurut Kavanagh (2001) kesalahan dalam analisis Monte Carlo disebabkan oleh beberapa faktor antara lain dampak kesalahan skoring akibat minimnya informasi, dampak dari keragaman dalam skoring akibat perbedaan penilaian, kesalahan dalam menginput data dan tingginya nilai stress yang diperoleh. Hal ini menunjukkan kesalahan dalam analisis Monte Carlo tidak terjadi pada *Rap Flying Fish* dan analisis *Rap Flying Fish* sangat baik digunakan sebagai salah satu alat evaluasi keberlanjutan pengelolaan perikanan Landak laut di perairan Taman Nasional Wakatobi.

Tabel 13. Pengukuran statistik dari nilai Stress dan R-squared dengan MDS

No.	Dimensi	Nilai Stress	Squared correlation (R^2)
1	Biologi	0,14	0,93
2	Ekologi	0,14	0,94
3	Teknologi	0,15	0,93

Berdasarkan hasil analisis Rap Flying Fish diperoleh nilai stress dimensi biologi dan ekologi adalah 0,14 sedangkan dimensi teknologi 0,15 dan nilai determinasi (R^2) dimensi Biologi dan Teknologi adalah 0,93 dan 0,94 untuk dimensi Ekologi (Tabel 9). Nilai Stress dan nilai R^2 (*Coefisien Determinasi*) cukup baik. Menurut Kavanagh dan Pitcher (2004) nilai stress yang baik kurang dari 0,25 dan nilai R^2 mendekati 1,0. Nilai-nilai ini menunjukkan atribut setiap dimensi pengelolaan Landak laut yang dikaji dengan menggunakan analisis RAPFISH yang dikembangkan oleh *University of British Columbia Canada* cukup akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Komposisi jenis landak laut ekonomis yang ditemukan di Perairan P. Tolandono dan P. Sawa ada 4 jenis adalah: (1) *Tripneustes gratila*; (2) *Echinothrix calamaris*. (3) *Mespilia globus*; dan *Ecnimometra. Sp.*
2. Diameter Landak laut jenis *Tripneustes gratila* yang di temukan di P. Tomia dan P. Tolandono berkisar antara 2,5 cm dan terbesar 9 cm.
3. Landak laut jenis *Tripneustes gratila* pertama kali matang gonad pada ukuran diameter cangkang 4,8 cm dan memijah pada diameter cangkang 8,5 - 9 cm. TKG 1 berada pada kisaran ukuran 4,8 – 5 cm, TKG II ukuran 5,9 – 6,2 cm, TKG III ukuran 6,4 – 6,6 cm, TKG IV ukuran 6,8 – 7,5 cm dan TKG V pada ukuran 8,5 cm - 9 cm
4. Berdasarkan indeks keberlanjutan setiap dimensi pengelolaan Landak laut di Perairan Taman nasional wakatobi, indeks tertinggi terletak pada dimensi ekologi sebesar 88,39 (sangat baik), kemudian indeks keberlanjutan dimensi biologi 85,10 (sangat baik) dan yang terendah indeks keberlanjutan teknologi penangkapan 67,54 (baik). Sehingga secara keseluruhan pengelolaan landak laut di Perairan Taman Nasional Wakatobi masih berdada dalam kategori baik namun demikian untuk dimensi teknologi penangkapan, perlu digarisbawahi untuk menjadi objek perhatian yang harus diperhatikan karena berpotensi buruk jika tidak diperhatikan dalam pengelolaan perikanan landak laut.

B. Saran

Mengingat landak laut merupakan komoditas ekonomis di Pulau Tomia dan telah dimanfaatkan secara kontinu oleh masyarakat Kab. Wakatobi, maka diharapkan ada penelitian lebih lanjut mengenai aspek biologi jenis-jenis Landak laut yang ditemukan beserta status keberlanjutannya sebagai informasi ilmiah yang lebih memadai dibanding kegiatan penelitian ini. Sehingga data tersebut dapat dijadikan dasar kebijakan secara kolektif dalam pengelolaan perikanan landak laut dalam pendekatan multidimensi. Selain itu, juga diharapkan ada penelitian lanjutan di kawasan zona lainnya seperti zona Inti, zona penyangga, dan zona lainnya di Perairan Taman Nasional wakatobi.

C. Rekomendasi

Meskipun secara hasil akhir nilai indeks keberlanjutan perikanan Landak laut dari penelitian penulis masih dalam kategori baik. Namun, aspek teknologi harus menjadi prioritas stakeholder dalam membentuk RPP landak laut. Adapun objek atribut yang perlu diperhatikan adalah ukuran Alat tangkapan dan modifikasi alat tangkap.

Ukuran alat tangkap di lokasi penelitian penulis telah mengalami modifikasi untuk meningkatkan kapasitas tangkapan. sementara itu, tidak ada standar ukuran maksimal alat tangkap. Oleh karena itu, stakeholder perlu menetapkan ukuran maksimal yang bisa digunakan oleh nelayan sehingga keberlanjutan landak laut tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan nelayan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, W.R. 2001. *Reproduksi Dan Siklus Landak laut* (Echinoidea). Oseana : Volume XXVI, Nomor 3, 2001 : 25 -36.
- Allain, J.Y.1972. *La Peche Aux oursins das le monde, La peche maritim* : 625-630.
- Anonim. 2012. *Landak laut Merah, Hewan yang Nyaris "Hidup Selamanya"* [online].www.kompas.com/teknologi/news/0311/25/163940.htm. 22 April 2007
- Anonim. 2013. *Saudara Tua Manusia Tubuhnya Berduri* [online].<http://www.kompas.com/ver1/lptek/0611/10/152724.htm>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2013.
- Anonim. WPI edisi November 2012, no.27. *Direktorat Pemasaran Dalam Negeri. Direktorat Jendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perairan. Departemen Kelautan dan Perikanan*. Diakses tanggal 5 desember 2012.
- Anonim. 2012. *BuluBabi* [online]. www.pipp.dkp.go.id/pipp2/species.html?idkat=12&idsp=259. Diakses pada tanggal 22 desember 2012.
- Azziz, A. Dan P. Darsono.1979. Reproduksi Landak laut, *Diadema Setosum* (leske) di daerah gugus pulau pari, pulau-pulau serbu, Jakarta. Makalah kongres Nasional Biologi IV, Bandung.
- Balai Taman Nasional Wakatobi. 2012. Informasi Taman Nasional Wakatobi [online]. www.tamannasionalwakatobi.org [diakses 5 Desember 2012].
- Bernhard,F.R.1977. Fishery and Reproductive Cycle of The Red Sea Urchin *Strongylocentrotus franciscanus*, In *Brirish Columbia, Jour,Fish,Res,Board Canada* 34(5) : 604-610.
- Bouyoucos, C. J. 1962. *Hydrometer method improved for making particle size analysis of soils*. *Agronomy Journal* (54): 464 - 465.
- Brotowidjoyo, 2000. *Zoologi Dasar*. Erlangga. Jakarta.
- Budiharsono S. 2002. *Manual penentuan status dan faktor pengungkit PEL*. Direktorat Perekonomian Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Jakarta.
- Budiharsono, S. 2007. *Penentuan status dan faktor pengungkit PEL*.Direktorat Perekonomian Daerah. Bappenas. Jakarta
- Budiyanto A., Djuwariah dan Y. I. Ulumudd. 2009. *Monitoring Terumbu Karang Wakatobi*. COREMAP II – LIPI. Jakarta. 64 hal.
- Czihak .G. 1971. *Echinoids In Experimen-tal Embryology of Marine and Fresh-Water Invertebrates* (G. Reverberi ed.). Nort-Holland Publishing Company Amsterdam, London: 363 - 506.
- Conand, C. and N.A. Sloan. 1989. *World Fishries for Echinoderms*. In : *Caddy (ed). Mrine Invertebrat Fisheries, Their assessment and management*. John willey & sons, New York : 647-663.
- COREMAP. 2012. *Peta Lokasi COREMAP Wakatobi* [online]. www.coremap.or.id [diakses 5 Desmber 2012].

- Darsono P dan Toso A V. 1987. *Umur dan Pertumbuhan Landak laut Diadema setosum Leske di Perairan Terumbu karang Gugus Pulau Pari, Pulau-Pulau Seribu*. Jakarta : Puslitbang Oseanologi LIPI.
- Darsono. P. 1986. *Gonad Landak laut*. Oseana. 11 (4): 151 - 162.
- Direktorat Sumberdaya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan., WWF Indonesia., dan PKSPL-IPB. 2012. *Modul Penilaian Pendekatan Ekosistem Dalam Pengelolaan Perikanan (Ecosystem Approach to Fisheries Management)*. Training EAFM. Bogor.
- Fuji, A.1967. Ecological studies on the growth an food consumption of japanse common littoral sa urchin, strongylocentrotus intermediu (A.Agassizi).Mem.Fac.Hokkaido Univ, 15 (2) : 160 pp.
- Gunarto dan Setabudi E. 2002. *Perkembangan Gonad Landak laut (Tripneustes gratilla)* di Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan. Jakarta : Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Haerul, Andi. 2011. *Preferensi Granzing Landak laut terhadap Padang lamun*. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Hasan F. 2002. *Pengaruh konsentrasi garam terhadap mutu produk fermentasi gonad Landak laut jenis Tripneustes gratilla (L)* [skripsi]. Bogor : Departemen Teknologi Hasil Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.
- Kavanagh, P. 2001. RAPFISH Software Description (for Microsoft Excel). Rapid Appraisal for Fisheries Project. Fisheries Centre, UBC. Vancouver. 36p.
- Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK. 149/IV-KK/2007 Tentang Zonasi Taman Nasional Wakatobi.2010
- Kato, S. and S.C.Schroeter 1985. Biology of the red a urchin, Strongylocentrotu francicanus, and its fisher in California. Mar. Fish.Rev.47(3): 1-20.
- Kurnia. 2006. *Meraup Yen dengan Memelihara Landak laut* [online]. www.beritaipetek.com. Diales pada tanggal 20 Desember 2012.
- Lee, Y.Z. and N.F Haard. 1982. Evalution af the green sea urchin gonad as a food source. Can. Inst. Food. Sci. Technol. J. 15 (3): 233-235.
- Mahon, R., Almerigi, S., Attapatu, A., Cumberbatch, J., Leslie, D., McConney, P. & Parker,C.1999. *Barbados Coastal Conservation Programme* (Phase 1). Demonstration projects. Final report for: Community-based sea urchin management. 32 pp.
- Mansyur, L. 2008. *Analisis Pengembangan Ekowisata Bahari Pulau Tolandono Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara* [Tesis]. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar. 129 hal.
- Nababan, B.O., Yesi, D.S.,dan Maman, H. 2007. Analisis Keberlanjutan Perikanan Tangkap Skala Kecil Di Kabupaten Tegal Jawa Tengah (Teknik Pendekatan Rapfish). Jurnal Kebijakan dan Riset sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Jakarta. 2 (2): 137-158.
- Nontji A. 2005. *Laut Nusantara*. Jakarta : Djambatan.

- Pariakan, A. 2012. Analisis Kesesuaian Perairan dan Pengembangan Budidaya *Kappaphycus alvarezii* di Wilayah Klaster Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Tesis. Program Pasca Sarjana Unhas. Makassar.
- Pitcher, T.J., D. Preikshot. 2001. *Rapfish, A Rapid Appraisal Technique for Fisheries, and Its Application to the Code of Conduct for Responsible Fisheries*. J. Fisheries Research 49: p 255 – 270.
- Pratisto, A. 2009. Statistik Menjadi Mudah dengan SPSS 17. PT Alex Media Komputindo. Jakarta. 325 hal.
- Pratt, H S. 1935. *A Manual of The Common Invertebrates Animals*. McGraw Hill. Company Inc :New York.
- RAPFISH Group. 2006. *Standard attributes for rapfish analyses evaluation fields for ecological, technonogical, economic, sosial and ethical status*. Fisheries Centre, UBC. Vancouver
- Ratna F D. 2002. *Pengaruh penambahan gula dan lama fermentasi terhadap mutu pasta fermentasi gonad Landak laut Diadema setosum dengan Lactobacillus plantarum sebagai kultur starter* [skripsi]. Bogor : Departemen Teknologi Hasil Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.
- Saaty, T.L. 1993. Proses Hirarki Analitik Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia atas Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (LPPM) dengan PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta. 270 hlm.
- Shahidi F and Botta. 1994. *Seafoods Chemistry, Processing Technology and Quality*. London : Blackie Academic Professional.
- Sugiyono. 2006. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung. 306 hal.
- Timotius, S. 2012. *Biologi Terumbu Karang* [online]. www.terangi.or.id/publications/pdf/biologikarang.pdf. 22 Desember 2012.
- Radjab. A.W. 1998. *Pertumbuhan dan Reproduksi Landak laut Tripneustes gratilla (L) di Perairan Tamedan , Pulau Dullah, Maluku Tenggara. Prosiding Seminar Kelautan LIPI - UNHAS Ke 1*. Balitbang Sumberdaya Laut, Puslitbang Oseanologi - LIPI: 149 - 156.

Lampiran 1.

Nama Responden :
 Jenis Kelamin :
 Umur :
 Status Nelayan/Pemerintah :
 Hari/ Tanggal :
 Kabupaten/Kec/Desa :

Dimensi Sumberdaya Landak Laut

No	Indikator / Atribut	Penjelasan	Metodologi / Pengumpulan data	Kriteria
1	Ukuran Landak laut (Diameter)	Perubahan ukuran Landak laut.	Sampling, pengukuran diameter rata-rata dan membandingkan dengan 2 tahun yang lalu, data sekunder, wawancara	0 : Ukuran Landak laut menurun drastis >5 mm 1 : Ukuran Landak laut menurun sedikit < 5 mm 2 : Ukuran Landak laut relatif tetap
2	Komposisi spesies	Komposisi jenis Landak laut	Observasi, sampling dan data sekunder	0 : 1-5 jenis Landak laut 1 : 5-10 jenis Landak laut 2 : >10 jenis Landak laut
3	Range collapse	Landak laut semakin jauh ditemukan	Survei dan wawancara	0 : Fishing ground sangat jauh 1 : Fishing ground jauh 2 : Fishing ground relative tetap
4	CPUE Landak laut	Hasil tangkapan persatuan upaya (trip/kapal)	Fishlanding di TPI dan data wawancara langsung ke nelayan	0 : Menurun CPUE > 100 kg/trip 1 : Menurun sedikit 25-100 kg/trip 2 : Stabil atau meningkat < 25
5	Proporsi Landak laut muda	Persentase Landak laut yang tertangkap yang belum matang	Sampling dan pengukuran TKG	0 : Banyak sekali (> 60%) 1 : Banyak (30-60%) 2 : Sedikit (30%)
6	Pengayaan stok	Penebaran bibit di alam untuk menambah populasi landak laut	Survei dan wawancara	0 : Belum ada pengkayaan stok 1 : Ada pengayaan stok dalam tahap uji coba 2 : Ada pengayaan stok setiap tahun

Dimensi Habitat dan Ekosistem

No	Indikator / Atribut	Penjelasan	Metodologi / Pengumpulan Data	Kriteria
1	Pencemaran perairan	Teridentifikasi limbah pencemar bahan kimia dan berbahaya beracun	Data Sekunder	0 : Tercemar 1 : Tercemar sedang 2 : Tidak tercemar
2	Kecepatan arus	Akumulasi kecepatan arus per satuan waktu	Data primer, data sekunder	0. Kecepatan (0-2 m/s) 1. Kecepatan (2-4 m/s) 2. Kecepatan (4-6 m/s)
2	Kecerahan	Tingkat transparansi cahaya ke dalam perairan	Survei, data sekunder, dan secchi disk	0 : Visibility rendah (0-5 meter) 1 : Visibility sedang (5-10 meter) 2 : Visibility tinggi (>10 meter)
3	Tutupan karang	Persentase tutupan karang	Transek, data sekunder atau citra satelit	0 : Tutupan rendah <25% 1 : Tutupan sedang 25-49,9% 2 : Tutupan tinggi > 50%
4	Eutrofikasi	Tingkat pencemaran akibat masuknya unsur hara yang memicu pertumbuhan fitoplankton	Survei, data sekunder atau data citra satelit	0 : Konsentrasi klorofil a > 10 mg/m ³ 1 : Konsentrasi klorofil a 5-10 mg/m ³ 2 : Konsentrasi klorofil a < 5 mg/m ³
6	Habitat Khusus: Upwelling	Habitat yang kaya unsur hara pembawa makanan	Survei, data sekunder dan wawancara	0 : Tidak diketahui adanya habitat khusus Upwelling 1 : diketahui tapi tidak dikelola dengan baik 2 : Diketahui adanya Upwelling dan dikelola dengan baik

Dimensi Teknologi Penangkapan

No	Indikator/atribut	Penjelasan	Metodologi / Pengumpulan Data	Kriteria
1	Ukuran kapal	Ukuran panjang kapal	Survei dan laporan hasil pengawasan	0.<10 m 1.10-20 m 2.>20 m
2	Penangkapan Landak laut yang ramah lingkungan	Menilai jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan	Survei dan wawancara	0.Tidak Ramah lingkungan 1.Ramah lingkungan
3	Modifikasi alat penangkapan	Perubahan alat tangkap untuk menambah kuantitas	Survei, wawancara, dan data sekunder	0.Ada perubahan untuk meningkatkan kapasitas alat 1.Tidak ada perubahan perkapasitas alat
4	Tempat pendaratan	Tempat hasil tangkapan di daratkan	Survei dan wawancara	0 : Kampung nelayan 1 : TPI Kecamatan 2 : TPI Kabupaten
5	Penangkapan Landak laut bersifat destruktif	Tingkat kerusakan dan pelanggaran akibat dari penggunaan alat tangkap	Survei dan wawancara	0.Frekuensi pelanggaran >10 kasus pertahun 1.Frekuensi pelanggaran 5-10 kasus pertahun 2.Frekuensi pelanggaran< 5 kasus pertahun
6	Kualitas hasil penanganan telur Landak laut	Tekstur dan warna gonad Landak laut	Survei dan wawancara	0.Kualitas buruk 1.Kualitas sedang 2.Kualitas baik

Lampiran 2

Kuisisioner Proses Hierarki Analisis (PHA)
STUDI KEBERLANJUTAN PERIKANAN LANDAK LAUT
Oleh : La Nane
Program Studi Manajemen Sumberdaya Perikanan
Universitas Hasanuddin

IDENTITAS RESPONDEN		
Nama	:	
Pekerjaan	:	
Pendidikan Terakhir	:	
Umur	:	Tahun
Jenis Kelamin	:	

PETUNJUK PENGISIAN
Berilah tanda lingkaran (O) pada kolom skala Faktor, sasaran, alternatif (A) atau pada kolom skala Faktor sasaran, alternatif (B) yang sesuai dengan pendapat anda
Definisi Kode :
1: kedua Faktor, sasaran, alternatif, sama penting (<i>equal importance</i>)
3: Faktor, sasaran, alternatif (A) sedikit lebih penting (<i>moderate importance</i>) dibandingkan dengan Faktor, sasaran, alternatif (B)
5: Faktor, sasaran, alternatif (A) lebih penting (<i>strong importance</i>) dibanding dengan Faktor, sasaran, alternatif (B)

7: Faktor, sasaran, alternatif (A) sangat lebih penting (*very strong importance*) dibanding dengan Faktor, sasaran, alternatif (B)

9: Faktor, sasaran, alternatif (A) mutlak lebih penting (*extreme importance*) dibanding dengan Faktor, sasaran, alternatif (B)

Dan jika ragu-ragu antara 2 skala maka ambil nilai tengahnya, misalkan anda ragu-ragu antara 3 dan 5 maka pilih skala 4 dan seterusnya.

DAFTAR PERTANYAAN

PENDAPAT RESPONDEN

Faktor terhadap Fokus

Kriteria A	STUDI KEBERLANJUTAN PERIKANAN LANDAK LAUT																Kriteria B	
Sumberdaya Ikan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Habitat
Sumberdaya Ikan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Teknologi Penangkapan
Habitat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Teknologi Penangkapan