ISBN 978-602-18999-3-9

PROSIDING SEMNAS DAN PIT IGI XVII

JAKARTA 23-25 OKTOBER 2015

**GEO MARITIM :
UPAYA MEWUJUDKAN POROS MARITIM
DUNIA DALAM PERSPEKTIF
GEOGRAFI**

**PROSEDING SEMINAR NASIONAL
DAN PIT IGI XVII**

**GEO MARITIM : UPAYA MEWUJUDKAN POROS
MARITIM DUNIA DALAM PERSPEKTIF GEOGRAFI**

Editor : Dr. Muzani Dipl-Eng,M.Si
Aris Munandar,SP. d,M.Si
Cahyadi Setiawan M.Si
Ode Sofyan Hardi ,S.Pd,M.Si
Ilham Mataburu M.Si

Cover : Sukowati

ISBN : 978-602-18999-3-9

Kuswaji Dwi Priyono & Gita Amalia	365
Strategi Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir Nandi	371
Kajian Geografis Perbatasan Laut Antara Indonesia Dan Malaysia Riki Rahmad, Mona Adria Wirda	379
Analisis Kesesuaian Lahan Tambak Dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi (Studi Kasus di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara) Shandy Kuengo, Nawir N. Sune	388
Model Indeks Kerusakan Lahan Di Kabupaten Banjarnegara Berbasis Pengolahan Citra Landsat 8 Sigit Heru Murti	400
Pentingnya Terumbu Karang Bagi pariwisata Bahari di Kepulauan Seribu Aris Munandar, Dede Rohmat	413
Pengelolaan Pesisir Dan Laut Untuk Mendukung Pariwisata Di Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah Yatin Suwamo	420
 D. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP , KEBENCANAAN DAN PERUBAHAN IKLIM	
Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Aliran Lahar Gunungapi Kelud Di Sungai Bladak Vera Arida	426
Bencana Ekologis : Studi Kasus Dampak Reklamasi Pantai Marina Semarang Terhadap Inundasi dan Abrasi di Kecamatan Sayun Demak Jawa Tengah Moh, Gamal Rindarjono	439
Partisipasi Masyarakat Dalam Menanggulangi Pencemaran Kali Sunter Di Wilayah Kelurahan Rawabadak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara Achmad Adam, Asep Abdul Rahman, Cahyadi Setiawan	454
Kajian Kualitas Air Tanah pada Satuan Lahan Permukiman Di Kabupaten Klaten Alif Noor Anna, Suharjo, Rudiyanto	463
Pengelolaan Hutan (Rimbo Laranagan) Berdasarkan Kearifan Lokal Di Nagari Paru Kecamatan Sijunjung Arie Zella Putra Ulni	470
Air Hujan Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pemenuhan Kebutuhan Air Rumah Tangga Di Kelurahan Rawabadak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara Asep Abdul Rahman, Achmad Adam, Cahyadi Setiawan	476
Analisis Topografi Dasar Laut Di Perairan Kota Mataram Bachtiar Wahyu Mutaqin, Nurul Agustina, Cintya Wahyu Permatasari	485
Strategi Adaptasi Nelayan terhadap Bencana yang Dipicu Perubahan Iklim Studi Kasus Nelayan Tambak Mulyo, Tanjung Mas, Semarang Choirul Amindan Priyono	490
Konservasi Mangrove Sebagai Upaya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Ekosistem Di Wilayah	

Kepesisiran Pulau Jawa Desy Wahyuning Tyas, Esti Rahayu, Ferry Dwi Cahyadi	498
Pemodelan Berbasis Agen/ <i>Agent Based Model</i> (ABM) untuk Pengelolaan Sumberdaya dan Aktivitas Perikanan di Pulau-Pulau Kecil (Kasus Di Sulau Salura Sumba Timur) Dewi Susiloningtyas	508
Perkembangan Pemanfaatan Kawasan Pantai Padang dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Elvi Zuriyani	521
Rehabiltasi Lahan Alang-Alang Sebagai Upaya Meningkatkan Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim (Studi Kasus Nagari Paninggahan, Singkarak Sumatera Barat) Farida, Dasrizal, Paul Burgers	529
<i>Lesson Learnt</i> pengelolaan wilayah Pesisir Di Negara-Negara Berkembang, Kasus: Brazil Dan Filipina Garri Martha Kusuma Wardhana, Charina Vertinia Budiarti, Rendra Ady Wijaya, Rini Meiarti	535
Dinamika Penutup Lahan Kawasan Pesisir Teluk Popoh Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tulungagung I Komang Astina, Purwanto, Yusuf Suharto	541
Kerusakan Pantai dan Model Penanganannya Di Kecamatan Buleleng, Bali I Gede Astra Wesnawa dan Putu Indra Christiawan	545
Penerapan Aksi Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Kampung Kuta Kabupaten Ciamis Jawa Barat Iman Hilman	555
Pengembangan Konsep Pengelolaan Kawasan Multi-Rawan Bencana Erosi-Longsor-Kekeringan Junun Sartohadi, M Anggri Setiawan, Guruh Samodra, Elok Surya Pratiwi	567
Variasi Nitrat Dan Klorida Sebagai Indikator Pencemaran Dan Imbuhan Airtanah Di Sistem Mata Air Ngerong, Karst Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur M. Asyroful Mujib dan Tri Rafika Diyah Indartin	575
Spasial Mangrove Di Muara Angke, DKI Jakarta Mangapul P. Tambunan	586
Interaksi Manusia Terhadap Bentang Lahan Di Daerah Multi Bencana Das Bompon , Magelang , Jawa Tengah Henri Masruroh, Rini Meiarti, Garri Kusuma Wardhana, Edy Trihatmoko, M. Ngainul Malawi, Elok Surya P, Subarno , Junun Sartohadi, Muhammad Anggri Setiawan, Guruh Samodra	590
Studi Pencemaran Air Ci Durian Oleh Limbah Cair Industri Tekstil Menurut Standar Kualitas Air Untuk Pertanian Di Desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten Siti Dahlia, Tricahyono N.H, dan Hartono	598
Inventarisasi Dan Pemetaan Rawan Longsor Dengan Pendekatan Geomorfologi Di Das Beke, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Cut Ayu Tiara Sutari, Sinthiya, Lintang Nur Fadlillah	605
Ancaman Bencana Alam Sebagai Modal Pembangunan Wilayah Yang Efektif (Studi Kasus: Pascaerupsi Gunungapi Bromo 2010 dan Pascaerupsi Gunungapi Kelud 2014) Puspita Indra Wardhan, Junun Sartohadi., Sunarto, Syamsul Bachrl	613

KONSERVASI MANGROVE SEBAGAI UPAYA PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS EKOSISTEM DI WILAYAH KEPESISIRAN PULAU JAWA

Desy Wahyuning Tyas¹, Esti Rahayu², Ferry Dwi Cahyadi³

Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada

Fakultas Teknik Sumberdaya Alam, Institut Teknologi Yogyakarta

Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada

¹desywt@gmail.com, ²estirahayu.er@gmail.com, ³ferrydc2@gmail.com

ABSTRAK

Upaya pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem atau Ecosystem-based Disaster Risk Reduction (EcoDRR) salah satunya melalui konservasi mangrove telah dilakukan disamping dengan pembangunan struktur pantai. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan kegiatan konservasi mangrove sebagai salah satu bentuk EcoDRR yang ada di beberapa wilayah kepepesisiran Pulau Jawa. Wilayah kepepesisiran yang diteliti memiliki kondisi fisik yang berbeda sehingga dapat mewakili karakteristik pesisir di Pulau Jawa secara umum, yaitu Kepulauan Seribu, Indramayu, Tegal, Semarang, Demak, dan Bantul. Inventarisasi mangrove dilakukan dengan observasi lapangan, interpretasi visual citra satelit dan data sekunder. Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam terhadap masyarakat, LSM, dan pemerintah untuk mengetahui sejauh mana EcoDRR dengan konservasi mangrove telah diterapkan, termasuk pemanfaatan dan permasalahannya. Konservasi mangrove di wilayah kepepesisiran Semarang dan Demak memiliki tingkat keberhasilan paling tinggi dibandingkan daerah kajian yang lain. Pemerintah, LSM, serta masyarakat di kedua wilayah tersebut bekerja sama dalam upaya konservasi seperti dengan mengembangkan kawasan tersebut menjadi ekowisata sehingga memberikan keuntungan ekonomi terhadap masyarakat. Ekowisata mangrove juga dikembangkan di Pantai Baros, Bantul. Sementara itu, konservasi mangrove di wilayah kepepesisiran Tegal masih perlu mempertimbangkan kesesuaian lahan lokasi tanam sehingga kerusakan mangrove oleh gelombang dapat diminimalisir. Berbeda dengan wilayah kajian lain yang di pulau besar, konservasi mangrove di pulau kecil seperti Kepulauan Seribu mengalami beberapa kendala utama diantaranya status kepemilikan lahan atau pulau, keterbatasan daya dukung dan sumberdaya. Kegiatan pengurangan risiko bencana di pulau-pulau kecil dilakukan terutama pada pulau-pulau yang relatif besar dan berpenghuni. Sinergi antara pemerintah, LSM, akademisi dan masyarakat diperlukan untuk upaya pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem melalui konservasi mangrove.

Kata Kunci: EcoDRR, konservasi, mangrove, kepepesisiran, Jawa

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Peralihan tersebut menyebabkan banyak sumber daya alam hayati maupun non hayati yang dapat ditemukan di wilayah pesisir. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah menimbulkan banyak kepentingan dan kegiatan pada kawasan ini sehingga bersifat multi sektoral dan multi stakeholder dalam pengelolaannya (Kay dan Alder, 2005). Pengelolaan pesisir sangat diperlukan mengingat banyaknya kota-kota besar di daerah ini yang seringkali pembangunannya tidak atau kurang memperhatikan dampak terhadap lingkungan sehingga menimbulkan bencana.

Bencana di kawasan pesisir dapat disebabkan dari aktivitas manusia seperti pembangunan maupun faktor alam. Kegiatan manusia merupakan faktor utama terjadinya tekanan-tekanan di kawasan pesisir sehingga menimbulkan bencana (Marfai, 2014). Bencana di kawasan pesisir antara lain seperti rob, abrasi, penurunan tanah, intrusi air laut, dan sebagainya. Kejadian bencana tersebut sudah sering terjadi di Indonesia terutama di wilayah kepepesisiran Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau terpadat penduduknya di Indonesia dengan kota-kota besar berada di pesisir seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan sebagainya.

Wilayah kepebisiran Pulau Jawa memiliki karakteristik kondisi fisik dan permasalahan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut mengakibatkan tindakan pengelolaan yang diambil terutama dalam pengurangan risiko bencana akan berbeda pula. Salah satu kegiatan pengurangan risiko bencana yang dilakukan saat ini adalah dengan berbasis ekosistem atau *ecosystem-based disaster risk reduction* (EcoDRR). EcoDRR merupakan kegiatan pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem atau non-struktural (Sudmeier-Rieux dan Estrella, 2013).

Ekosistem merupakan kesatuan komunitas tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas (UU No.1 Tahun 2014). Ekosistem secara sederhana diartikan sebagai hubungan antara komponen biotik (hewan, tumbuhan, organisme lainnya) dan abiotik dalam suatu wilayah sebagai suatu fungsi (Tansley, 1935). Konsep ekosistem biasanya memisahkan manusia dari komponen biotik karena disatu sisi merupakan ekosistem tetapi juga sebagai faktor eksternal yang memiliki pengaruh kuat terhadap suatu ekosistem (Odum, 1959).

Ekosistem memiliki peran penting terhadap pengurangan risiko bencana tetapi masih kurang diperhatikan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana (Furuta, 2014). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekosistem memiliki jasa dalam pengurangan risiko bencana seperti dengan ekosistem mangrove dan terumbu karang untuk pengurangan risiko erosi pantai (Akbar, dkk., 2008; Yulistiyanto, 2009), tsunami (Brown, 2005; Kathiresan dan Rajendran, 2005), badai (Zhang, dkk., 2012) dan sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem di wilayah kepebisiran. Lokasi penelitian secara umum adalah pesisir Pulau Jawa dan pulau-pulau kecil di sekitarnya dengan mengambil studi kasus pada pesisir Kepulauan Seribu, Indramayu, Tegal, Semarang, Demak, dan Bantul. Pesisir Kepulauan Seribu mewakili karakteristik pesisir pada pulau kecil yang berkembang sebagai daerah wisata. Pesisir Indramayu dan Demak memiliki karakteristik fisik yang hampir sama dengan adanya delta. Di samping kesamaan karakteristik fisiknya, pengaruh pengembangan pesisir di sekitarnya membedakan kedua wilayah pesisir ini sehingga bentuk pengelolaannya mengalami perbedaan. Pesisir Tegal mewakili karakteristik fisik tipologi *marine depositional coast* dengan pesisir yang sempit dan material pasiran. Bentuk pengelolaan yang telah diterapkan sangat berbeda dengan yang telah diterapkan pada pesisir lainnya. Pesisir Bantul dengan energi gelombang dan arus yang cenderung lebih besar memiliki kesesuaian bentuk pengelolaan yang berbeda, terlebih untuk konservasi mangrove. Fokus kegiatan pengurangan risiko bencana yang dibahas adalah konservasi mangrove. Konservasi mangrove dipilih karena selain mengurangi risiko bencana juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan penduduk sehingga diharapkan dapat berkelanjutan.

B. METODE

Populasi yang digunakan adalah wilayah kepebisiran Pulau Jawa dan pulau-pulau kecil di sekitarnya dengan mengambil kasus wilayah kepebisiran Kepulauan Seribu, Indramayu, Tegal, Semarang, Demak, dan Bantul. Wilayah kepebisiran tersebut memiliki karakteristik fisik yang berbeda-beda sehingga mewakili populasi. Sampel dari tiap wilayah kepebisiran diambil secara *purposive sampling* berdasarkan adanya kegiatan konservasi mangrove. Sampel lokasi pada masing-masing wilayah kepebisiran antara lain Pantai Baros di Bantul, Gugusan Pulau Pari di Kepulauan Seribu, Pantai Karangsong di Indramayu, Pantai Surodadi-Warureja di Tegal, Pantai Mangunharjo-Tapak di Semarang, dan Pantai Bedono di Demak.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan observasi lapangan. Survey lapangan dilakukan secara bertahap untuk masing-masing lokasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap masyarakat, LSM, dan pemerintah untuk mengetahui sejauh mana EcoDRR dengan konservasi mangrove telah diterapkan, termasuk pemanfaatan dan permasalahannya pada masing-masing lokasi. Observasi lapangan dilakukan untuk memvalidasi hasil wawancara dan sekaligus mengetahui kondisi mangrove pada setiap lokasi. Hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk masing-masing lokasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Bencana di Pesisir Pulau Jawa dan Pulau Kecil di Sekitarnya

Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di Indonesia, Pulau Jawa merupakan daerah yang paling cepat berkembang dengan jumlah penduduk terpadat sebanyak 136.610.590 jiwa pada sensus penduduk 2010 (BPS, 2012). Sebagian besar pesisir Utara Jawa berkembang menjadi perkotaan dengan aksesibilitas yang baik, misalnya Jakarta, Tegal, Semarang, dan Surabaya. Perkembangan pesisir Selatan tidak pesat seperti pesisir Utara karena kondisi topografinya yang cenderung lebih terjal dengan kondisi oseanografi Samudra Hindia yang memiliki energi lebih besar. Pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Jawa berkembang menjadi daerah pariwisata yang menawarkan keindahan terumbu karang dan fauna di ekosistemnya.

Perkembangan yang pesat di pesisir Pulau Jawa dan pulau kecil juga diikuti ancaman bencana yang tinggi. Pesisir Utara Jawa memiliki ancaman erosi pantai, genangan banjir sungai, genangan pasang surut, dan amblesan tanah (Marfai, dkk., 2008; Marfai, dkk., 2011; Marfai, 2011; Mardiatno, dkk., 2012; dan Purnama, dkk., 2012). Pesisir Indramayu, Semarang, dan Demak memiliki ancaman genangan banjir sungai dan genangan pasang surut (Bagli dan Soille, 2003; Sunarto, 2004; Marfai, dkk., 2008; dan Maulina, 2010). Morfologi pesisir utara Pulau Jawa yang sangat landai dengan material lempung hasil sedimentasi sungainya menyebabkan drainase kurang baik. Kondisi ini diperparah dengan kenaikan muka air laut di pesisir utara Pulau Jawa sebesar 5 mm/tahun ([ftp://ftp.avisio.oceanobs.com](http://ftp.avisio.oceanobs.com)) dan erosi pantai. Erosi pantai juga terjadi di pesisir Tegal walaupun tidak terlalu intensif seperti di pesisir Semarang dan Demak (Sartohadi dkk., 2009). Pesisir selatan Pulau Jawa sangat rawan mengalami tsunami. Zona subduksi di Selatan Pulau Jawa masih sangat aktif sehingga sering terjadi gempa di dasar laut yang memicu tsunami (Diposaptono dan Budiman, 2005). Gambar 1 menunjukkan probabilitas kejadian gempa bumi dengan *magnitude* tertentu yang dianalisis berdasarkan sejarah kejadian gempa. Dengan probabilitas kejadian gempa sedang sampai tinggi, pesisir Selatan Jawa sangat rentan terhadap tsunami, terlebih pada pesisir dengan morfologi rendah dan datar termasuk pesisir Baros di Kabupaten Bantul. Pesisir Pantai Baros, juga dikenal sangat rentan terhadap erosi pantai. Hal tersebut dikarenakan pengaruh gelombang pantai Parangtritis dan sekitarnya yang sangat besar.

Gambar 1. Probabilitas kejadian gempa bumi di sepanjang Palung Sunda dengan *magnitude* Mw 8,0 (kiri) dan Mw 9,0 (kanan) (Balinese Working Group for Tsunami Hazard Mapping, 2010)

2. Pengelolaan Bencana di Pesisir Jawa dan Pulau Kecil di Sekitarnya

Tujuan umum pengelolaan pesisir adalah menghindari pembangunan pada wilayah rawan bencana, memastikan sistem alam berfungsi dengan baik, dan melindungi kehidupan termasuk dalam rangka mengelola bencana (Gilbert dan Vellinga, 1990). Kegiatan pengelolaan bencana meliputi perencanaan dan penanggulangan bencana sebelum bencana, ketika terjadi bencana, dan sesudahnya. Pengelolaan bencana bertujuan untuk mengurangi risiko bencana melalui peningkatan kapasitas dan pengurangan kerentanan dan bahaya dalam suatu wilayah baik dalam aspek fisik maupun masyarakatnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan (UNISDR, 2011).

Respon menghadapi bencana dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu memindahkan obyek dari wilayah yang rentan (*retreat*), tetap pada wilayah rentan dengan melakukan adaptasi (*accomodation*), dan melindungi wilayah rentan (*protection*) (Gilbert and Vellinga, 1990). Bentuk respon perlindungan (*protection*) dalam pengelolaan pesisir telah dilakukan di sepanjang pesisir Jawa, baik melalui *hard structure* maupun *soft structure*. Pengelolaan bencana melalui *hard structure* dilakukan dengan

pembangunan struktur pantai, misalnya dengan pemasangan groin, jetty, pemecah gelombang, tanggul, dan lainnya. Hampir seluruh lokasi kajian memiliki dikelola melalui *hard structure*.

Pesisir Indramayu dilindungi oleh tanggul pantai dan tanggul sungai untuk mengurangi risiko genangan pasang air laut. Gambar 2 menunjukkan struktur bangunan *sea wall* dan tanggul sungai di pesisir Indramayu. *Sea wall* setinggi 2 meter untuk melindungi wilayah pemukiman dan tambak dari erosi pantai dan genangan air laut pasang. Sementara tanggul sungai di kawasan kepepesisiran delta Indramayu difungsikan untuk mengurangi risiko genangan air laut pasang.

Gambar 2. Perubahan garis pantai di pesisir Indramayu (a) dengan struktur tanggul sungai (b) dan tanggul pantai (c) untuk mengurangi risiko genangan pasang air laut

Berbeda dengan Indramayu, wilayah kepepesisiran Tegal dilindungi oleh struktur pantai groin (Gambar 3). Serangkaian groin dipasang setiap selang jarak 50 sampai 100 meter dengan panjang masing-masing groin 20-40 meter. Struktur bangunan ini dimaksudkan untuk mengurangi erosi pantai Tegal dengan cara mengumpulkan sedimen sepanjang pantai. Rangkaian groin diaplikasikan pada pesisir yang dimanfaatkan sebagai pemukiman padat di sepanjang jalan nasional pantai utara Jawa Kabupaten Tegal.

Jalan Nasional

Gambar 3. Pemasangan rangkaian groin di pantai Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal untuk melindungi pemukiman yang terletak kurang dari 50 meter dari garis pantai.

Wilayah kepepesisiran Semarang memiliki bentuk pengelolaan *hard structure* yang paling kompleks karena pemanfaatannya sebagai wilayah industri, perdagangan dan jasa, serta pelabuhan (Marfai, 2014). Di samping itu, wilayah ini memiliki ancaman bencana erosi pantai, amblesan tanah, dan genangan air laut pasang paling parah dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya (Marfai, dkk., 2008). Untuk itu, berbagai *hard structure* diaplikasikan di wilayah ini, seperti reklamasi pantai, jetty, pemecah gelombang (Marfai, 2011), kolam retensi di pantai, dan lainnya.

Memiliki permasalahan yang sama dengan Semarang, pengelolaan wilayah kepebisiran Demak dilakukan secara *hard structure* antara lain adalah pemecah dari susunan batu konblok ombak pada beberapa lokasi di perairan dekat pantai untuk mereduksi energi gelombang (Gambar 4). Susunan batu konblok akan menyerap energi gelombang lebih baik dibandingkan dengan struktur beton padat yang cenderung memantulkan energi gelombang. Sedangkan di Kepulauan Seribu, struktur fisik lebih banyak digunakan sebagai bantuan navigasi di pelabuhan. Kegiatan reklamasi dilakukan pada beberapa pulau seperti Pulau Tengah.

Gambar 4. Bangunan pemecah gelombang di perairan dekat pantai Dusun Morosari, Kecamatan Sayung, Demak, tersusun dari batuan konblok.

Berbeda dengan pengelolaan bencana di pesisir utara Jawa yang lebih menekankan pada pembangunan *hard structure*, wilayah kepebisiran pantai selatan, terutama Pantai Baros memiliki bentuk pengelolaan non struktural. Kelurahan Baros ditetapkan sebagai kelurahan tangguh bencana. Penetapan Baros sebagai kawasan tangguh bencana untuk mendorong kemandirian warga terhadap pengurangan risiko bencana alam. Selain itu, penanaman mangrove juga ditujukan untuk mengurangi risiko bencana di Pantai Baros.

Pembangunan berkelanjutan perlu mempertimbangkan kondisi ekosistem yang dikelola agar alam dan kehidupan didalamnya dapat harmonis. Oleh karena itu, mulai diterapkan konsep pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem (Eco-DRR) di berbagai wilayah, termasuk pesisir Jawa. Bentuk perlindungan pantai dengan pemeliharaan mangrove seperti yang diuraikan sebelumnya, termasuk dalam Eco-DRR. Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang banyak terdapat di pesisir Jawa, yang tumbuh secara alami maupun buatan. Ekosistem ini berhubungan langsung dengan faktor alam, misalnya karakter oseanografi, fluvial, dan perubahan iklim, serta faktor manusia, misalnya pemanfaatan lahan dan sanitasi lingkungan. Mengelola ekosistem (sistem alam) dengan baik akan mengurangi ancaman terhadap suatu bahaya dan meningkatkan ketahanan sosio-ekonomi masyarakat (Morawerz dan Nehren, 2005; Sudmeier-Rieux and Ash, 2009).

3. EcoDRR dengan Konservasi Mangrove di Pesisir Jawa dan Pulau Kecil di Sekitarnya

Paradigma penanggulangan bencana saat ini telah bergeser dari penanggulangan bencana berbasis fisik menjadi penanggulangan bencana berbasis ekosistem (lingkungan). Salah satu ekosistem yang memiliki peran sangat baik dalam penanggulangan bencana pesisir adalah ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove berkembang di zona pertemuan antara daratan dan lautan pada wilayah tropis dan subtropis, dengan substrat lempung serta energi gelombang dan arus laut yang kecil (Alongi, 2009). Indonesia merupakan salah satu negara dengan ekosistem mangrove paling luas, di samping Australia, Brazil, dan Nigeria (FAO, 2003). Dalam konteks pengurangan risiko bencana, mangrove berperan sebagai penghalang alami pantai dari energi gelombang dan mengurangi dampak badai, tsunami, dan gelombang ekstrim (Salem dan Mercer, 2012). Di samping itu, ekosistem mangrove dapat mengumpulkan sedimen karena energi gelombang dan arus laut melemah sehingga menjaga kestabilan pantai dan mengendalikan erosi pantai. Namun demikian, kebutuhan akan lahan di pesisir menyebabkan perubahan penggunaan lahan mangrove untuk difungsikan sebagai tambak, pemukiman, perdagangan dan jasa, industri, pelabuhan, dan lainnya. Akibatnya, keseimbangan alam terganggu sehingga ekosistem mangrove tidak dapat berperan dalam pengurangan risiko bencana. Akademisi, pemerintah, dan masyarakat telah melakukan upaya penanaman mangrove di wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan, yaitu ekonomi, edukasi, pariwisata, maupun perlindungan pantai.

Gugusan Pulau Pari termasuk dalam Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Pulau ini terdiri dari beberapa pulau kecil dengan pulau utamanya Pulau Pari, Pulau Burung, Pulau Tikus, Pulau Tengah, dan Pulau Kongs. Pulau-pulau tersebut sudah menjadi kawasan wisata meskipun masih dikelola secara swadaya masyarakat. Dampak negatifnya adalah kurangnya perencanaan dan pengelolaan lingkungan akibat kegiatan pariwisata. Jika dibiarkan terus menerus, proses alam seperti erosi pantai dan intrusi air laut terjadi semakin cepat sehingga menimbulkan bencana.

Kegiatan pengurangan risiko bencana terutama erosi pantai di Gugusan Pulau Pari belum menjadi prioritas utama. Kendala utama pengurangan risiko bencana pada Gugusan Pulau Pari adalah status kepemilikan lahan atau pulau. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan kajian literatur diketahui bahwa Pulau Burung, Pulau Kongs, Pulau Tengah, Pulau Tikus, dan Pulau Pari diklaim dimiliki oleh perusahaan dan individu kecuali sisi selatan Pulau Pari yang dimiliki oleh LIPI. Kantor-kantor pemerintahan Kelurahan Pulau Pari berada di Pulau Lancang yang bukan dalam satu gugusan meskipun dari segi ukuran lebih besar Pulau Pari. Hal ini dimungkinkan juga karena status kepemilikan yang belum jelas. Penduduk lokal di Pulau Pari tidak diperbolehkan menambah atau memperluas bangunannya. Permasalahan ini masih menjadi sengketa hingga sekarang. Klaim dari masing-masing pihak menyebabkan sulitnya koordinasi terkait pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem dengan konservasi mangrove belum terlihat secara jelas di Gugusan Pulau Pari. Hal ini dikarenakan kegiatan konservasi mangrove seperti penanaman mangrove baru dilakukan sebatas paket wisata, lokasi penanaman juga belum ada koordinasi, serta belum ada regulasi untuk konservasi mangrove. Mangrove dapat dijumpai pada semua pulau dengan *Rhizophora stylosa* paling banyak (Gambar 5). LIPI di Pulau Pari bersama masyarakat dan perangkat kelurahan Pulau Pari tahun 2014 sudah membuat peraturan desa tentang zonasi perlindungan biota laut yang didalamnya juga memuat mengenai konservasi mangrove namun belum berkekuatan hukum.

Gambar 5. Formasi Mangrove di Pulau Burung dengan dominasi *R. Sylosa*

Pesisir Indramayu menggunakan mangrove sebagai pembatas tambak (wanamina) serta pemecah gelombang di sempadan pantai maupun sempadan sungai. Berdasarkan interpretasi citra satelit, hutan mangrove di Kabupaten Indramayu ditemukan di kecamatan Kandanghaur, Losarang, Cantigi, Sindang, Indramayu, dan Balongan (Refrial dkk., 2013). Keberhasilan konservasi mangrove pada beberapa lokasi di Indramayu ditunjukkan pada Gambar 6. Tahun 2001, pantai Karangsong, Kecamatan Indramayu mengalami erosi pantai yang menyebabkan kerusakan tambak. Dengan adanya formasi mangrove, tambak terlindung dari arus dan gelombang secara langsung, di samping terjadi sedimentasi seperti yang ditunjukkan pada citra tahun 2014 di Gambar 6. Jenis mangrove yang tumbuh baik di pantai Indramayu adalah *Avicennia* dan *Rhizophora apiculata* (Sukardjo, 1993).

Gambar 6. Reklamasi hutan mangrove di pantai Karangsong, Kecamatan Indramayu, yang dikembangkan sebagai kawasan ecoeduwisata mangrove

Penanaman mangrove di pesisir Kabupaten Tegal dilakukan di sekitar muara sungai dan beberapa pesisir sebagai pembatas tambak (Gambar 7a). Upaya konservasi mangrove dilakukan oleh pemerintah, LSM, maupun kelompok masyarakat. Sayangnya, beberapa upaya penanaman mangrove tidak mengkaji kesesuaian lahannya terlebih dahulu sehingga pada banyak mangrove yang hanya bertahan dalam kurun waktu beberapa tahun bahkan bulan saja. Gambar 7b menunjukkan kerusakan ekosistem mangrove di pantai Surodadi yang tidak mampu bertahan pada lingkungan pantai yang bersubstrat pasir dengan energi arus dan gelombang yang tinggi. Eco-DRR dengan konservasi mangrove Tegal tidak dapat berhasil baik seperti di pesisir kajian lain karena karakteristik ekosistemnya yang berbeda.

Gambar 7. a) Sistem wanamina digunakan dalam pengelolaan tambak di Kabupaten Tegal, b) Ketidaksihesuaian lahan pantai untuk ekosistem mangrove menyebabkan mangrove tidak dapat tumbuh dengan baik

Eco-DRR dengan konservasi mangrove juga dilakukan di wilayah kepebisiran Semarang. Konservasi mangrove yang sudah tampak berhasil berada di pesisir Kecamatan Tugu, yaitu di Desa Mangunharjo dan Tugurejo. Pada mulanya, ekosistem mangrove di pesisir ini merupakan ekosistem alami, namun mulai dikonversi menjadi tambak dan area terbangun sejak akhir 1980an. Akibatnya, luas hutan mangrove berkurang dan tidak lagi berfungsi sebagai pelindung pantai sehingga terjadi kerusakan tambak dan erosi pantai. Sejak tahun 2000an, pemerintah dan masyarakat mulai mengerti arti penting formasi mangrove bagi wilayah mereka. Penyediaan bibit mangrove, pembuatan APO, serta penanaman mangrove dilakukan di pesisir Kecamatan Tugu oleh kelompok masyarakat pesisir, didukung oleh LSM dan pemerintah. Konservasi mangrove di Mangunharjo dan Tapak menjadi bentuk praktek EcoDRR yang berhasil dengan kerjasama berbagai LSM seperti BINTARI, *Friends of The Earth* Jepang, Kesemat, dan lainnya. Saat ini, masyarakat telah mandiri dalam hal pendanaan konservasi mangrove karena selain melakukan konservasi, masyarakat menyediakan bibit mangrove untuk diperdagangkan ke luar daerah. Selain itu, hutan mangrove dikembangkan menjadi kawasan wisata dan edukasi sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Jenis mangrove yang ditanam di pesisir Semarang antara lain adalah *Avicennia*, *Bruguiera*, *Rhizophora*, dan *Sonneratia* (Lianah dkk., 2014). Konservasi mangrove mengembalikan ekosistem alami mangrove di kawasan pesisir Kecamatan Tugu. Ekosistem mangrove menjadi habitat bagi burung air, ular mangrove, biawak, dan lainnya yang mulai ditemukan di ekosistem ini. Karena Kecamatan Tugu sudah dapat mandiri dalam kegiatan konservasi mangrove, saat ini pemerintah Semarang memfokuskan kegiatan konservasi mangrove pada Kecamatan Semarang Timur. Sejak tahun 2011, BLH Kota Semarang yang bertanggung jawab dalam konservasi mangrove, melakukan sosialisasi dan pengadaan bibit mangrove untuk ditanam di sekitar muara sungai dan tambak.

Berdekatan dengan Semarang, pesisir Demak memiliki karakter yang hampir sama dengan Semarang bagian Barat, meskipun pembangunan infrastrukturnya masih terbatas. Pesisir Demak mengalami erosi pantai yang sangat parah sejak awal 1990an yang diperkirakan akibat reklamasi pantai di Semarang (Hartatik dkk., 2014). Erosi pantai telah menyebabkan kerusakan tambak dan

penggenangan permanen pada beberapa desa sehingga desa tersebut direlokasi (Damaywanti, 2013). Konservasi mangrove dilakukan sejak tahun 2000 dengan luas lahan sekitar 2 Hutan menjadi lebih dari 143 Ha pada tahun 2014 (Riasasi dkk, 2014). Formasi mangrove Pantai Bedono mengurangi energi arus dan gelombang laut sehingga sedimen terendapkan di wilayah ini. Lebih lanjut, hutan mangrove difungsikan sebagai kawasan wisata ekosistem dan edukasi. Keberhasilan konservasi mangrove di Pantai Bedono Demak merupakan hasil kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan LSM peduli lingkungan. Beberapa jenis mangrove yang sesuai ditanam di pantai Bedono antara lain adalah *Avicennia*, *Bruguiera*, *Rhizophora*, dan *Nypha* (Riasasi, 2014).

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah mengembangkan ekowisata pesisir yang dikoordinir Lembaga Ekonom Pengembangan Pesisir Mikroi Mitra Mina (LEPP-M3) yang bekerja sama dengan koperasi dan kelompok sadar wisata. Salah satu pantai yang memadai dengan potensi yang dimiliki untuk pengembangan kawasan konservasi mangrove adalah Pantai Baros. Sekitar 5 Ha kawasan mangrove sudah dikembangkan di Pantai Baros sampai saat ini (Gambar 8). Luasan tersebut akan bertambah sekitar 12 hektar (Sidik, 2015). Pemerintah Kabupaten Bantul berencana mengembangkan hutan Mangrove seluas 132 Ha di sepanjang pesisir Kabupaten Bantul (Sidik, 2014). Jenis mangrove yang ditemukan antara lain adalah *Rhizophora*, *Avicennia*, *Bruguiera*, dan *Nypha*. Pada ekosistem mangrove ini juga terdapat sekitar 49 jenis burung, ikan, dan serangga, serta fauna khas mangrove seperti gelodok, uca, *scylla* dan berbagai *mollusca*.

Gambar 8. Hutan Mangrove Pantai Baros

D. KESIMPULAN

EcoDRR yang merupakan kegiatan pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem telah diterapkan di beberapa wilayah kepesisiran di Pulau Jawa. Penerapan EcoDRR yang dapat dikatakan cukup berhasil ditemukan di pesisir Pantai Baros, Pantai Indramayu, dan Pantai Semarang. Sementara itu, penerapan EcoDRR di pesisir gugusan Pulau Pari, pesisir Tegal, dan pesisir Demak masih menemui kendala sehingga belum berjalan dengan optimal. Keberhasilan penerapan EcoDRR terlihat dari koordinasi antar *stakeholder* yang baik serta kondisi hutan mangrove yang baik di wilayah pesisir tersebut.

KEPUSTAKAAN

- Akbar, A. A., Djohan, T. S., dan Sartohadi, J. (2008). *Ekosistem Mangrove dan Abrasi di Pesisir Kalimantan Barat*. *Forum Geografi*, 22(1), 60-71.
- Alongi, 2009, *The Energeetics of Mangrove Forest*, (2009). Springer Science + Business Media B.V. ISBN 978-1-4020-4270-6 e-ISBN 978-1-4020-4270-3
- Bagli, S, dan Soille P., (2003), *Morphological automatic extraction of coastline from pan-European Landsat TM images*, *Proceedings of the fifth Int. Symp. On GIS and Computer Cartography for Coastal Zone Management, GISIG and ICCOPS*, Genova.

- BPS, 2012, *Jumlah Penduduk Indonesia Sensus Penduduk 2010*, diakses dari <http://sp2010.bps.go.id/> pada 1 September 2015.
- Brown, B. E. (2005). *The Fate of Coral Reefs in the Andaman Sea, Eastern Indian Ocean Following the Sumatran Earthquake and Tsunami*, 26 December 2004. *The Geographical Journal*, 171(4), 372-374
- Damaywanti, K., (2013), *Dampak Abrasi Pantai terhadap Lingkungan Sosial (Studi Kasus di Desa Bedono, Sayung Demak*, Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan 2013, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Diposaptono, S dan Budiman, (2005), *Tsunami*, Bogor: Buku Ilmiah Populer.
- FAO, 2003, *Status and trends in mangrove area extent worldwide*. Forest resources assessment working paper 63. Forest Resources Division, Rome. <http://www.fao.org/docrep/007/j1533e/J1533E00.htm>
- Furuta, N. (2014). *Investing in Ecosystem-based Disaster Risk Reduction (Eco-DRR) and Climate Change Adaptation*. Makalah disampaikan pada 4th Asia-Pacific Climate Change Forum. Kuala Lumpur, 1-3 Oktober 2014.
- Hartatik, Ridho, R., dan Wibisono, L., (2014), *Kendal dan Demak pun Kena Imbas*, Diakses dari <http://epaper.suaramerdeka.com/read/2014/12/18/27SM18L14SMT.pdf> pada tanggal 8 Oktober 2015.
- Kathiresan, K., dan Rajendran, N. (2005). *Coastal Mangrove Forests Mitigated Tsunami*. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 65(3), 601-606.
- Kay, P., dan Alder, J. (2005). *Coastal Planning and Management 2nd edition*. London: Taylor and Francis.
- Lianah, Fatah A., dan Poemomo J.B., (2014), *Mitigation of Abrasion Impact to Farmer Pond Community (A Case Study of Mangrove Cultivation in Urban District)*, *The 3rd ICSBE 2014* ISBN 978-602-98397-4-6. 499-506
- Marfai, M. A. (2014). *Banjir Pesisir – Kajian Dinamika Pesisir Semarang*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marfai M.A. and L. King, (2008), *Potential vulnerability implications of coastal inundation due to sea level rise for the coastal zone of Semarang city, Indonesian*. *Environmental Geology*, 54:1235-1245. Diakses dari <http://dx.doi.org/10.1007/s00254-007-0906-4>.
- Marfai M.A., L. King, L.P. Singh, D. Mardiatno, J. Sartohadi, D.S. Hadmoko, and A. Dewi, (2008), *Natural hazards in Central Java-Indonesia: an overview*, *Environmental Geology*, 56: 335-351 <http://dx.doi.org/10.1007/s00254-007-1169-9>
- Marfai M.A., Pratomoatmojo NA, Hidayatullah T, Nirwansyah AW, and Gomareuzzaman M. (2011), *Modeling of Coastal Vulnerability based on Shoreline Change and Coastal Flooding (A Case Study of Pekalongan Coastal Area)*, Yogyakarta: Cahaya Press.
- Marfai M.A., (2011), *The Hazards of Coastal Erosion in Central Java, Indonesia: An Overview*, *GEOGRAFIA Malaysia Journal of Society and Space* 7 (3), Pp. 1-9.
- Mardiatno D., M.A. Marfai, K. Rahmawati, R. Tanjung, R.S. Sianturi, and Y.S. Mutiarni, (2012), *Multirisk Assesment of Coastal and River Floods in Pekalongan Utara*, Yogyakarta: Cahaya Press.
- Maulina N., (2010), *Shoreline Change Analysis and Prediction; An Application of Remote Sensing and GIS*, Tesis, Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Morawerz dan Nehren, 2005, *Rain Forest Management and Ecotourism – Inc H. Gaese, F. Kraas & MI MI Kyi: Sustainability in Rural and Urban Environments*, 59-74 Yangon, Koln.
- Odum, E. P. (1959). *Fundamentals of Ecology 2nd Edition*. Philadelphia: W. B. Saunders Company
- Purnama Ig.L.S., Trijuni S., Hanafi F., Aulia T., and Razali R., (2012), *Water Balance Analysis in Kupang and Sengkarang Watershed*, Yogyakarta: Cahaya Press.
- Refriat, Koswara, dan Hamdani, (2013), *Analisis Perubahan Luasan Hutan Mangrove di Jawa Barat dengan Menggunakan Data Citra Satelit*. Diakses dari <https://parimanta.files.wordpress.com/2013/10/analisis-perubahan-luasan-hutan-mangrove-di-jawa-barat-dengan-menggunakan-data-citra-satelit-rezha-adviana.pdf>
- Riasasi W., Satriagasa M.C., dan Rachman F., (2014), *Potential of New Land As A Result of Community Empowerment on Mangrove Planting in Bedono Coastal Area*, *The 3rd ICSBE 2014* ISBN 978-602-98397-4-6. 526-532

- Salem dan Mercer,(2012), *The Economic Value of Mangrove: A Meta-Analysis*, *Sustainability* 2012, 4, 359-383, doi:10.3390/su4030359, ISSN 207-1050
- Sartohadi J., M.A.Marfaei, D.Mardiatno, (2009), Coastal zone management due to abrasion along the coastal area of Tegal, Central Java Indonesia, *Proceeding International Coastal Conference, Nagoya Japan*, 23-25 February 2009, Pp. 37-44.
- Sidik, Heri. (2015). *Bantul Kembangkan Kawasan Wisata Bakau Pantai Baros*. Diakses dari www.antaranews.com pada tanggal 30 September 2015.
- Sidik, Heri. (2014). *Bantul Tanam 4000 Bibit mangrove Kawasan Pantai*. Diakses dari www.antaranews.com pada tanggal 30 September 2015.
- Sudmeier-Rieux, K., dan Estrella, M. (2013). *The Role of Ecosystem in Disaster Risk Reduction*. NewYork: United Nations University Press.
- Sudmeier-Rieux and Ash, (2009), *Enironmental Guidance Note for Disaster Risk Reduction IUCN Commussion for Ecosystem Management Series No. 8*. Gland, Switzerland: IUCN.
- Sukardjo, (1993), *The Present Status of the Mangrove Forests in the Northern Coast of West Java with Special Reference to the Recent Utilization*, *Southeast Asial Studies*, 31: 141-157.
- Sunarto, (2004), *Geomorphic Changes in Coastal Area Surround Muria Volcano*, *Disertasi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada University.
- Tansley, A. G. (1935). *The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms*. *Ecology*, 16, 284-307.
- UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction, (2011), *Global Assessment Report, Revealing Risk, Redefining Development*. 178pp. Geneva: UNISDR
- Yulistiyanto, B. (2009). *Mangrove dengan Alat Pemecah Ombak (APO) sebagai Perlindungan Garis Pantai*. Prosiding pada Seminar Nasional Manajemen Sumberdaya Air Partisipatif Guna Mengantisipasi Dampak Perubahan Iklim Global. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 8 Agustus 2009.
- Zhang, K., Liu, H., Li, Y., Xu, H., Shen, J., Rhome, J., Smith III, J. E. (2012). *The role of mangroves in attenuating storm surges*. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*,102, 11-23.