AQUABIS

Jurnal Ilmiah Program Studi Budidaya Perairan

Volume 6 Nomor 1 Juni 2017

ISSN: 2301-5705

FAKTOR TEKNIS PENANGKAPAN TERHADAP DAMPAK TEKANAN POPULASI IKAN CAKALANG (<i>Katsuwonus pelamis</i>) DI PERAIRAN LAUT FLORES Asruddin	1
KONSENTRASI LOGAM BERAT TIMBAL (PB) PADA SEDIMEN DAN IKAN NILA (<i>Oreochromis niloticus</i>) DI SUNGAI BIYONGA KABUPATEN GORONTALO Sri Yuningsih Noor	7
ANALISIS KELAYAKAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) TENDA KOTA GORONTALO DITINJAU DARI FASILITAS POKOK, FUNGSIONAL, DAN PENUNJANG Muh. Yasin Umsini Putra Oli'ii dan Noval Saputra Yintili	13
BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR SISTEM POLIKULTUR MENGGUNAKAN JARING TANCAP DI DANAU LIMBOTO Yulianty Adipu	19
PEMANFAATAN KEONG MAS (<i>Pomacea caniculata</i>) SEBAGAI SUMBER BAHAN BAKU PAKAN IKAN Titin Liana Febriyanti	27
FREKUENSI PENCUCIAN YANG BERBEDA TERHADAP KEKUATAN GEL DAN PROTEIN LARUT GARAM SURIMI IKAN MANGGABAI (<i>Glossogobius giuris</i>) Rahyuni Sy. Domili	31
TELAAH KOMPOSISI IKAN KARANG DAN KOMUNITAS KARANG KELURAHAN BUNTA II DAN DESA MINAHAKI KABUPATEN BANGGAI Mohamad Sayuti Djau	35

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO

PEMANFAATAN KEONG MAS (*Pomacea caniculata*) SEBAGAI SUMBER BAHAN BAKU PAKAN IKAN

Titin Liana Febriyanti

Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Ilmu-Ilmu Pertanian,
Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Email: titinlianaf@yahoo.com

Abstract

*Fish growth is influenced by several factors, one of which is feed. To overcome the high price of feed, the cultivators need to find alternative raw materials as a substitute for fish meal. One source of animal protein that can be a substitute for fish meal is mas snail flour (*Pomacea caniculata*). The purpose of this study is to know the benefits of snail pests as a source of raw materials of fish feed, knowing the best formulation for fish feed and to determine which protein content is best in fish feed. The experimental design used was Completely Randomized Design (RAL) consisting of 5 treatments with 3 replications. From the research results can be seen that the best formulation is the C treatment of 50% fish meal and 50% golden snail flour, with the highest protein content of 34.26%.*

Keywords: *Feed, snail mas, formulation, and protein.*

Abstrak

Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pakan. Untuk mengatasi tingginya harga pakan, maka pembudidaya perlu mencari bahan baku alternatif sebagai pengganti tepung ikan. Salah satu sumber protein hewani yang dapat menjadi pengganti tepung ikan adalah tepung keong mas (*Pomacea caniculata*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat hama keong mas sebagai sumber bahan baku pakan ikan, mengetahui formulasi yang terbaik untuk pakan ikan dan untuk mengetahui kandungan protein mana yang terbaik pada pakan ikan. Rancangan percobaan yang digunakan ialah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dengan 3 ulangan. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa formulasi yang terbaik adalah perlakuan C yaitu 50% tepung ikan dan 50% tepung keong mas, dengan kandungan proteinnya yang tertinggi yaitu 34,26%.

Kata kunci: Pakan, keong mas, formulasi, dan protein.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pakan. Untuk dapat tumbuh dengan baik ikan membutuhkan nutrisi yang lengkap. Pemberian pakan harus diperhatikan secara serius karena pakan berperan sebagai sumber nutrisi utama untuk pertumbuhan ikan. Menurut (Craig, 2009) kualitas dan kuantitas nutrisi yang baik merupakan dasar untuk menghasilkan ikan yang sehat dan berkualitas. Untuk itu, dalam pembuatan pakan diperlukan formulasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan nutrisi ikan. Selain kandungan protein, komposisi yang lain pun harus disesuaikan kebutuhan ikan.

Besarnya biaya operasional dalam pembuatan pakan disebabkan oleh tingginya

harga pakan komersial yang menggunakan tepung ikan sebagai bahan baku utama. Untuk mengatasi tingginya harga pakan komersial karena mahalnya tepung ikan, maka pembudidaya perlu mencari bahan baku alternatif sebagai pengganti tepung ikan. Salah satu sumber protein hewani yang dapat menjadi pengganti tepung ikan adalah tepung keong mas (*Pomacea caniculata*). Keong mas merupakan hewan yang masuk dalam kelas Gastropoda, yang biasanya terdapat di sawah yang mengganggu tanaman padi. Karena keong mas memakan batang padi yang biasanya waktu mulai muncul biji padinya.

Adanya permasalahan diatas maka para pembudidaya perlu mencari pakan alternatif dari tepung ikan. Salah satu sumber protein hewani dalam pakan ikan yang dapat menjadi

pengganti tepung keong mas. Pakan buatan dengan bahan baku keong mas ini harapannya mampu menekan biaya produksi karena harganya lebih murah dan hama pada tanaman padi berkurang, serta mampu memberikan pengaruh yang baik bagi pertumbuhan ikan. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat peran tepung keong mas, formulasi mana dari penambahan tepung keong mas, dan protein tertinggi dari penambahan tepung keong mas.

METODE PENELITIAN

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: tepung kedelai, tepung tapioka, tepung jagung, minyak ikan, minyak jagung, dan premix. Sedangkan alat yang digunakan adalah Penggiling, Blander, timbangan, loyang, baskom, spatula, dan alat tulis.

Rancangan Percobaan

Penelitian dilakukan dengan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dengan 3 kali ulangan. Komposisi bahan baku yang akan dijadikan formulasi pakan dapat dilihat pada Tabel 1. Masing-masing perlakuan terdiri dari; 1) Perlakuan A dengan komposisi 100% tepung ikan dan 0% tepung keong mas, 2) Perlakuan B yakni 75% tepung ikan dan 25% tepung keong mas, 3) Perlakuan C terdiri dari 50% tepung ikan dan 50% tepung keong mas, 4) Perlakuan D terdiri dari 25% tepung ikan dan 75% tepung keong mas, 5) Perlakuan E terdiri dari 0% tepung ikan dan 100% tepung keong mas.

Tabel 1. Komposisi bahan baku pakan (gram)

Bahan Pakan	Perlakuan				
	A	B	C	D	E
Tepung ikan	1126	844,5	563	281,5	0
Tepung Keong mas	0	281,5	563	844,5	1126
Tepung kedelai	563	563	563	563	563
Tepung jagung	511	511	511	511	511
Tepung tapioka	100	100	100	100	100
Minyak ikan	75	75	75	75	75
Minyak jagung	75	75	75	75	75
Premix	50	50	50	50	50
Total	2500	2500	2500	2500	2500

Prosedur Penelitian

Pembuatan Tepung Keong Mas (*P. caniculata*)

Keong mas dicuci dan direbus selama 30 menit, kemudian pengambilan daging, setelah itu daging dicuci kembali dan dipotong-potong untuk dijemur. Penjemuran dilakukan 2-3 hari di bawah panas matahari (dalam kondisi cuaca panas), setelah kering dilakukan penggilingan (tepung keong mas). Semua bahan yang sudah dipersiapkan dicampur sesuai komposisi yang telah ditentukan dan kemudian dilakukan pencetakan (pellet). Selanjutnya pakan yang sudah dicetak dijemur sampai pellet kering ($\pm$ 12 jam), kemudian disimpan di tempat yang kering (toples).

Ikan yang sudah dikalimatisasi ditebar dalam wadah penelitian sebanyak 20 ekor per 25 cm air. Sebelum ikan dimasukkan, dilakukan sampling awal pertumbuhan ikan nila gift. Pemeliharaan benih ikan nila gift dilakukan

selama 56 hari dengan pemberian pakan sebanyak 5% dari bobot tubuhnya. Pemberian pakan dilakukan tiga kali sehari yaitu pukul 06.00 WIB, pukul 13.00 WIB dan pada pukul 18.00 WIB. Selama pemeliharaan dilakukan penyiponan setiap pagi hari dan pergantian air sebanyak 20% dari total volume air di akuarium untuk membersihkan sisa pakan dan feses.

Parameter Penelitian

Parameter yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah uji proksimat dari setiap perlakuan. Adapun parameter uji proksimat yang dilakukan adalah:

1) Kadar Protein (AOAC, 1995)

Pengukuran kadar protein dilakukan dengan metode mikro-Kjeldahl. Kadar protein kasar dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Kadar N \%} = \frac{(\text{ml sampel} - \text{ml HCl blanko}) \times \text{NHCl} \times 14,007 \times 100\%}{\text{Berat sampel (mg)}}$$

$$\text{Kadar Protein (\%)} = \% \text{ N} \times 6,25$$

- 2) Kadar Karbohidrat *by difference* (Winarno, 2004)

Pengukuran karbohidrat dilakukan dengan cara *by difference*, yaitu dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Karbohidrat} = 100\% - (\% \text{ air} + \% \text{ protein} + \% \text{ lemak} + \% \text{ abu})$$

- 3) Kadar Lemak (AOAC, 2007)
Kadar lemak dapat dihitung berdasarkan rumus:

$$\% \text{ Kadar Lemak} = \frac{\text{berat lemak (g)}}{\text{berat sampel (g)}} \times 100\%$$

$$\text{Berat Lemak} = (\text{Berat Labu} + \text{Berat sampel}) - \text{Berat Labu}$$

- 4) Kadar Air (AOAC, 2007)
Persentase kadar air (berat basah) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Kadar Air} = \frac{a-b}{c} \times 100\%$$

Keterangan :

a = Berat Awal

b = Berat Akhir

c = Berat Sampel

- 5) Kadar Abu (AOAC, 1995) Kadar abu dapat dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Kadar Abu} = \frac{\text{berat abu (g)}}{\text{berat sampel (g)}} \times 100\%$$

Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil uji proksimat disajikan dalam bentuk histogram, tabel/gambar kemudian diinterpretasikan dalam bentuk analisis diskriptif dan dibandingkan setiap perlakuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini dilakukan uji proksimat di Laboratorium THP Politeknik Negeri Lampung. Hasil uji proksimat dapat dilihat pada Tabel 2. Penelitian dilakukannya analisis uji proksimat dilakukan di Laboratorium THP Lampung. Hasil analisis proksimat diperoleh nilai kandungan nutrisi dengan persentase yang berbeda-beda. Nilai kandungan nutrisi yang dihasilkan berbeda-beda pada setiap perlakuan dikarenakan proporsi dari tepung keong mas dan tepung ikan dalam pakan memiliki persentase yang berbeda.

Formulasi pakan perlu dilakukan untuk menentukan nutrisi yang dibutuhkan dalam pakan. Penyusun utama komponen pakan buatan adalah protein. Protein merupakan senyawa kompleks yang terdiri dari asam-asam amino (NRC 1983). Watanabe (1988) menjelaskan bahwa pertumbuhan ikan sangat erat kaitannya dengan ketersediaan protein dalam makanan, karena protein merupakan zat makanan yang sangat dibutuhkan ikan untuk pertumbuhan. Dengan adanya pemanfaatan protein makanan diharapkan protein tubuh pun akan bertambah sehingga terjadi pertumbuhan yang salah satu menjadi indikatornya ialah pertambahan bobot ikan.

Hasil penelitian dapat dilihat bahwa protein tertinggi terdapat pada perlakuan C yaitu 50% tepung ikan dan 50% tepung keong mas. Kemudian diikuti perlakuan D dan E yang masing-masing (34,26% dan 34,24%), berikutnya perlakuan A (29,5%) dan kadar protein terendah perlakuan B (29,47). Dari hasil proksimat kadar protein untuk perlakuan C dapat diterapkan dalam pembuatan pakan, yaitu tepung ikan dengan tepung keong mas masing-masing 50% dapat memberikan kebutuhan ikan untuk pertumbuhan yang terbaik. Tetapi, untuk perlakuan D dan E, juga dapat diterapkan dalam pembuatan pakan, karena memiliki kandungan protein yang cukup tinggi untuk kebutuhan pertumbuhan ikan.

Tabel 2. Data analisis proksimat tiap perlakuan

Parameter (%)	T. Ikan dan T. keong Mas				
	100%:0%	75%:25%	50%:50%	25%:75%	0%:100%
	Perlakuan A	Perlakuan B	Perlakuan C	Perlakuan D	Perlakuan E
Air	6,92	6,34	6,85	6,61	7,89
Abu	9,76	9,79	10,06	9,32	8,94
Protein	29,5	29,47	35,26	34,26	34,23
Lemak	9,1	11,23	10,86	11,64	12,22
Serat Kasar	1,24	0,67	1,55	1,9	1,96
Karbohidrat	43,45	42,48	35,39	35,61	34,73
Energi (kkal)	428,88	444,75	447,62	450,79	448,93

Berikutnya lemak merupakan sumber utama penghasil energi selain protein (Afrianto dan Liviawaty, 2005). Kandungan lemak pakan mempunyai peran penting bagi ikan tropis karena selain sumber energi juga untuk memelihara bentuk dan fungsi membran atau jaringan dan steroid yang penting bagi organ tubuh tertentu serta untuk mempertahankan daya apung tubuh. Karbohidrat merupakan salah satu komponen sumber energi. Tingkat pemanfaatan karbohidrat oleh ikan umumnya rendah, khususnya pada ikan karnivora, karena pada ikan sumber energi utamanya adalah protein. Ikan karnivora lebih sedikit mengkonsumsi karbohidrat dibandingkan dengan omnivora dan herbivora.

Energi yang terdapat pada perlakuan D adalah yang paling besar yaitu 450,79 kkal. Sedangkan pada perlakuan C adalah 447,62% yang merupakan pertumbuhan terbaik, hal ini menunjukkan bahwa energi yang tinggi tidak menentukan pertumbuhan yang baik. Tetapi energi yang banyak digunakan menentukan pertumbuhan yang baik, sehingga perlakuan C paling baik pertumbuhannya. Berdasarkan analisis harga pakan terlihat bahwa semakin banyak proporsi tepung keong mas, maka biaya pakan yang dikeluarkan semakin menurun, sehingga pada akhirnya akan menurunkan biaya produksi. Menurunnya biaya pakan disebabkan harga tepung keong mas yang relatif murah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian didapatkan bahwa formulasi yang terbaik adalah perlakuan C yaitu 50% tepung ikan dan 50% tepung keong mas, dengan kandungan proteinnya yang tertinggi yaitu 34,26%.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, E dan Liviawaty, E. 2005. *Pakan Ikan*. Kanisius. Yogyakarta. 148 hlm.
- AOAC. 1995. *Official Methods of Analysis of The Association of Analytical Chemists*, Washington D.C.
- AOAC. 2007. *Official Methods of Analysis of AOAC International*. 18th Edition. Gaithersburg: AOAC International.
- Craig, S., L.A.Helfrich. 2009. *Understanding Fish Nutrition, Feed, and Feeding*. Virginia Cooperation extension. Publication 420-256.
- National Research Council (NRC). 1983. *Nutrient Requirement of Warmwater Fishes*. National Academy Press, Washington DC. 71 hlm.
- Watanabe, T. 2001. *Fish Nutrition and Marine Culture*. Departement of Aquatic Bioscience. Tokyo University of Fisheries
- Winarno, F.G. 2004. *Kimia Pangan dan Gizi*. Gamedia Pustaka Utama, Jakarta.