Buku Proseeding

Seminar Nasional Jurusan Biologi
Fmipa Universitas Padjadjaran

*"Biologi Untuk Kesejahteraan
Manusia dan Lingkungan"*

22 Oktober 2013

Buku Prosiding

Seminar Nasional Jurusan Biologi FMIPA Universitas Padjadjaran

“Biologi Untuk Kesejahteraan Manusia dan Lingkungan”

Jurusan Biologi

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

Buku Prosiding

Seminar Nasional Jurusan Biologi FMIPA Universitas
Padjadjaran

“Biologi Untuk Kesejahteraan Manusia dan Lingkungan”

Diterbitkan oleh :

Jurusan Biologi FMIPA UNPAD

Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21

Jatinangor 45363

Telp/fax : 022 7796412

Penyadur : Nurullia Fitriani

Penyunting : Madihah

Desain cover dan Layout: Reski Akbar Mantsuur

ISBN : 978-979-99089-2-6

ISSN : 2355-6048

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak kerja tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka Dies Natalis Universitas Padjadjaran ke 56 dan Jurusan Biologi FMIPA ke 55 serta berkenaan dengan memasuki masa purna bakti Guru besar, staf pengajar yang kami cintai, kami mengadakan seminar Nasional Biologi 2013 dengan tema : **Biologi untuk kesejahteraan manusia dan Lingkungan.**

Dalam kurun waktu 9 tahun Jurusan Biologi FMIPA UNPAD telah mengadakan Seminar Nasional untuk keempat kalinya, urgensi seminar yang diadakan karena biologi merupakan salah satu ilmu yang berperanan penting dan berkembang pesat, berafiliasi dengan ilmu lain sehingga merupakan pilar pendukung dalam berbagai aspek kehidupan.

Merupakan suatu kehormatan bagi kami karena pembicara berasal dari Instansi Pemerintah yaitu dari Departemen Perindustrian yang diwakili oleh Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, dari Departemen Pekerjaan Umum yang diwakili oleh Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan pemukiman Ditjen Cipta Karya. Selain itu Prof. M.A.Noel Holmgren Ph.D, Guru Besar dari School of Life Sciences Universitas Skovde Swedia juga turut memberikan masukannya bagi pengembangan penelitian biologi di Indonesia. Kepada yang terhormat Prof.Dr.Andayaningsih MS, Prof. Dr.Yetty Nurhayati Murad serta Dr. Yayat Ruchiyat terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pembinaan yang diberikan kepada Jurusan Biologi FMIPA selama kurun waktu 30 sampai 44 tahun.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Padjadjaran, Dekan FMIPA dan Ketua Jurusan serta kordinator. Program Studi Biologi FMIPA UNPAD yang telah memberikan bantuan moril maupun materil sehingga terselenggaranya acara ini. Kepada seluruh panitia seminar Nasional Biologi 2013 serta tim prosiding (penyusun dan para penelaah) terima kasih atas kerjasama yang erat sehingga acara ini Alhamdulillah berjalan lancar. Jadza kallah khairan katsiro, Amiiin.

Bandung Oktober 2013

Panitia Semnas bio 2013

**SUSUNAN DEWAN REDAKSI PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOLOGI
UNPAD 2013**

Penanggung Jawab	: Dekan FMIPA UNPAD
Penanggung jawab pelaksana	: Ketua Jurusan Biologi FMIPA UNPAD
Ketua Dewan Redaksi	: Ketua Pelaksana Seminar Nasional Biologi FMIPA UNPAD
Dewan Penalaah	: Prof. Dr. Erri Noviar Megantara Dr. Titin Supriyatun., MS. Dr. Nia Rossiana., MS. Dr. Teguh Husodo., M.Si. Dr. Mia Miranti., MP. Asri Peni Wulandari, M.Sc., Ph.D Dr. Rer. Nat. Tri Dewi K.P, M.Si. Supartini Syarif, Dra. MS. Prihadi Santoso, Drs., MS. Annisa, M.Si., Ph.D.
Editor pelaksana	: Nurullia Fitriani, S.Si., MT. Madihah, M.Si. Melanie, S.Si., M.Si Asep Zainal Mutaqin, S.Si., MT.

KAJIAN LAJU SEDIMENTASI, KUALITAS AIR DAN KEPADATAN MAKROBENTHOS DISUNGAI CIGINTUNG KABUPATEN CILACAP

Usdiyanto¹, Endang Widyastuti², Purwanto Bekt S.³

1.Mahasiswa Magister Sains Ilmu Lingkungan Unsoed

2.Pengajar di Fakultas Biologi Unsoed

3.Pengajar di Fakultas Sains and Teknik Unsoed

Korespondensi : yaziduus@gmail.com

ABSTRAK

Proses sedimentasi dapat menimbulkan pendangkalan dan penurunan kualitas air serta mempengaruhi kepadatan makrobenthos. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju sedimentasi, kualitas air dan kepadatan makrobenthos di Sungai Cigintung Kabupaten Cilacap. Penelitian dilakukan pada bulan Februari – Mei 2013 dengan metode survei dan teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling*. Pengambilan sampel fisika kimia air dan biologi ditentukan pada 5 stasiun, sampel laju sedimen diambil hanya pada bagian muara sungai yaitu stasiun 3, 4 dan 5. Berdasarkan hasil studi, nilai laju sedimentasi di stasiun 3 (8546,24 ton/hari), stasiun 4 (54386,48 ton/hari) dan stasiun 5 (44355,76 ton/hari). Hasil pengujian parameter fisik kimia air yang melebihi baku mutu air kelas II PP/82/2001 adalah TDS yang berkisar antara 24.998 – 36.458 mg/l, BOD berkisar 6 – 14 mg/l dan COD berkisar 192 – 344 mg/l. Komposisi makrobenthos yang ditemukan 9 jenis dari 2 kelas yaitu Gastropoda dan Bivalvia. Kepadatan makrobenthos berkisar antara 192 ind/m² – 368 ind/m² dan indeks keanekaragaman (1,844 - 1,709) $1 < H' < 3$ berarti keanekaragaman makrobenthos kategori sedang.

Kata kunci : Sedimentasi, Kualitas air, Kepadatan makrobenthos, Sungai Cigintung

ABSTRACT

Sedimentation process can lead the silt, degrade the water quality, and affect the density of macrobenthos. The aims of this study are to determine the rate of sedimentation, water quality and macrobenthos density at the Cigintung River Cilacap Regency. The study was conducted in February-May 2013 as a survey and purposive sampling was implemented to collect samples. Sampling of water chemistry, physics and biology were determined in five stations, and sediment rate samples were taken in station 3, 4, and 5 at the estuary of the Cigintung River. The results of the sedimentation rate value each station were in station 3 (8546.24 tons/day), in station 4 (54386.48 tons/day) and in station 5 (4435.76 tons/day). The results of parameters analysis showed that the water chemical physical exceeded the water quality standard of class II PP/82/2001, TDS was 24,998 – 36,458 mg/l, BOD was 6 – 14 mg/l and COD was 192 – 344 mg/l. There were 9 macrobenthos species from 2 classes, Gastropods and Bivalves. Macrobenthos density was 192 ind/m² - 368 ind/m² and diversity index was (1.844 to 1.709) $1 < H' < 3$, it means moderate diversity.

Keywords : River Cigintung, Macrobenthos Density, Water Quality and Sedimentation

PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan akibat penggunaan dan eksploitasi berlebih terhadap lingkungan estuarin oleh manusia menyebabkan wilayah ini sangat kritis. Keterbatasan lapangan kerja dan kendala ketrampilan yang terbatas telah menyebabkan kecilnya pendapatan masyarakat. Kondisi demikian mendorong sebagian masyarakat untuk merambah hutan dan lahan tidak produktif lainnya sebagai lahan pertanian dan perikanan (Ardli and Wolff, 2009). Tingginya potensi sumberdaya dan letaknya yang strategis menyebabkan 70% manusia di seluruh permukaan bumi ini menghuni wilayah pesisir. Pemanfaatan wilayah estuarin oleh manusia diantaranya sebagai penyedia berbagai bahan makanan, sarana transportasi, lokasi pemukiman, industri, agribisnis, pariwisata dan pembuangan limbah (Indarmawan & Manan, 2011).

Muara Sungai Cigintung merupakan lingkungan estuarin dan daerah pertemuan dengan Sungai Donan. Sungai Donan ditetapkan sebagai alur transportasi berskala Internasional, yaitu salah satunya memasok kebutuhan bahan baku semen PT. Holcim Indonesia Tbk. Kegiatan sosial-ekonomi dan budaya yang dilakukan di lingkungan tersebut adalah pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pemukiman dan tegalan/kebun (Kecamatan Cilacap Tengah dalam Angka, 2012). Kegiatan tersebut baik di darat maupun yang ada di sungai akan berdampak pada erosi tanah. Erosi tanah yang meningkat akan mempercepat pendangkalan (sedimentasi), terutama di muara sungai.

Proses sedimentasi meliputi proses erosi, angkutan (load), pengendapan (*deposition*), dan pemadatan (*compaction*) dari sedimen (Asdak, 2010). Proses tersebut berjalan sangat kompleks, dimulai dari jatuhnya hujan menghasilkan energi kinetik yang merupakan permulaan terjadinya proses erosi. Pada saat tanah menjadi partikel halus, kemudian menggelinding bersama aliran menjadi angkutan sedimen. Bentuk, ukuran dan berat partikel tanah akan menentukan jumlah besarnya pengangkutan sedimen. Pengangkutan sedimen merupakan bagian dari proses sedimentasi.

Menurut Fakhruddin dan Yulianti (2010), erosi mengakibatkan tidak hanya tanah yang hilang, tetapi nutrient tanaman, bahan organik, dan partikel tanah yang halus juga akan berkurang dari tanah aslinya. Dalam jangka panjang erosi akan menurunkan produktivitas pertanian dan mengakibatkan sedimentasi dalam sungai, waduk atau danau, dan meningkatkan banjir serta kekeringan. Meningkatnya tingkat pengendapan di muara sungai akan meningkatkan konsentrasi beberapa elemen, khususnya nutrient fosfat dan nitrat juga beberapa *trace metal* (Zn, Ca, Cu, Mg, Fe, dll) yang banyak dihasilkan oleh aktivitas industri, pertanian maupun pertambangan (Welch, 1992). Elemen-elemen tersebut banyak digunakan sebagai bahan aditive pada pemberantasan hama atau pembunuh kompetitor yang ikut terbawa oleh air menuju ke sungai. Elemen-elemen tersebut lama kelamaan akan mengendap bersamaan dengan sedimen dan akhirnya akan melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kondisi demikian ditambah lagi dengan berkurangnya oksigen yang banyak digunakan untuk mendegradasi atau merubah ke bentuk lain melalui proses oksidasi. Kondisi dasar sedimen tersebut apabila mengalami pengadukan oleh arus sungai akan mempengaruhi kualitas air yang ada di atasnya dan akan berdampak pada organisme yang hidup di dalamnya khususnya phytoplankton dan benthos.

Perubahan kualitas air dan karakteristik sungai menyebabkan biota air yang hidup didalamnya teradaptasi mengikuti kondisi lingkungan tempat hidupnya. Secara alami sungai mempunyai zonasi yang mempengaruhi populasi biota yang hidup didalamnya.

Adanya gangguan pada ekosistem sungai akan berdampak terhadap kehidupan biota air seperti perubahan pada struktur komunitas makrobenthos (Zhang, et al., 2010). Perubahan tersebut ditandai dengan penurunan / peningkatan kepadatan, komposisi, keanekaragaman dan kesamaan makrobenthos. Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan dari penelitian ini untuk mengukur laju sedimentasi, menganalisis kualitas air dan kepadatan makrobenthos di Sungai Cigintung Kabupaten Cilacap.

BAHAN DAN METODA PENELITIAN

Penelitian dilakukan di perairan estuarin Sungai Cigintung dan pertemuan dengan Sungai Donan Kabupaten Cilacap (Gambar 1). Penelitian dilakukan pada bulan Februari – Mei 2013 menggunakan metode survei dan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *Purposive Sampling*. Pengambilan sampel kualitas air dan makrobenthos dilakukan pada 5 stasiun. Sampel sedimen (sedimen dasar dan sedimen suspensi) dilakukan hanya pada 3 stasiun yang merupakan muara Sungai Cigintung dan pertemuan dengan Sungai Donan. Pada masing-masing stasiun dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali.

Pengambilan sedimen suspensi dilakukan pada saat pasang tertinggi dan surut terendah. Sampel sedimen suspensi diambil menggunakan *Bottle Sampler*. Sampel sedimen suspensi diambil pada 3 pias dari lebar sungai. Tiap pias diambil tiga sampel sedimen suspensi masing-masing pada kedalaman 0,1, 0,5 dan 0,9. Sedangkan sampel sedimen dasar diambil menggunakan *Sedimen Grabber*.

Pengambilan sampel kualitas air mengacu pada KepMenLH No. 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Sampel Air Permukaan (Tabel 1).

Tabel 1. Parameter Kualitas Air, teknik pengujian dan spesifikasi metode pengujian yang digunakan

No	Parameter	Satuan	Teknik Pengujian	Spesifikasi Metode Pengujian
FISIKA				
1	Temperatur	oC	Termometri	SNI 06-2413-1991
2	Residu tersuspensi (TSS)	mg/l	Gravimetri	SNI 06-1135-1989
3	Residu terlarut (TDS)	mg/l	Gravimetri	SNI 06-1136-1989
KIMIA				
1	Salinitas	‰	Salinometri	-
2	pH	-	Elektrometri	SNI 06-1140-1989
3	Oksigen terlarut (DO)	mg/l	Titrimetri	SNI 06-2424-1991
4	Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	Inkubator pada temperatur 20°C, 5 hari	SNI 06-2503-1991
5	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	Refluks secara tertutup	SNI 06-4139-1996
6	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/l	Spektrofotometri dengan brusin sulfat	SNI 06-2480-1991
7	Fosfat total	mg/l	Spektrofotometri dengan asam askorbat	SNI 06-2483-1991

Pengambilan sampel makrobenthos dilakukan pada saat surut terendah. Sampel diambil dengan *Eckman Grab*, bukaan mulut 25 x 25 cm, selanjutnya disortir serasah dan substrat sedimennya dengan air kemudian disaring dengan menggunakan saringan bertingkat berukuran 250 µm selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diberi larutan formalin 4%. Sampel diidentifikasi dengan menggunakan buku Gosner (1971), Pennak (1978), Oscar dan Galicia (2011).

Data sedimen di analisis dari hubungan antara pencatatan debit dan pencatatan konsentrasi sedimen di lokasi studi. Konsentrasi sedimen diasumsikan merata pada seluruh bagian penampang melintang sungai, sehingga debit sedimen suspensi dihitung dari persamaan (Asdak, 2010):

$$Q_s = Q \times C_s \times K$$

$$Q = A \times V$$

$$A = B \times y$$

$$V = \left[\frac{1}{n} \right] r^{2/3} s^{1/2}$$

$$r = A/P$$

$$P = B + 2y$$

Keterangan :

Q_s = Debit muatan sedimen suspensi (ton/hari) V = Kecepatan arus (m/s)

C_s = Konsentrasi sedimen suspensi (mg/l) P = Keliling basah (m)

Q = Debit aliran (m^3/s)

K = 0,0864

r = Jari jari hidrolis (m)

n = koefisien kekasaran permukaan (0,15)

A = Luas penampang (m^2)

s = Kemiringan lereng (0,001)

B = Lebar sungai

Material dasar (*bed load*) diperkirakan dengan menggunakan tabel “Borland dan Maddock” (1951) dalam Susilo, et al. (2013). Dalam hal ini sedimen dasar (*bed load*) diperkirakan 20% dari besarnya muatan suspensi. Total sedimen dihitung dengan persamaan berikut :

$$S = Q_s + Q_l$$

Keterangan :

Q_s = Debit sedimen suspensi (ton/hari)

Q_l = debit sedimen dasar

S = Total sedimen (ton/hari)

Sedangkan untuk mengetahui kategori konsentrasi sedimen suspensi dan sedimen dasar digunakan standar skala kualitas lingkungan (Fandeli, 2001) yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kategori konsentrasi sedimen suspensi dan sedimen dasar berdasarkan Standar Skala Kualitas Lingkungan

Komponen Lingkungan	Nilai dan Rentangan				
	Sangat jelek	Jelek	Sedang	Baik	Sangat Baik
Konsentrasi sedimen suspensi (mg/l)	> 500	250 - 500	100 - 250	0 - 100	0

Data fisika kimia air dianalisis secara deskriptif komparatif, yaitu data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan baku mutu kualitas air menurut Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001, kelas II. Selanjutnya data makrobenthos yang diperoleh dianalisis kepadatan individu per meter persegi (ind/m^2) (Odum, 1971) dan keanekaragaman dengan software Primer v6 (Clarke and Gorley, 2006). Kategori nilai indeks Shonnon-Wiener menurut Krebs (1989): $H' < 1$ berarti keanekaragaman rendah; $1 < H' < 3$ berarti keanekaragaman sedang dan $H' > 3$ berarti keanekaragaman tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengambilan sampel sedimen suspensi dan sedimen dasar, setelah dianalisis diperoleh nilai sedimen total berturut turut dari yang terbesar yaitu stasiun 4 (54386,48 ton/hari) diikuti stasiun 5 (44355,76 ton/hari) dan stasiun 3 (8546,24 ton/hari). Hasil secara rinci disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil perhitungan nilai total sedimen (S), sedimen suspensi (Qs) dan sedimen dasar (Ql)

Keterangan		C (mg/L)	Q (m ³ /s)	Qs (ton/hari)		Ql (ton/hari)	S (ton/hari)
Stasiun 3	Surut	Pias 1	275	18	427,68	1424	8546,24
		2	334	67	1933,46		
		3	322	15	417,312		
					7121,87		
	Pasang	Pias 1	420	20	725,76		
		2	373	87	2803,77		
		3	471	20	813,888		
Stasiun 4	Surut	Pias 1	303	566	14817,4	9064	54386,48
		2	327	69	1949,44		
		3	349	34	1025,22		
					45322,1		
	Pasang	Pias 1	382	622	20529		
		2	369	134	4272,13		
		3	376	84	2728,86		
Stasiun 5	Surut	Pias 1	348	296	8899,89	7393	44355,76
		2	358	265	8196,77		
		3	390	37	1246,75		
					36963,1		
	Pasang	Pias 1	353	148	4513,88		
		2	380	362	11885,2		
		3	362	71	2220,65		

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai total sedimen di wilayah studi di kategorikan sangat tinggi. Nilai tersebut ($ST\ 4 \pm 20523\ m^3/hari$; $ST\ 5 \pm 16738\ m^3/hari$ $ST\ 3 \pm 3224\ m^3/hari$) lebih kecil jika dibandingkan dengan total sedimentasi di Segara Anakan ($\pm 29041,096\ m^3/hari$) (KKP Prov. Jawa Tengah, 2010). Tingginya laju sedimentasi akan mengakibatkan perairan menjadi dangkal dan sempit sehingga alur transportasi sungai akan terganggu. Faktor yang mempengaruhi tingginya sedimentasi diperkirakan karena alih fungsi lahan dan degradasi lahan di daerah hulu sungai.

Total sedimen ditentukan oleh konsentrasi sedimen suspensi dan sedimen dasar. Berdasarkan standar kualitas lingkungan Kep.Men KLH No 2/1988 dalam Fandeli (2001) konsentrasi sedimen suspensi dikategorikan jelek (250 – 500 mg/l). Besarnya sedimen melayang di wilayah studi dikarenakan masukan material akibat pengikisan tanah dari alih fungsi lahan. Lalu lalang kapal tongkang milik PT. Holcim dalam pengangkutan kapur ikut andil dalam pengadukan sedimen dasar sehingga bergerak menjadi sedimen suspensi. Penggunaan lahan di sekitar sungai untuk budidaya padi (168 Ha), jagung (20 Ha), ketela pohon (8 Ha), ketela rambat (8 Ha), kacang tanah (28 Ha) dan kedelai (61 Ha) (Kecamatan Cilacap Tengah dalam Angka, 2012) yang tidak konservatif ikut dalam menyumbang besarnya sedimen di lokasi studi (Gambar 2.). Adanya perbedaan hasil yang diperoleh dari nilai Qs dan Ql untuk masing masing stasiun, dalam hal ini jumlah sedimen suspensi lebih besar disebabkan karena kebanyakan material yang terangkut merupakan partikel-partikel halus yaitu debu dan pasir. Asdak (2010) mengemukakan

bahwa jenis dan ukuran sedimen menentukan kategori sedimen suspensi atau dasar. Berikut disajikan hasil analisis sedimen dasar pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil analisis sedimen

NO	Jenis sedimen	Stasiun		
		3	4	5
1	Sand (Pasir)	30,9%	31,1%	51,9%
2	Silt/Clay (Lumpur)	69,1%	68,9%	48,1%

Jenis sedimen yang didominasi oleh Silt/Clay dengan persentase berturut turut dari yang paling besar yaitu stasiun 3 (69,1%), stasiun 4 (68,9%) dan stasiun 5 (48,1%) mengindikasikan terjadinya erosi di bagian hulu sungai. Erosi yang terjadi di bagian hulu akan berpengaruh terhadap bagian hilir yang merupakan hasil dari sedimen yang terangkut dan dapat menurunkan kualitas air sungai (Asdak, 2010). Hasil analisis fisika kimia air disajikan pada Tabel 5.

Gambar 1. Peta wilayah studi

Gambar 2. Lahan di sekitar Sungai Cigintung

Tabel 5. Hasil analisis fisika kimia air Sungai Cigintung Kabupaten Cilacap

No	Parameter	Satuan	Stasiun					Baku Mutu Kualitas Air Kelas II (pp 82/2001)
			1	2	3	4	5	
FISIKA								
1	Kedalaman	m	3	3,8	2,8	3,5	2,8	-
2	Kecemapan Arus	m/s	0,78	0,55	0,49	0,42	0,85	-
3	Temperatur	°C	32	32	32	31	32	Deviasi 3
4	Residu tersuspensi (TSS)	mg/l	266	263	275	231	353	1000
5	Residu terlarut (TDS)	mg/l	32133	36458	31979	24998	28397	50
KIMIA								
1	Salinitas	‰	21	21	23	20	22	-
2	pH		6	6	7	6	6	6-9
3	Oksigen terlarut (DO)	mg/l	4,33	4,23	5,03	5,08	3,85	4
4	Kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD)	mg/l	8	6	13	14	11	3
5	Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)	mg/l	304	344	244	284	192	25
6	Fosfat total	mg/l	0,0781	0,0911	0,0824	0,0750	0,1332	0,2
7	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/l	0,7559	0,8786	0,8255	0,8558	1,0357	10

Berdasarkan hasil analisis, parameter yang melebihi baku mutu kualitas air kelas II PP No.82/2001 adalah residu terlarut (TDS), BOD dan COD. Nilai TDS hasil analisis berkisar antara 24.998-36.458 mg/l, BOD berkisar antara 6-14 mg/l, COD berkisar antara 192-344 mg/l. Tingginya nilai TDS dikarenakan kandungan bahan anorganik berupa ion-ion di perairan estuarin. Perairan estuarin umumnya kaya bahan organik, garam – garam

terlarut yang terdiri dari garam karbonat (CO_3^{2-}) dan garam bikarbonat (HCO_3^-) (Wibisono, 2011). Selanjutnya nilai BOD yang tinggi mengindikasikan banyaknya bahan-bahan organik yang masuk ke badan perairan sehingga berpotensi sebagai pencemar. Nilai BOD dan COD di Sungai Cigintung yang melebihi baku mutu air diperkirakan karena masukan bahan organik dan anorganik dari aktifitas pertanian, permukiman penduduk, industri dan akumulasi dari bagian hulu sungai. Lumaela (2013) studi kasus di Kali Greges, Kali Wonorejo dan Kali Kepiting mengenai tingginya nilai BOD dan COD karena wilayah studi berada di dekat permukiman penduduk dan berada di hilir sungai sehingga jumlah senyawa kimia telah terakumulasi. Asdak (2010) mengemukakan bahwa tingginya nilai BOD dan COD mengindikasikan bahwa perairan tersebut mengalami penurunan kualitas. Indikasi penurunan kualitas air akan berdampak pada kehidupan biota perairan. Hasil analisis terhadap kepadatan makrobenthos disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Kepadatan makrobenthos (Ind/m^2) dan keanekaragaman (H') di Sungai Cigintung

No	Nama Spesies	Kepadatan Makrobenthos (Ind/m^2)					Kepadatan Relatif (%)				
		Stasiun					Stasiun				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	<i>Cerithidea cingulata</i>	0	32	64	48	16	0	17	27	13	8
2	<i>Cassidula kraussi</i>	16	16	16	64	16	6	8	7	17	8
3	<i>Littorina melanostoma</i>	48	32	16	16	32	17	17	7	4	15
4	<i>Planaxis sulcatus</i>	16	0	16	32	0	6	0	7	9	0
5	<i>Polymesoda erosa</i>	32	32	0	16	16	11	17	0	4	8
6	<i>Potomidae littoralis</i>	80	0	16	16	48	28	0	7	4	23
7	<i>Pythia plicata</i>	48	48	32	32	0	17	25	13	9	0
8	<i>Telecopium telescopium</i>	0	0	0	16	32	0	0	0	4	15
9	<i>Terebralia palustris</i>	48	32	80	128	48	17	17	33	35	23
Jumlah		288	192	240	368	208	100	100	100	100	100
Jumlah Jenis		7	6	7	9	7					
Indeks Keanekaragaman (H')		1,816	1,748	1,709	1,907	1,844					

Secara keseluruhan kepadatan jenis makrobenthos di sungai cigintung berkisar antara $192 \text{ ind}/\text{m}^2$ – $368 \text{ ind}/\text{m}^2$. Kepadatan yang tinggi karena keadaan lingkungan yang cocok untuk kehidupan makrobenthos. Lingkungan disekitar wilayah studi terdapat hutan mangrove yang sudah rusak, permukiman, pertanian dan industri. Bahan-bahan organik yang terakumulasi di muara sungai merupakan salah satu faktor penunjang kehidupan makrobenthos. Pribadi, *et al.* (2009) mengemukakan bahwa lebih dari 90% jenis biota perairan tropik dalam hal ini makrobenthos, siklus hidupnya berada di sekitar hutan mangrove. Kelompok makrobenthos yang ditemukan di wilayah studi yaitu Bivalvia dan Gastropoda (Gambar 3) dengan karakter bersifat fakultatif. Kelompok ini mampu hidup dalam kisaran toleransi lingkungan yang lebih luas dibandingkan dengan kelompok intoleran. Sudaryanto (2001), kelas Bivalvia dan Gastropoda merupakan kelompok yang fakultatif. Nordhaus, *et al.* (2009) mengemukakan bahwa kepadatan makrobenthos di Segara Anakan didominasi secara berurutan dari kelompok Gastropoda, Crustacea, Polychaeta dan Bivalvia.

Hasil perhitungan indeks keanekaragaman Shanon Wiener ($1,844 - 1,709$) menunjukkan nilai $1 < H' < 3$ yang berarti keanekaragaman sedang dan kestabilan

komunitas makrobenthos sedang. Hal ini menunjukkan kondisi perairan tercemar sedang. Selanjutnya didukung dengan nilai laju sedimentasi tinggi, nilai BOD₅ dan COD yang melebihi baku mutu kelas 2 menurut PP No.82/2001.

Gambar 3. Jenis makrobenthos di Sungai Cigintung

KESIMPULAN

Laju sedimentasi di muara Sungai Cigintung dan pertemuan dengan Sungai Donan tergolong tinggi dengan kisaran 8546,24 ton/hari - 54386,48 ton/hari. Tingginya laju sedimentasi berpengaruh terhadap kualitas air yang di indikasikan dari beberapa parameter yang melebihi baku mutu air menurut PP No. 82 Tahun 2001, yaitu TDS berkisar 24998 mg/l – 36458 mg/l; BOD berkisar 6 mg/l – 14 mg/l; COD berkisar 192 mg/l – 344 mg/l. Dampak lanjutan berupa tingginya kepadatan makrobenthos (192 – 368 Ind/m²) di wilayah studi yang didominasi dari kelompok Gastropoda dan Bivalvia selanjutnya Indeks Keanekaragaman makrobenthos (1,907 – 1,709) yaitu $1 < H' < 3$ berarti kestabilan komunitas dan keanekaragaman makrobenthos sedang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardli, E. R. and M. Wolff, 2009. Land Use and Land Cover Change Affecting Habitat Distribution in The Segara Anakan Lagoon, Java, Indonesia. *Springer Science Reg. Environ Change*, Vol. 9:235-243 DOI 10.1007/s10113-008-0072-6.
- Asdak, S., 2010. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2012. *Kecamatan Cilacap Tengah dalam Angka Tahun 2012*. BPS Cilacap.
- Clarke, K.R. and Gorler, R.N., 2006. *PRIMER v6: User Manual/Tutorial*. PRIMER-E, Plymouth.
- Fakhrudin, M. dan M. Yulianti, 2010. Kajian Erosi Sebagai Dasar Konservasi DAS Cisadane. *Prosiding Seminar Nasional Limnology 5* (570-580).
- Fandeli, C., 2001. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Pemapannya dalam Pembangunan*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Gosner, K.L., 1971. *Guide to Identification of Marine and Estuarine Invertebrates*. Wiley-Interscience, a Division of Wiley & Sons, Inc., New York.
- Indarmawan, T. dan A. Manan, 2011. Pemantauan Lingkungan Estuaria Perancak Berdasarkan Sebaran Makrobenthos. *Jurnal Ilmu Perikanan dan Kelautan, Unair*. 3 (2).
- Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) Provinsi Jawa Tengah, 2010. Upaya Peningkatan Produksi Perikanan di Kawasan Segara Anakan. Rumusan Hasil Rapat Koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Segara Anakan, Cilacap.

- Krebs, C.J., 1989. *Ecology Methodology : The Experimental Analysis of Distribution and Abundance*. Harper and Row Publishers, New York.
- Lumaela, A. K., B. Widjanarko, O. dan Sutikno, 2013. Pemodelan Chemical Oxygen Demand (COD) Sungai di Surabaya dengan Metode *Mixed Geographically Weighted Regression*. *Jurnal Sains dan Seni Pomits*, 2:1 (2337-3520).
- Nordhaus, I., F.A., Hadipudjana, R. Janssen and J. Pamungkas, 2009. Spatio-Temporal Variation of Macrobenthic Communities in The Mangrove-Fringed Segara Anakan Lagoon, Indonesia, Effected by Antropogenic Activities. *Springer, Reg Environ Change*. DOI 10.1007/s10113-009-0097-5.
- Odum, H.T., 1971. *Environment, Power and Society*. Wiley Interscience, New York.
- Oscar, J., D. Galicia and R. Miranda, 2011. *Identification Guide of Freshwater Macroinvertebrates of Spain*. Springer, New York.
- Pennak, R.W., 1978. *Freshwater Invertebrates of The United Stated*. New York: A Willey Interscience Publications Jhon Willey and Sons.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Pribadi, R., R. Hartati dan A. Suryono., 2009. Komposisi Jenis dan Distribusi Gastropoda di Kawasan Hutan Magrove Segara Anakan Cilacap. *Ilmu Kelautan Undip, Semarang*. 14 : 102-111.
- Sudaryanto, A., 2001. Struktur Komunitas Makrozoobenthos dan Kondisi Fisiko Kimiawi Sedimen di Perairan Donan, Cilacap – Jawa Tengah. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 2 (2) : 119-123.
- Susilo, E., A.K., Nugroho dan D. S. Budiningrum, 2013. Alat ukur sedimen berbasis Atmega 8535. *Laporan penelitian, Fakultas Teknik Universitas Semarang*, Semarang.
- Welch, E.B., 1992. *Ecological Effects of Wastewater, Applied Limnology and Pollutant Effects*. Taylor & Francis, London.
- Wibisono, M.S., 2011. *Pengantar Ilmu Kelautan*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Zhang, Y., D. David, C. Dongsheng, T. Wai, F. Lincoln, W. Zaoyin and H. W. L. Joseph, 2010. Impacts of Land Use and Water Quality on Macroinvertebrate Communities in The Pearl River Drainage Basin, China. *Springer Science Hydrobiologia*, 652:71-88. DOI 10.1007/s10750-010-0320-x.