PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOLOGI II 2015

Semarang, 6 Agustus 2015

**Pemanfaatan Sumberdaya Hayati dan
Peningkatan Kualitas Lingkungan**

**MAGISTER BIOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DAFTAR ISI

Susunan Acara Seminar Nasional Biologi	iii
Laporan Ketua Panitia	iv
Sambutan Dekan Fakultas Sains dan Matematika	vi
 Daftar Pemakalah Kunci	 1
1. Dr. Ir. Irdika Mansyur M, For.Sc	6
2. Dr. Tri Retnaningsih S, M.AppSc	
 Daftar Pemakalah Terpilih	 11
Prof. Dr. Endang Gati, M.Si	
 Pemakalah Oral	 17
1. Mochamad Hadi	21
2. Cicilia Novi Primani	27
3. Slamet Ifandi	32
4. Hanif Mayasari	37
5. Haikal Hilman Fahrian	42
6. Tyas Rini Saraswati	48
7. Umarudin	53
8. Farah Diba Setiana	57
9. Sri Utami	62
10. Sukarman	66
11. Janne Hillary	72
12. Frendi Irawan	77
13. Pujiati	81
14. Silvana Tana	85
15. Nalar Mutiara Esa	90
16. Nur Azizah	95
17. Kusaeri	102
18. Udi Tarwotjo	107
19. Mitra Wati	112
20. Nintya Setiari	116
21. Ayu Wulandari	120
21. Enny Yusuf W Y	123
23. Sunarno	130
24. Dian Ratna	136
25. Ghani Ghaffar Garaudy	143
26. Sri Isdadiyanto	147
27. Jumriah Nur	152
28. Fatimah D Purwaningsih	157
29. Rini Verary Shanti	163
30. Munifatul Izzati	168
31. Sapto Purnomo Putro	173
32. Arina Tri Lunggani	177
33. Dyah Ayu K	183
34. Ayu Ambar A	189
35. Sri Wdodo Agung S	195
36. Graha Permana	201
37. Widjanarka	205
38. Heru Setiawan	211
39. Endah Dwi Hastuti	216
40. Ayu Hanitya A	

LAPORAN KETUA PANITIA

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Sains dan Matematika Undip

Para Pembicar Utama:

Prasetyo Budie Yuwono, ME

Ir. SR. Eko Yuniarto, Sp.1 (Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air, Jawa Tengah)

Dr. Ir. Irdika Mansur, M.For.Sc (Kepala SEAMEO BICTROP)

Dr. Tri Retnaningsih S. M.AppSc (Jurusan Biologi Undip)

Yang Kami hormati para Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi di Lingkungan Undip

Segenap Tamu Undangan yang berbahagia, serta

Seluruh hadirin peserta Seminar Nasional Biologi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan ridho-Nya, maka seminar Nasional Biologi Undip 2015 dapat terlaksana.

Para Hadirin, yang kami hormati

Sumber daya alam, termasuk di dalamnya sumber daya alam hayati, merupakan asset bangsa yang tak ternilai harganya. Keberadaan dan pemanfaatannya telah kita rasakan pada berbagai bidang kehidupan. Eksploitasi yang berlebihan dan tidak terkendali menyebabkan berkurang bahkan hilangnya berbagai sumber daya hayati, serta penurunan mutu lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, dan punahnya flora fauna liar, serta rusaknya ekosistem.

Konservasi merupakan solusi untuk mempertahankan sumber daya alam (sumber daya hayati) yang ada. Konservasi SDAH bukan sekedar melestarikan, namun aspek pemanfaatannya tidak bias ditinggalkan. Upaya mempertahankan kualitas lingkungan dilakukan dengan pemantauan lingkungan, dalam bidang biologi kita kenal adanya Biomonitoring (penggunaan organisme untuk pemantauan lingkungan). Terhadap lingkungan/lahan yang sudah mengalami kerusakan/terdegradasi diperlukan upaya untuk mengembalikan lahan terdegradasi menjadi lahan produktif. Diperlukan upaya pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan untuk mempertahankan kualitas lingkungan. Perlu adanya asinergi antara pemerintah dan berbagai komponen bangsa.

Dengan latar belakang tersebut kami menggelar acara Seminar Nasional Biologi Undip 2015 dengan tema "Pemanfaatan Sumber daya hayati dan Peningkatan kualitas Lingkungan". Dalam seminar kali ini disajikan 3 makalah dari pembicara utama, 1 makalah terpilih (kehormatan) 58 makalah pendamping dan 6 makalah poster. Seminar ini dihadiri sekitar 150 peserta dan pemakalah, dari berbagai propinsi terutama Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan. Para peserta dari berbagai latar belakang, peneliti, akademisi, pendidik, serta mahasiswa S1 dan mahasiswa Pascasarjana.

Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih dan Penghargaan kepada Dr. Ir Irdika Mansur M.For.Sc.; Prasetyo Budi Yuwono ME dan Dr. Tri Retnaningsih S. M.AppSc, selaku pembicara kunci, Prof. Dr. Endang Gati, M.Si, sebagai pembicara terpilih; para penyaji makalah pendamping, penyaji poster, para peserta seminar, Dekan dan segenap pimpinan FSM, Dekan, ketua Jurusan Ketua PS di Lingkungan Undip, Ketua Jurusan Biologi Undip, rekan panitia, segenap mahasiswa dan semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Tak lupa kami atas nama panitia mohon maaf masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Selamat mengikuti kegiatan seminar, semoga seminar ini menjadi ajang untuk pertukaran informasi, sumbangan pemikiran untuk pengembangan penelitian biologi, untuk mendukung pemanfaatan sumber daya hayati dan peningkatan kualitas lingkungan.

Sekian terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 6 Agustus 2015
Ketua Panitia

Dr. Jumari, S.Si, M.Si

Pemanfaatan Bahan Alam Lokal Bengkuang (*Pachyrhizus erosus*) dan Alpukat (*Persea americana Mill*) Terhadap Struktur Jaringan Hati Dan Ginjal Tikus Putih

Cicilia Novi Primiani

Pendidikan Biologi FP MIPA IKIP PGRI MADIUN
primiani@ipmipa@yahoo.co.id

ABSTRACT

Bengkuang is a local medicinal plant that grows in Indonesia has not been optimally utilized in the health field. Toxicity testing is needed to determine the safety and effectiveness of natural materials as medicines. Yam tuber (*Pachyrhizus erosus*) and avocado (*Persea americana Mill*) is a local crop that has potential as a drug, but it has not been done to test the toxicity test safety. The research objective was to test the toxicity of yam tubers and avocado on the structure of the liver and kidney tissue of white rats as animals model. Research using experimental approach completely randomized design patterns, female Sprague Dawley rats aged 5 months until 28 days. Animals model used for toxicity tests yam tuber and avocado each using 10 rats, consisting of 5 rats treated natural materials and 5 rats treated synthetic compound daidzein and niacin. Treatment of each 10 rats giving yam tubers and avocado, compared with the administration of synthetic compounds daidzein and niacin. Surgery and liver and kidney organ harvesting performed on day 28, making histology with HE staining. The results showed a white rat liver and kidney by natural ingredients are better than synthetic compound administration.

Keywords: toxicity, natural ingredients, liver, kidneys

ABSTRAK

Keanekaragaman hayati tanaman obat lokal yang tumbuh di Indonesia belum optimal dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Uji toksisitas diperlukan untuk menentukan keamanan dan efektivitas bahan alam sebagai obat. Bengkuang (*Pachyrhizus erosus*) dan alpukat (*Persea americana Mill*) merupakan tanaman lokal yang berpotensi sebagai obat, tetapi belum dilakukan uji toksisitas untuk menguji keamanannya. Tujuan penelitian adalah melakukan pengujian toksisitas umbi bengkuang dan buah alpukat terhadap struktur jaringan hati dan ginjal tikus putih sebagai hewan coba. Penelitian menggunakan pendekatan eksperimen pola Rancangan Acak Lengkap, hewan coba tikus putih betina *Sprague dawley* umur 5 bulan selama 28 hari. Hewan coba yang digunakan untuk uji toksisitas umbi bengkuang dan buah alpukat masing-masing menggunakan 10 ekor tikus putih, terdiri dari 5 ekor diberi perlakuan bahan alam dan 5 ekor diberi perlakuan senyawa sintetis daidzein dan niasin. Pembedahan dan pengambilan organ hati dan ginjal dilakukan pada hari ke-28, pembuatan preparat dengan pewarnaan HE. Hasil penelitian menunjukkan hati dan ginjal tikus putih yang diberi bahan alam lebih baik daripada pemberian senyawa sintetis.

Kata kunci: toksisitas, bahan alam, hati, ginjal

1. PENDAHULUAN

Keanekaragaman hayati yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara merupakan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang memberikan kontribusi dalam berbagai bidang kehidupan. Berbagai spesies tumbuhan yang berada di setiap daerah merupakan spesies berasal dari berbagai negara, atau asli berasal dari daerah-daerah di Indonesia tetapi dapat tumbuh dengan sangat baik di wilayah Nusantara. Tumbuhan obat merupakan salah satu keragaman hayati yang dapat tumbuh di seluruh kepulauan Nusantara. Keragaman tumbuhan sampai sekarang pembudidayaan dan pemanfaatannya dalam bidang kehidupan masih belum optimal. Pemanfaatan tumbuhan obat sebagai potensi kearifan lokal semakin menurun karena perkembangan kefarmasian telah mendominasi dunia kesehatan, hal ini menyebabkan semakin punahnya tumbuhan lokal yang berpotensi sebagai obat.

Masyarakat modern menilai pengobatan dengan tumbuhan obat merupakan pengobatan yang tidak ilmiah dan keamanannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat lebih memilih pengobatan dengan bahan sintetis, dan bukan bahan alam. Bidang kefarmasian menjadi sangat berkembang dengan diproduksi senyawa sintetis yang dianggap mempunyai daya pengobatan ilmiah dan modern. Masyarakat modern lebih memilih pengobatan menggunakan bahan dengan racikan senyawa sintetis daripada menggunakan tumbuhan obat. Pemakaian pengobatan menggunakan bahan-bahan obat modern dianggap lebih ilmiah, mekanisme kerja obat lebih cepat, efektif dan efisien.

Pemakaian terhadap penggunaan tumbuhan obat diperlukan sebuah perubahan konsep. Tumbuhan obat sebagai bahan alam dengan kandungan senyawa multi komponen berbeda dengan obat modern yang terdiri dari satu atau beberapa bahan-bahan sintetis. Zat aktif dan mekanisme kerja obat modern telah diketahui kadarnya dengan jelas. Tumbuhan obat mengandung banyak kandungan kimia dan umumnya tidak diketahui atau tidak dapat dipastikan zat aktif yang berperan dalam menimbulkan efek terapi atau menimbulkan efek samping. Menurut Skalli *et al.* (2007) bahan alam sebagai obat, biasanya terdiri dari satu atau lebih campuran bahan yang diolah bersama-sama, sehingga senyawanya semakin kompleks, demikian juga semakin kompleks farmakokinetik dan farmakodinamiknya (Li *et al.*, 2008) karena ada pola interaksi antar senyawa multi komponen dalam sistem biologi tubuh.

Pachyrhizus erosus (bengkuang) dan *Persea americana* Mill (alpukat) merupakan salah satu bahan alam lokal yang dapat tumbuh dengan sangat baik di Indonesia, tetapi pemanfaatannya di bidang kesehatan masih belum optimal. Masyarakat mengonsumsi bengkuang dan alpukat dalam kondisi segar untuk dibuat sebagai salad, rujak, dan jus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Primiani *et al.* (2013) umbi bengkuang mengandung fitoestrogen daidzein dan genistein yang dapat digunakan untuk terapi hormon estrogen (*Estrogen Replacement Therapy*).

Persea americana Mill (alpukat) merupakan salah satu bahan alam yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol, karena mengandung niasin. Alpukat mengandung beberapa bahan aktif yang diduga dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah, antara lain pantethin, niasin (vitamin B3), beta sitosterol, vitamin C, vitamin E, vitamin A (beta carotene), asam pantothemat, asam oleat, asam folat, selenium, asam amino dan serat (Herna, 2007).

Ginjal dan hati merupakan organ penting dalam pengaturan proses metabolisme. Ginjal berfungsi sebagai organ yang berfungsi (1) membersihkan tubuh dari bahan-bahan sisa hasil pencernaan atau metabolisme, (2) mengontrol volume dan komposisi cairan tubuh, (3) memelihara kestabilan lingkungan sel yang diperlukan untuk berbagai aktivitas. Fungsi hati yaitu: (1) menyimpan vitamin, gula, dan besi untuk membantu memberikan energi, (2) mengontrol produksi kolesterol, (3) membersihkan darah dari limbah metabolisme, obat-obatan dan zat beracun lain, (4) memproduksi faktor pembekuan untuk menghentikan perdarahan, (5) menghasilkan faktor kekebalan tubuh, dan (6) melepaskan substansi empedu untuk membantu mencerna makanan dan menyerap nutrisi (Maramis, 2010). Efektivitas dan keamanan tumbuhan obat dapat digunakan bagi kesehatan memerlukan pengujian toksisitas. Pengujian preklinik dilakukan terhadap hewan coba dengan mengamati perubahan struktur histologi ginjal dan hati. Uji preklinik dilakukan secara *in vitro* dan *in vivo* pada hewan coba (tikus putih atau mencit) untuk melihat toksisitas. Uji toksisitas digunakan untuk melihat keamanannya, dilakukan untuk menganalisis suatu perlakuan terhadap nekrosis hati dan ginjal.

2. METODE PENELITIAN

Pengujian toksisitas sub kronis dilakukan pada hewan coba tikus putih Sprague dawley, dengan perlakuan pemberian umbi bengkuang dan buah alpukat untuk dibandingkan dengan pemberian senyawa sintetis daidzein dan niasin selama 28 hari. Hewan coba yang digunakan untuk uji toksisitas umbi bengkuang dan buah alpukat masing-masing menggunakan 10 ekor tikus putih, terdiri dari 5 ekor diberi perlakuan pemberian bahan alam dan 5 ekor diberi perlakuan pemberian senyawa sintetis. Hari ke-29 hewan coba didislokasi leher, dibedah melalui bagian abdomen/rongga perut, diambil organ hati dan ginjal. Analisis nekrosis jaringan hati dan ginjal dilakukan terhadap preparat jaringan dengan pewarnaan hematoxylin-eosin (HE).

Peralatan yang digunakan: seperangkat kandang pemeliharaan tikus dengan *easy flow* tipe Boxunef, alat sonde (*gavage tube*), labu takar, beker gelas, timbangan digital HM-200, timbangan *triple beam balance* ohaus 700 series, alat suntik/*syringe* 1 ml dengan *disposable needle* ukuran 3 ml (G23), inkubator, mikroskop cahaya, kamera optilab, mikrotom PR-50, peralatan bedah, papan bedah, kaca benda dan kaca penutup, *beaker glass*, lampu spiritus, kubus pencetak, pipet tetes, dan *couple*. Bahan yang digunakan: tikus putih betina Sprague dawley betina umur 5 bulan, umbi bengkuang dan buah alpukat diperoleh dari Kecamatan Takeran Kabupaten Madiun, daidzein 25 mg, niasin 10 mg, jaringan hati, jaringan ginjal, pakan mencit jenis *pelled* susu A, sekam, aquadestilata, parafin, NaCl fisiologis 0,9%, larutan fiksatif PFA, alkohol 50%, 70%, alkohol absolut, xylol murni, campuran xylol-alkohol dengan perbandingan xylol:alkohol masing-masing 1:3, 2:2, dan 3:1, larutan Li_2CO_3 , HCl 1%, PBS, eosin, formalin 3% dan perekat *haupt*.

Analisis data dilakukan secara diskriptif, dengan menganalisis hepatosit dan sel-sel glomerulus ginjal mengalami nekrosis, perubahan struktur selbagian korteks dan medula.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa struktur jaringan hati tikus putih perlakuan pemberian bahan alam/tumbuhan obat (umbi bengkuang dan buah alpukat) dan pemberian senyawa sintetis (daidzein dan niasin) terdapat perbedaan. Pemberian senyawa sintetis menunjukkan sinusoid melebar karena adanya penyumbatan pembuluh darah, hepatosit mengalami piknosis (Gambar 1 dan Gambar 2).

A

B

Gambar 1. Struktur Hepatosit Tikus Putih, Pewarnaan HE, 400x

- A. Nekrosis hepatosit pada perlakuan senyawa sintetis daidzein
B. Hepatosit normal pada perlakuan umbi bengkuang
1= sel normal; 2= sel nekrosis

A

B

Gambar 2. Struktur Hepatosit Tikus Putih, Pewarnaan HE, 400x

- A. Nekrosis hepatosit dengan nukleus piknotik pada perlakuan senyawa sintetis niasin
B. Hepatosit normal pada perlakuan buah alpukat
1= sel normal; 2= sel nekrosis

Struktur jaringan ginjal tikus putih perlakuan pemberian bahan alam (umbi bengkuang dan buah alpukat) dan pemberian senyawa sintetis (daidzein dan niasin) terdapat perbedaan, hepatosit mengalami nekrosis pada perlakuan senyawa sintetis (Gambar 3 dan Gambar 4).

Gambar 3 Struktur Jaringan Glomerulus Tikus Putih, Pewarnaan HE, 400x
A. Nekrosis glomerulus, vaskularisasi pada perlakuan pemberian senyawa sirtetis daidzein
B. Glomerulus normal pada perlakuan pemberian umbi bengkuang
1= sel normal; 2= sel nekrosis

Gambar 4 Struktur Jaringan Glomerulus Tikus Putih, Pewarnaan HE, 400x
A. Nekrosis glomerulus, degenerasi melemak, vaskularisasi pada perlakuan pemberian senyawa sirtetis niasin
B. Glomerulus normal pada perlakuan pemberian buah alpukat
1= sel normal; 2= sel nekrosis

Hati merupakan organ penting di dalam tubuh yang memiliki fungsi detoksifikasi berbagai zat yang dicerna oleh traktus digestivus. Unit fungsional hati adalah lobulus hati yang berbentuk silindris, mengelilingi vena sentralis yang mengalir ke vena hepatika, selanjutnya mengalir ke vena cava. Hati merupakan organ penting dalam proses metabolisme, detoksifikasi, penyimpanan dan ekskresi xenobiotik serta metabolitnya, secara khusus mudah mengalami kerusakan (Brzoka et al., 2003). Penumpukan bahan-bahan toksik dalam parenkim hati dapat menimbulkan kerusakan sel hepatosit akibat terpapar zat tersebut. Perubahan histologi yang bervariasi tergantung dosis, jenis, pengaruh zat atau penyakit lain, kerentanan dan sensitibilitas host (Cramer et al., 2006). Kerusakan hepar karena zat toksik dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis zat kimia yang terlibat, dosis yang diberikan, dan lamanya paparan zat tersebut.

Unit fungsional dasar ginjal adalah nefron, sebagai regulator air dan zat terlarut terutama elektrolit dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul melalui kapiler dan masih diperlukan oleh tubuh. Nefron terdiri dari sebuah komponen disebut korpuskula Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran (tubulus), tiap korpuskula mengandung kapiler darah yang disebut glomerulus. Ginjal termasuk organ yang sangat rentan terhadap efek toksik, obat-obatan, dan bahan kimia. Ginjal termasuk organ yang sangat rentan terhadap efek toksik, obat-obatan, dan bahan kimia. Pemeriksaan nekrosis glomerulus dan tubulus sebagai salah satu bukti kerusakan sel ginjal.

Senyawa kimia yang masuk ke dalam tubuh melalui berbagai cara pemberian pada umumnya mengalami absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Pengikatan sebagai suatu proses

biotransformasi untuk sampai di tempat kerja dan menimbulkan efek. Biotransformasi atau metabolisme obat ialah proses perubahan struktur kimia suatu senyawa kimia yang terjadi di dalam tubuh dan dikatalisis oleh enzim. Suatu senyawa kimia menjadi lebih hidrofilik, hal ini mempercepat ekskresinya melalui ginjal karena metabolit yang kurang larut lemak tidak mudah direabsorpsi dalam tubulus ginjal.

Banyaknya senyawa dalam bahan alam umbi bengkuang dan buah alpukat merupakan komponen yang mampu bekerja secara kompleks. Beberapa penjelasan yang dapat digunakan dalam menjelaskan bahwa bahan alam yang diberikan dalam bentuk kasar (*crude material*) tidak bersifat toksik dibandingkan bahan sintetis/senyawa tunggal hasil isolat. Daidzein dari bahan alam sebagai senyawa mirip 17β estradiol merupakan struktur enantiomer, (2) daidzein yang masuk ke dalam darah secara bersama-sama diikuti dengan senyawa-senyawa mirip daidzein yaitu genistein dan quercetin (fitoestrogen yang terdapat dalam umbi bengkuang), (3) keberadaan daidzein dalam darah tergantung dari bahan yang mirip dengan daidzein.

Daidzein yang terdapat pada umbi bengkuang sebagai suatu senyawa dapat masuk ke dalam darah karena ada fasilitasnya dan bersifat aktif. Berbagai senyawa yang mirip daidzein menjadi kompetitor, diduga adalah senyawa kompetitornya adalah genistein dan quercetin. Alasan lain dikarenakan daidzein mempunyai struktur isomer (enansiomer) *cis*-tetrahydrodaidzein dan *trans*-tetrahydrodaidzein yang mempunyai struktur khiral (Shimada *et al.*, 2010 dan Tsuji *et al.*, 2011), sehingga semakin menambah jumlah senyawa mirip daidzein lebih banyak yang dapat masuk secara aktif ke dalam darah. Adanya senyawa kompetitor maka kadar daidzein dalam darah hewan coba yang diberi umbi bengkuang lebih rendah daripada kadar daidzein darah hewan coba yang diberi senyawa daidzein sintetis.

Alpukat mengandung zat lain yang juga membantu menurunkan kolesterol yaitu beta-sitosterol, dan merupakan salah satu fitosterol pada tumbuhan sepadan dengan kolesterol pada hewan. Karena struktur zat tersebut serupa dengan kolesterol, maka beta-sitosterol bersaing dengan kolesterol untuk menyerap ke dalam tubuh dan menenangkannya. Hasilnya kolesterol dalam aliran darah lebih rendah (Brown, 2011).

Semua bahan alam tumbuhan berkasiat obat terdapat campuran banyak senyawa aktif yang mempunyai aktivitas farmakologi (Ernst dan Izzo, 2001). Adanya kompleksitas senyawa bahan alam menjadikan bahan alam dapat bekerja dalam tubuh dengan prinsip keseimbangan (*balance metabolism*) karena ada senyawa yang meningkatkan dan menurunkan, sehingga tidak toksik bagi tubuh. Berdasarkan analisis tersebut maka bahan alam merupakan material yang bersifat lebih moderat dibandingkan bahan sintetis/isolat.

4. SIMPULAN

Penggunaan bahan alam tidak memberikan efek toksik (merugikan) dalam tubuh dibandingkan bahan sintetis. Jaringan hati dan ginjal merupakan indikator terjadinya kerusakan jaringan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Brzóška, M. M., Moniuszko-Jakoniuk, J., Filet-Marcinkiewicz, B. & Sawicki, B. 2003. Liver and kidney function and histology in rats exposed to cadmium and ethanol. *Alkohol & Alcoholism*. 38(1):2-10
- [2] Cramer, K., Charrois, T.L., Vohra, S. 2006. Valerian practical management of adverse effects and drug interactions. *Canadian Pharmaceutical Journal*. May/Jun. (Cited on 2008 Dec 16); 139(3):39-41.
- [3] Darmansyah I., Wiria, M.S.S. Dasar toksisitas. In: Gunawan, S.G., Setiabudi, R. Nafrialdi.
- [4] Elysabeth.2007. Farmakologi dan terapi. 5th ed Jakarta: Departemen Farmakologi dan Terapeutik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 820-825.
- [5] Ernst, E., and Izzo, A.A. 2001. Interactions between herbal medicines and prescribed drugs. *Drugs*:61(15):2163-2175.
- [6] Hema, D.A. 2007. Pengaruh pemberian Jus *Persea americana* Mill terhadap kadar kolesterol total serum tikus jantan galur wistar hiperlipidemia. (online). (<http://eprints.urdip.ac.id/22383/1/hemma.pdf>), diakses 26 Februari 2014.
- [7] Li, P., Qi, L.W., Liu, E.H., Zhou, J.L., & Wen, X.D. 2008. Analysis of chinese herbal medicines with holistic approaches and integrated evaluation models. *TrAC Trends in Analytical Chemistry*.27(1):66-77.
- [8] Meram's, A.A. 2010. Toksikologi ikan yang dipaparkan secara berulang pada mencit (*Mus musculus*) dan detoksifikasinya menggunakan klorofilin sebagai bahan penyusun buku pendidikan kesehatan. Disertasi tidak diterbitkan. Malang: Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Malang.
- [9] Moslen, M.T. 2001. Toxic responses of the liver. In: Kluassen, C.D. editor. Casarett and Donell's Toxicology the Basic Science of Poisons. 6 th. New York. Mc Graw Hill. 476-478.
- [10] Primiani, C.N., Lestari, U., Amin, M., and Sumitro, S.B. 2013. Comparative study of effects daidzen contained in yam tuber (*Pachyrhizus erosus*) and pure daidzein: The dynamics of chemical compounds and its potential in myometrium. *Journal of Biological Researches*. 18(2):122-124.
- [11] Shimada, Y., Yasuda, S., Takahashi, M., Hayashi, T., Miyazawa, N., Sato, I., Abiru, Y., Uchiyama, S., & Hishigaki, H. 2010. Cloning and expression of a novel NAD(P)H-dependent daidzein reductase, an enzyme involved in the metabolism of daidzein, from equol-producing *Lactococcus* strain 20-92. *Appl. Environ. Microbiol.* 76(17):5892-5901.

- [12] Skalli, S., Zaid A., & Soulaymani, R. 2007. Drug interactions with herbal medicine. *Ther Drug Monit.* 29(5):1-8.
- [13] Tsuji, H., Moriyama, K., Nomoto, K., & Akaza, H. 2011. Identification of an enzyme system for daidzein-to-equol conversion in *Siackia* sp. Strain NATTS. *Applied and Environmental Microbiology*. (Online),78(4):1228-1236, (<http://aem.asm.org>), diakses 13 Oktober 2013.