PROSIDING SEMINAR NASIONAL PEKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DALAM
MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAERAH DAN NASIONAL

Fakultas Pertanian
Universitas Ichsan Gorontalo

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL PEKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
"PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DALAM MENDUKUNG
KETAHANAN PANGAN DAERAH DAN NASIONAL"

GORONTALO, 22-24 MARET 2018

DISELENGGARAKAN OLEH:

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

DIDIKUNG OLEH:

YAYASAN
PENGEMBANGAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Universitas Ichsan Gorontalo

LEMBAGA
PENGABDIAN MASYARAKAT
Universitas Ichsan Gorontalo

LEMBAGA PENELITIAN
Universitas Ichsan Gorontalo

BANK BRI
Melayani Dengan Setulus Hati

DAFTAR ISI

Bidang Penelitian Agribisnis

Implementasi Sistem Agroforestri sebagai Solusi Pertanian Berkelanjutan di Gorontalo
Oleh: Merita Ayu Indrianti dan Ulfasih (Fakultas Ilmu-ilmu Pertanian Universitas Muhammadiyah Gorontalo) (2 – 6)

Kelayakan Usaha Agroindustri Kacang Goyang (Studi Kasus UD Asli Totabuan, Kota Kotamobagu)
Oleh: Indriana (Fakultas Pertanian Universitas Ichsan Gorontalo) (7 – 11)

Identifikasi Manfaat dan Kendala Usahatani Padi Sawah pada Petani Di Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso
Oleh: Marianne Reynelda Mamondol (Fakultas Pertanian Universitas Kristen Tentena Poso) (12 – 20)

Meningkatkan Akses Pangan dan Sumberdaya Manusia Melalui Kelembagaan Petani
Oleh: Putu Arimbawa, dkk. (Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Kendari) (21 – 31)

Program Pengembangan Agroforestri Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pertanian Berkelanjutan
Oleh: Dewa Oka Suparwata (Fakultas Ilmu-ilmu Pertanian, Universitas Muhammadiyah Gorontalo) (32 – 43)

Peningkatan Pendapatan Peternak Sapi dengan Keterpaduan Usaha Tanaman Padi dan Palawija pada Lahan Teratas 0,5 Ha Di Provinsi Sulawesi Selatan- Gorontalo Indonesia
Oleh: Zainal Abidin (Fakultas Pertanian, Universitas Ichsan Gorontalo) (44 – 52)

Peran Sektor Pertanian dalam Penyelenggaraan Kawasan Andalan Palopo dan Sekitarnya
Oleh: Fadhil Surur dan Satriani (Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar) (53 – 62)

Bidang Penelitian Agroteknologi

Rancang Bangun Alat Pengendali Hama Burung Pemakan Bulir Padi Sawah (*Oryza sativa* L.) Sistem Mekanik Elektrik
Oleh: Ardiyanto Saleh Modjo, S.Pd., M.P (Faperta Universitas Negeri Gorontalo) (64 – 70)

Air Tersedia Profil Tanah Untuk Tanaman Padi pada Ustik Endoaquert Paguyaman- Gorontalo
Oleh: Nurdin (Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo) (71 – 81)

Ketahanan Tanaman Okra Hijau (*Abelmoschus esculentus* L.) Varietas Naila IPB Terhadap Cekaman Salinitas dengan Perlakuan NaCl
Oleh: Indriati Husain, dkk. (Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo) (82 – 89)

Efisiensi Penggunaan Radiasi Matahari Akibat Penggunaan Naungan pada Pertumbuhan Stevia (*Stevia rebaudiana* bertonii M.) di Tanah Gambut Kota Palangka Raya
Oleh: Djoko Eko Hadi Susilo (Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya) (90 – 99)

Prospek Pemanfaatan Limbah Pertanian Sebagai Pupuk Organik dalam Mewujudkan Sistem Pertanian Berkelanjutan
Oleh: Nurhin Ilma Bunga, dkk. (Fakultas Pertanian Universitas Kristen Tentena Poso) (100 – 105)

Kajian Efektifitas Penggunaan Pupuk Organik dengan Kombinasi Pupuk Anorganik Terhadap Pertumbuhan Tanaman Jagung
Oleh: Amiruddin (Teknologi Pertanian, Politeknik Gorontalo) (106 – 115)

Pengaruh Berbagai Media Tanam Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Seledri (*Apium graveolens*) dengan Sistem Vertikultur
Oleh: M. Darmawan S.P M.Si (Fakultas Pertanian Universitas Ichsan Gorontalo) (116 – 124)

Bidang Penelitian Teknologi Hasil Pertanian

Optimalisasi Penambahan Lemak Kakao dan Minyak Sawit Terhadap Mutu Tekstur Pasta Cokelat
Oleh: Herman Hatta (Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Gorontalo) (126 – 136)

Karakteristik Mutu Yoghurt Jagung Manis (*Zea mays* L. *Saccharata*) dengan Variasi Konsentrasi Starter yang Berbeda
Oleh: Satria Wati Pade dan Nurhafnita (Teknologi Hasil Pertanian Politeknik Gorontalo) (137 – 146)

Pemanfaatan Tepung Jagung Pulut Substitusi Tepung Terigu dalam Pembuatan Mie Kering
Oleh: Desi Arisanti dan Rosdiani azis (Teknologi Hasil Pertanian, Politeknik Gorontalo) (147 – 156)

Analisis Aktivitas Antikoagulan dari Ikan Sidat Danau Poso Spesies *Anguilla marmorata*
Oleh: Martho Harry Melumpi (Fakultas Pertanian Universitas Kristen Tentena Poso) (157 – 164)

Kajian Kandungan Fenolat dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Ubi Banggai (*Dioscorea*) dari Berbagai Varietas
Oleh: Joice Noviana Pelima (Fakultas Pertanian Universitas Kristen Tentena Poso) (165 – 181)

Karakteristik Organoleptik Makanan Otak-otak dengan Bahan Baku Berbagai Jenis Ikan
Oleh: A. Khairun Mutia (Fakultas Pertanian Universitas Gorontalo) (182 – 188)

**PROSPEK PEMANFAATAN
LIMBAH PERTANIAN SEBAGAI PUPUK ORGANIK DALAM MEWUJUDKAN
SISTEM PERTANIAN BERKELANJUTAN**

**NURFHIN ILMA BUNGA
AMOSSUS ROMPOLEMB ANDI BASO MERINGGI**

Fakultas Pertanian, Universitas Kristen Tentena
Email: nbunga89@gmail.com

ABSTRAK

Sisa tanaman dan kotoran ternak merupakan bahan pupuk organik yang mudah diperoleh dan biaya pengolahan relatif lebih murah. Penggunaan pupuk dapat mengurangi ketergantungan pemakaian pupuk sintetis dan bersifat lebih ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pertumbuhan dan produksi tanaman sawi dengan menggunakan pupuk organik. Parameter yang diamati yaitu jumlah daun dan berat basah tanaman sawi. Dengan perlakuan P0 tanpa perlakuan sebagai kontrol, P1 perlakuan menggunakan kotoran ayam, P2 perlakuan menggunakan abu sekam padi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik berupa kotoran ayam dan abu sekam padi memberikan respon yang berbeda terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman sawi. Jumlah daun untuk perlakuan P0 rata-rata 9 helai per tanaman, P1 jumlah daun rata-rata 12 helai per tanaman, P2 jumlah daun 10 helai per tanaman. Sedangkan untuk produksi tanaman untuk P0 rata-rata 79,6 g per tanaman, P1 154,8 g per tanaman, P2 129,6 g per tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk pertumbuhan dan produksi tanaman sawi. Jumlah daun dan produksi tertinggi terdapat pada perlakuan P1 dengan jumlah daun rata-rata 12 helai per tanaman dan berat rata-rata 129,6 g per tanaman. Dari ketiga perlakuan, penggunaan pupuk organik menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan produksi tanaman sawi.

Kata Kunci: Pupuk Organik, Sawi, Sistem Pertanian Berkelanjutan

Pendahuluan

Dengan semakin berkembangnya ilmu dan teknologi dalam dunia pertanian, dan didukung oleh bertambahnya kebutuhan akan pangan, persaingan dalam pertanian industrial semakin berkembang pesat. Dalam proses produksi para petani lebih cenderung berorientasi untuk memacu produktivitas lahan dengan memberikan input berupa pupuk kimia dan pestisida yang secara terus-menerus yang mengakibatkan merosotnya kualitas lahan, terjadinya pencemaran lingkungan dan membahayakan dari segi kesehatan manusia. Untuk meminimalisir dampak-dampak tersebut maka solusi yang tepat adalah dengan konsep sistem pertanian yang berkelanjutan.

Sistem pertanian berkelanjutan pada dasarnya merupakan sistem pertanian yang dalam pengelolaannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia namun tetap mempertahankan, meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam yang ada. Salah satu model dari sistem pertanian berkelanjutan adalah konsep pertanian

organik. Yang pada hakikatnya dimana bahan organik, baik makhluk hidup maupun yang sudah mati menjadi faktor penting dalam proses produksi usaha tani. Penggunaan bahan organik menjadi pupuk dapat dijadikan jaminan untuk keamanan produk pertanian, baik dari segi kesehatan manusia ataupun bagi lingkungan. Bahan organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik yaitu sisa tanaman dan kotoran ternak.

Sisa tanaman dan kotoran ternak merupakan bahan pupuk organik yang mudah didapat dan pengolahannya relatif murah. Penggunaan pupuk organik dapat mengurangi ketergantungan penggunaan pupuk sintetis dan bersifat lebih ramah lingkungan. Pupuk organik memiliki beberapa kelebihan antara lain a) Berfungsi sebagai granulator sehingga dapat memperbaiki struktur tanah, b) Daya serap tanah terhadap air dapat meningkat dengan pemberian pupuk organik karena dapat mengikat air lebih banyak dan lebih lama, c) Pupuk organik dapat meningkatkan kondisi kehidupan di dalam tanah, d) Unsur hara di dalam pupuk organik merupakan sumber makanan bagi tanaman, e) Pupuk organik merupakan sumber unsur hara N, P, dan S (Prihantoro, 2004).

Kotoran ternak dan abu sekam padi merupakan limbah pertanian yang keberadaannya cukup melimpah di Indonesia dan belum dimanfaatkan dengan baik. Khususnya di wilayah Kabupaten Poso ketersediaan kotoran ternak berupa kotoran ayam dan abu sekam padi cukup melimpah dan belum dimanfaatkan dengan baik. Kotoran ayam yang berasal dari ternak masyarakat pada umumnya hanya dibiarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan. Begitu pula dengan sekam padi yang dihasilkan dari proses penggilingan padi. Sekam padi yang melimpah di buang dan dibakar sehingga menjadi abu. Secara tradisional abu sekam padi ini digunakan masyarakat untuk bahan mencuci alat dapur dan hanya digunakan dalam skala kecil yaitu sebagai bahan campuran tanah untuk menanam sayuran di pekarangan rumah.

Pupuk organik memiliki kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk organik memiliki kandungan unsur hara yang berbeda-beda. Kandungan unsur hara yang terdapat pada kotoran ayam yaitu N 1,5%, P 0,80%, K 0,40% dan kadar air 55% , bahan organik 29% (Lingga, 1991). Raihan (2000), menyatakan bahwa penggunaan bahan organik kotoran ayam mempunyai beberapa keuntungan antara lain sebagai pemasok hara tanah dan meningkatkan retensi air. Sedangkan abu sekam padi yang merupakan bahan organik yang berasal dari limbah pertanian mengandung beberapa unsur penting seperti protein kasar, lemak, serat kasar, karbon, hydrogen dan silika (Wardi, 1998). Kandungan kimia dari abu sekam bakar yaitu SiO_2 dengan kadar 52% dan C sebanyak 31%. Sementara kandungan

lainnya terdiri dari Fe_2O_3 , K_2O , MgO , CaO , MnO , dan Cu dengan jumlah yang kecil serta beberapa bahan organik lainnya (Wuryan, 2008 dalam Gustia, 2013).

Tanaman sawi (*Brassica juncea* L.) yang merupakan tanaman indikator dalam penelitian ini, merupakan sayuran yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Sayur sawi sendiri memiliki kandungan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sayur sawi memiliki kandungan vitamin antara lain vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan mineral Fe (Rukmana, 1994). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pertumbuhan dan produksi tanaman sawi dengan menggunakan pupuk organik berupa kotoran ayam dan abu sekam padi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pemanfaatan limbah pertanian sebagai pupuk organik dalam mewujudkan sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan dan baik bagi kesehatan tubuh manusia.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Pertanian Universitas Kristen Tentena yang dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2017. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekop, cangkul, ember, gayung, wadah persemaian, polybag ukuran 20 cm X 30 cm, meteran, penggaris, alat tulis menulis dan alat dokumentasi. Bahan yang digunakan yaitu tanah dan abu sekam padi dan kotoran ayam. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 3 perlakuan yang diulang sebanyak 5 kali. Perlakuan terdiri dari: P0 = tanah (sebagai kontrol), P1 = tanah dan kotoran ayam dengan perbandingan 1:1, P2 = tanah dan abu sekam padi dengan perbandingan 1:1. Masing-masing perlakuan terdiri dari lima ulangan. Kegiatan penelitian meliputi persiapan media tanam, persemaian, penanaman, pemeliharaan, dan panen.

Parameter yang diamati yaitu jumlah daun (helai) dan berat basah tanaman. Parameter jumlah daun dilakukan dengan menghitung jumlah daun yang telah terbentuk sempurna dan berat basah tanaman sawi, yaitu dilakukan dengan menimbang seluruh bagian tanaman saat panen. Pengambilan data dilakukan pada 15 hari setelah tanam (HST), dan pada saat panen. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis varians satu jalan untuk melihat adanya pengaruh nyata dari perlakuan-perlakuan yang diberikan terhadap komponen pengamatan.

Hasil dan Pembahasan

Jumlah Daun dan Berat Basah

Berdasarkan hasil penelitian secara umum perlakuan P1 yaitu penggunaan pupuk dengan kotoran ayam memberikan pengaruh lebih baik kemudian diikuti dengan

penggunaan pupuk abu sekam padi. Dengan rata-rata jumlah daun untuk perlakuan P1 yaitu 12 helai, kemudian diikuti perlakuan P2 yaitu 10 helai dan P0 9 helai per tanaman. Sedangkan untuk parameter berat basah tanaman respon terbaik diberikan oleh perlakuan P1 dengan berat basah rata-rata tanaman sawi setelah panen yaitu P1 154,8 g per tanaman, kemudian diikuti oleh P2 129,6 g per tanaman, dan P0 rata-rata 79,6 g per tanaman. Hal ini terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Rata-Rata Jumlah Daun dan Berat Basah Tanaman Sawi

Perlakuan	Jumlah Daun (Helai)	Berat Basah (g)
P0	9 ^a	79,6 ^a
P1	12 ^b	154,8 ^b
P2	10 ^c	129,6 ^c

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada $\alpha = 0,05$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dengan menggunakan bahan organik cenderung lebih baik jika dibandingkan dengan perlakuan tanpa menggunakan bahan organik. Kemampuan bahan organik dalam menyediakan nutrisi yang lebih baik untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman sawi. Foth (1998), menyatakan bahwa tanah-tanah permukaan yang banyak mengandung bahan-bahan organik dengan tekstur halus mempunyai ruang pori total lebih banyak dan proporsinya relatif besar yang disusun oleh pori-pori kecil.

Gambar 1. Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Terhadap Jumlah Daun

Hasil analisis varians satu jalan terhadap variabel jumlah daun menunjukkan bahwa perlakuan dengan bahan organik yang berbeda berpengaruh terhadap jumlah daun tanaman sawi. Hasil uji lanjut dengan uji LSD terhadap rata-rata jumlah daun sebagai hasil dari perlakuan pemberian pupuk organik yang berbeda dapat dilihat pada table 1. Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa perlakuan P1 dan P2 yaitu dengan menggunakan pupuk organik memberikan rata-rata jumlah daun yang berbeda dibandingkan dengan P0 perlakuan tanpa

pupuk organik. Perlakuan P1 dengan menggunakan kotoran ayam memberikan hasil jumlah daun yang lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan P2. Hal ini disebabkan karena pupuk organik dapat memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kandungan air tanah. Pupuk organik berupa kotoran ayam memiliki aktivitas mikroba tanah yang bermanfaat bagi tanaman akan meningkat dengan penambahan pupuk organik. Aktivitas mikroba ini akan membantu tanaman dalam menyerap unsur hara dari tanah dan menghasilkan senyawa yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman. Bahan organik dari kompos kotoran ayam merupakan makanan bagi mikroorganisme tanah yang sebagian terdapat mikroorganisme pengikat N. Hal ini sejalan dengan Hanafiah (2005), bahwa nitrogen dapat berasal dari bahan organik dan udara yang difiksasi oleh mikroorganisme tanah tertentu.

Tanaman membutuhkan nutrisi untuk tumbuh, berkembang, dan berproduksi. Komposisi pupuk yang diberikan melalui dua perlakuan memberikan kandungan nutrisi dan memiliki respon yang berbeda untuk tiap perlakuan. Nutrisi yang ada dalam tanah diserap melalui organ akar tanaman dan nutrisi dari udara diserap melalui daun. Apabila tanaman kekurangan nutrisi maka akan mengakibatkan malnutrisi atau bahkan kematian. Perlakuan P0 = tanah tanpa penambahan pupuk organik mengalami hambatan dalam proses pembentukan tanaman, yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya unsur hara terutama N yang berperan dalam pertumbuhan vegetatif tanaman.

Berat basah tanaman untuk tanaman sawi berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan P1 memiliki berat rata-rata tertinggi yaitu 154,8 g per tanaman. Kemudian diikuti oleh perlakuan P2 dan P0. Seperti yang terlihat pada tabel 1. Hasil analisis variansi satu jalan menunjukkan bahwa perlakuan dengan bahan organik yang berbeda berpengaruh terhadap berat basah tanaman sawi. Hasil uji lanjut dengan uji LSD terhadap rata-rata berat basah sebagai hasil dari perlakuan pemberian pupuk organik yang berbeda, dapat dilihat pada tabel. 1. Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa perlakuan P1 dan P2 yaitu dengan menggunakan pupuk organik memberikan rata-rata berat basah tanaman sawi yang berbeda dibandingkan dengan P0 perlakuan tanpa pupuk organik.

Pada percobaan ini, perlakuan dengan menggunakan tambahan pupuk organik kotoran ayam memiliki berat rata-rata tertinggi. Hal ini disebabkan karena kotoran ayam memiliki kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman lebih banyak jika dibandingkan dengan kandungan unsur hara yang dimiliki oleh abu sekam padi. Banyaknya serapan hara yang terdapat pada daun, berhubungan dengan berat basah tanaman sawi. Hasil penelitian Ramadhan, (2012) menunjukkan hasil analisis hara abu sekam padi yaitu C 2,15%, N

0,25%, C/N 8,6% sedangkan kotoran ayam mengandung C 8,22%, N 1,37% dan C/N 6%. Tanaman yang terpenuhi kebutuhan unsur haranya, akan dapat merangsang pertumbuhan daun baru.

Gambar 2. Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Terhadap Berat Basah Tanaman Sawi

Kesimpulan

1. Perlakuan dengan menggunakan pupuk organik berpengaruh nyata terhadap variabel jumlah daun dan berat basah tanaman sawi.
2. Perlakuan dengan menggunakan pupuk organik kotoran ayam memberikan rata-rata tertinggi pada jumlah daun (12 helai per tanaman) dan berat basah tanaman sawi (154,8 g per tanaman).

Daftar Pustaka

- Foth, H.D. 1998. *Dasar - Dasar Ilmu Tanah*. Universitas Gajah Mada Press. Yogyakarta.
- Gustia, H. 2013. Pengaruh Penambahan Sekam Bakar pada Media Tanam Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Sawi. *E-Journal WIDYA Kesehatan Dan Lingkungan* 1 (1): 12-17
- Hanafiah KA. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Tanah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lingga, P. 1991. *Petunjuk Penggunaan Pupuk*. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Prihmatoro, Heru. 2004. *Memupuk Tanaman Buah*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Ramadhan, C.B. 2012. Pengaruh Kombinasi Media Tanam dengan Fertigasi Pupuk organik terhadap pertumbuhan bibit tanaman kepel (*stelechocarpus burahol* (bl.) Hook. F. & th.). *Skripsi*. Fakultas Pertanian Institut Pertanian, Bogor.
- Rukmana, Rahmat. 1994. *Bayam, Bertanam & Pengelolaha Pascapanen*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wardi H., Sudarmodjo, D. Pitoyo. 1998. *Teknologi Hidroponik Media Arang Sekam untuk Budidaya Hortikultura*. J. Litr.