***Amorphophalus titanum* Bunga Endemik Sumatra**

Istiqomah Widyawati, Umroh Fudolla, Wahyu Mustika Fitri

Mahasiswa Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret

Abstract

Amorphophalus titanum is a Sumatran endemic plant and is one of Indonesia's rare plants. The purpose of this article to discuss the potential, extinction status, distribution and characteristics or morphology of *Amorphophalus titanum*. The roots in *Amorphophallus titanum* consist of tubers. The stem owned by *Amorphophallus titanum* is a pseudo stem composed of addicted leaf midribs. Leaf blade with a diameter of about 7 m, leaf elliptical pine leaf, 40 cm long, tapered tip, if touched like a skin, the upper surface is green, rather shiny. Inflorescence on the corpse flower is a collection of small male and female flowers. The place where flowers are attached to is at the base of the cob. Spadiks is yellow and is arrounded by a reddish-purple flower sheath. *Amorphophallus titanum* used as an ornamental plant because of its unique shape and is able to attract the attention of many visitors.

Key words: Amorphophalus titanum, potensial, extinction status, distribution, morphology

Pendahuluan

Marga *Amorpohphalus* memiliki kurang lebih 200 jenis yang tersebar di Afrika Barat sampai ke Asia tropis dan Australia bagian utara. Di Indonesia terdapat 25 jenis dari jumlah keseluruhan jenis yang ada di dunia. Dari 25 jenis yang ada Indonesia, terdapat jenis-jenis yang endemik, salah satunya adalah *Amorphophalus titanum*. *Amorphophalus titanum* merupakan tumbuhan endemik Sumatra dan termasuk tumbuhan langka Indonesia. Tumbuhan ini tergolong tumbuhan langka karena bunga jantan dan bunga betina pada *Amorphophalus titanum* tidak masak secara bersamaan sehingga menyebabkan kesempatan untuk melakukan penyerbukan sangat kecil. *Amorphophalus titanum* dikenal dengan nama bunga bangkai karena pada saat bunga betina mekar, mengeluarkan bau bangkai. Selain

dijuluki dengan nama bunga bankai, *Amorphophallus titanum* juga dijuluki bunga raksasa karena spadiks pada *Amorphophallus titanum* dapat tumbuh sampai 3 meter. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk membahas potensi, status kepunahan, persebaran serta karakteristik atau morfologi dari *Amorphophallus titanum*.

Amorphophallus titanum merupakan tanaman dari suku Alismatales dan keluarga Araceae (talas-talasan) karena dalam perbungaannya memiliki spadix dan spathe serta akarnya yang berupa umbi (Yumazimmi, dkk., 2015). Ciri lain dari famili Araceae adalah tanaman berupa herba, batang berbentuk rimpang basah dan pendek, daunnya lanset, pangkal daun memeluk batang, berbunga majemuk bentuk bongkol yang ujungnya meruncing, buahnya bulat dengan warna yang bervariasi (Adi, 2008). *Amorphophallus titanum* secara alami tersebar di hutan Sumatera sebagai tumbuhan bawah kanopi pada tanah berkapur, namun tumbuhan ini ditemukan pula di tempat-tempat terbuka, hutan sekunder, pinggir jalan dan sungai, atau di tepi hutan.

Pembahasan

Amorphophallus titanum merupakan salah satu tumbuhan langka yang ada di Indonesia. *Amorphophallus titanum* di kategorikan ke dalam status kelangkaan 'vulnerable' oleh IUCN dan WCMC, dan di tahun 2002 dikeluarkan dari IUCN dan WCMC. Hal ini dikarenakan belum ada data komprehensif yang menjelaskan tentang populasi dan keberadaannya di alam sampai sekarang. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, telah memasukkan *Amorphophallus titanum* ke dalam jenis tumbuhan yang dilindungi, terdapat dalam lampiran jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi (Tumbuhan – I. Palmae – No. 238. *Amorphophallus titanum*). Pada Peraturan Pemerintah ini *Amorphophallus titanum* dimasukkan dalam keluarga palem-paleman (Yuzamni dan Hetterscheid, 2014).

Masalah kelangkaan jenis ini di picu oleh berbagai faktor antara lain maraknya *illegal logging*, perambahan hutan untuk dijadikan perladangan, perdagangan liar burung rangkong (sebagai hewan pendistribusi biji *Amorphophallus titanum*). Faktor lainnya waktu yang dibutuhkan untuk beregenerasi juga menjadi penyebab kelangkaan tumbuhan ini. Berkembangnya

mitos atau kepercayaan masyarakat setempat bahwa *Amorphophalus titanum* merupakan tumbuhan pemakan manusia perlu segera diluruskan. Mitos menyesatkan tersebut berdampak kepada pemusnahan *Amorphophalus titanum* apabila tumbuh di ladang-ladang penduduk (Yuzammi, dkk., 2015).

No	Ancaman	Tingkat Ancaman	Dampak Utama	Kemungkinan Pengelolaan
1.	Perubahan lahan (<i>land use</i>)	tinggi	Degradasi dan kerusakan sumberdaya yang dapat mengancam kepunahan jenis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penegakan hukum
2.	Kebakaran hutan	tinggi	Degradasi habitat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Patroli pengamanan hutan ▪ Pendidikan lingkungan
3.	Pembabatan bunga bangkai yang tumbuh di lahan penduduk	tinggi	Kepunahan jenis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi kepada masyarakat ▪ Penyediaan alternatif ekonomi ▪ Penegakan hukum
4.	Perburuan burung rangkong	tinggi	Degradasi distribusi populasi bunga bangkai yang apabila dibiarkan dapat mengancam kepunahan jenis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melarang perburuan burung rangkong ▪ Patroli pengamanan hutan ▪ Pendidikan lingkungan ▪ Penyediaan alternatif ekonomi ▪ Penegakan hukum
5.	Penjualan umbi secara ilegal ke luar negeri	sedang	Kepunahan jenis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan alternatif ekonomi ▪ Penegakan hukum
6.	Penggunaan herbisida di kebun milik rakyat	tinggi	Mematikan tumbuhan dan anakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meminta penduduk untuk memindahkan tumbuhan ini ke lokasi konservasi eks situ

Amorphophalus titanum merupakan tanaman asli Indonesia yang endemik di Sumatra. Secara alami *Amorphophalus titanum* tersebar di seluruh hutan-hutan

Sumatra sebagai tumbuhan bawah kanopi (undergrowth) pada tanah berkapur, namun tumbuhan ini ditemukan pula di tempat terbuka, di hutan sekunder, pinggir jalan, pinggir sungai atau di tepi hutan. (Latifah dan Purwantoro, 2015).

Peta sebaran *A. titanum* di Lampung. 1. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Desa Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. 2. TNBBS, kawasan Pugung Tampak, Desa Rata Agung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. 3. TNBBS, kawasan Sukaraja Atas, Desa Sedayu, Kecamatan Samaka, Kabupaten Tanggamus. 4. HL Sumberjaya, Desa Tribudi Syukur, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. 5. HL Palkiah, Register 48B, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. 6. Hutan Masyarakat (HM) Desa Wates, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. 7. HM Desa Sungkai Selatan, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara

Akar pada *Amorphophallus titanum* berupa umbi. Umbi berbentuk membulat agak gepeng, diameter sekitar 65 cm dan tinggi umbi sekitar 40 cm, berat umbi dapat mencapai 100 kg, permukaan agak kasar dan banyak terdapat asesoris seperti calon tunas, berwarna coklat muda, tidak mempunyai tunas samping.

Batang yang dimiliki oleh *Amorphophallus titanum* merupakan batang semu yang tersusun oleh pelepah daun yang saling berlekatan.

Inflorescence bud (A) and blooming flower (B) parts: cataphylls (a), spathe (b), limb (c), lower

Helaian daun dengan diameter sekitar 7 m, pinak daun berbentuk elips melanset, panjang mencapai 40 cm, ujung meruncing, bila diraba seperti kulit, permukaan atas berwarna hijau, agak mengkilat. Perbungaan tunggal, tangkai bunga pendek, panjang sekitar 30 – 70 cm dan diameter sekitar 10 – 15 cm, motif dan warna seperti pada tangkai daun (Yumazimmi, dkk., 2015).Tangkai daun tanaman dewasa dapat tumbuh hingga tiga meter tingginya. Terdapat bercak berupa lingkaran putih pada tangkai daun. Daun dapat bertahan selama 9 sampai 24 bulan. Daun pada tumbuhan muda hanya bertahan 6 bulan (Lobin, et.al, 2007).

Inflorescence bud (A) and blooming flower (B) parts: cataphylls (a), spathe (b), limb (c) spathe (d), sterile spadix appendage (e1); inset: male and female flowers are located at lower part of spadix (e2), and peduncle (f) (Gandawijaja *et al.*, 1983; Graham and Hadiah, 2004; Lobin *et al.*, 2007; Li, 2013)

Perbungaan pada bunga bangkai merupakan sekelompok bunga kecil jantan dan betina. Tempat menempelnya bunga ada di bagian dasar tongkol. Tongkol (spadiks) berwarna kuning dan dikelilingi oleh seludang bunga yang berwarna merah keunguan. Tinggi spadiks dapat mencapai 3 m sehingga menjadikan bunga bangkai dijuluki “Bunga Raksasa”. Bunga jantan dan bunga betina tidak masak bersamaan. Bunga mekar sempurna (bunga betina masak) di malam hari dan mengeluarkan

bau bangkai. Bunga jantan masak keesokan harinya menghasilkan serbuk sari berwarna kuning, sehingga secara alami sulit menyerbuk sendiri. Hal unik dari tanaman ini terdapat dua fase hidup yaitu generative (berupa bunga) dan vegetative (berupa daun) yang tidak dapat dilihat bersamaan dalam satu tumbuhan. Jadi saat berwujud daun tidak akan berbunga dan ketika tiba waktu berbunga tidak memiliki daun.

Buah berwarna merah cerah atau orange tua dan menggerombol.

Jika dipetik satu buahnya, maka akan terlihat bentuk buahnya yang lonjong agak membulat dengan ujung yang meruncing dengan warna kehitaman. Menurut peneliti asal University of Wisconsin, AS, Thomas C Gibson, di benua Eropa dan Amerika saja, ada sekitar 6.000 kebun raya dan arboretum yang mengoleksi bunga bangkai raksasa biji berwarna merah, sebutir biji bunga bangkai membutuhkan waktu 20-40 thn untuk berbunga. Sedangkan menurut Yuzzami (2009), buah pada tanaman ini memiliki satu biji karena termasuk buah buni. Biji akan berwarna jingga-merah, jarang yang berwarna biru-putih. Bijinya berbentuk ellipsoid.

Amorphophallus titanum (Becc.) dimanfaatkan sebagai tanaman hias karena bentuknya yang unik dan mampu menarik perhatian banyak pengunjung. Selain itu juga sebagai bahan penelitian bagi ilmuwan-ilmuan di dunia. Manfaat lain yang dapat diambil dari tanaman ini adalah penggunaan umbinya sebagai bahan pangan. Namun, dalam pengolaannya memerlukan waktu yang lama sebab umbi memiliki getah yang menjadikan gatal. Umbinya bermanfaat karena kandungan Glucomannan-nya. Glucomannan memiliki kegunaan sebagai zat pengental, jelly yang kaya serat (dietaryfibers) dan dietary supplements (untuk antikolesterol, penetralisir kadar gula darah, kesehatan pencernaan, penyerapan zat beracun dalam pencernaan dan agen control berat badan) (Latifahetal.,2015).

Kesimpulan

Amorphophallus titanum merupakan tanaman endemik Pulau Sumatera yang memiliki ukuran besar sehingga sering disebut dengan bunga bangkai raksasa. Tumbuhan ini memiliki dua fase hidup, yaitu vegetatif yang berupa pohon dengan daun hijau dan batang berair, serta fase generatif yang berupa bunga. Tanaman ini dikategorikan ke dalam status kelangkaan ‘*vulnerable*’ karena belum tersedianya data yang komprehensif mengenai keberadaan dan populasinya di alam.

Belum banyak peneliti yang mengkaji tentang manfaat dari tanaman ini. Namun, di beberapa literatur menyebutkan bahwa tanaman ini selain dimanfaatkan sebagai tanaman hias dan penelitian, juga umbinya dapat dikonsumsi.

Daftar Pustaka

- Hettterscheid, W. L. A. & S. Ittenbach. (1996). Everything you always wanted to know about *Amorphophallus*, but were afraid to stick your nose into. *Aroideana*. Vol 19 : 7–131
- Latifah, D dan Purwantoro, R.S. (2015). Perkecambahan Biji Bunga Raksasa *Amorphophallus titanum*. *Warta Kebun Raya*, 13(1)

- Latifah, D dan Purwantoro, R.S. (2015). SEED GERMINATION OF THE CORPSE GIANT FLOWER *Amorphophallus titanum* (Becc.) Becc. Ex Arcang: THE INFLUENCE OF TESTA. *Berita biologi*. 14(1):39-48
- Latifah, D., Wawangningrum, H., Hartini, S., & Munawaroh, E. (2015). HOW TO PREDICT THE BLOOMING OF THE GIANT CORPSE INFLORESCENCE *Amorphophallus titanum* (Becc.) Becc. ex Arcang [Prediksi Mekarnya Bunga Bangkai Raksasa *Amorphophallus titanum* (Becc.) Becc. ex Arcang]. *Berita Biologi*, 14(2), 111-120.
- Lobin, W, et.al. (2007). The Cultivation of Titan Arum (*Amorphophallus titanum*) a Flagship Species For Botanic Gardens. *The Journal of Botanic Garden Horticulture*, No.5
- Mogea, J. P., D. Gandawidjaja, H. Wiriadinata, R.E. Nasution, & Irawati. (2001). *Tumbuhan Langka Indonesia*. Bogor: Herbarium Bogoriense P3 Biologi-LIPI.
- Munawaroh, Esti dan Yuzammi, J. R. (2017). Peta Persebaran Populasi *Amorphophallus titanum* (Becc.) Becc. ex Arcang di Lampung, Sumatera : Upaya Menuju Proposal ke IUCN Red Data List dan Konservasi Ex Situ. *Buletin Kebun Raya*. Vol 20 (2) : 119-129
- Poerba, Y, S dan Yuzammi. (2008). Pendugaan Keragaman Genetik *Amorphophallus titanum* Becc. Berdasarkan Marka Random Amplified Polymorphic DNA. *Biodiversitas*, 9(2): 103-107
- Yuzammi, J. R., dkk. (2015) Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Bunga Bangkai (*Amorphophallus titanum*). Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Yuzammi, J.R. Witono and W.L.A. Hetterscheid. (2014). Conservation status of *Amorphophallus discophorus* Backer & Alderw. (Araceae) in Jawa, Indonesia. *Reindwartia*. Vol 14 (1) : 27