Buletin Guaca Antariksa

ISSN 2303-2707

LUBANG IONOSFER PADA SAAT **TSUNAMI**

Angin Matahari

Dampak Gerhana Matahari
terhadap Lapisan Ionosfer

Belajar Komunikasi Astronomi
dari Masyarakat di Negeri Sakura

Pengamatan Bintik Matahari
menggunakan Direct-Draw Sunspot Sketch

**TTS
BERHADIAH**

Diterbitkan oleh
Pusat Sains Antariksa (Pussainsa)
LAPAN

Pelindung
Kepala LAPAN

Penanggung Jawab
Kepala Pusat Sains Antariksa

Redaktur
DR. Emanuel Sungging Mumpuni

Editor
F. Nuraeni
S. Sulistiani
V. Wellyanita
R. Kesumaningrum

Kontributor
Jiyo
V. Dear
S. Filawati
B. Muslim
M. Juangsih
B. Setiahad
S. Anggarani
A. S. Mardiani
C. E. Haryanto
F. Mumtahana
M. Ferdhiansyah
A. G. Adimiranto
R. Kesumaningrum
D. R. Martiningrum

Penata Letak
Endah Oktaviani, S.Ds.

Sekretariat
I.E. Rusnadi
S. Rachman

Alamat
Jl. Dr. Djundjuran No.133
Bandung 40173
Telepon: (022) 6012 602
Fax: (022) 6014 998

Untuk pemesanan Buletin
Cuaca Antariksa
Kirim faks permohonan
langganan Buletin Cuaca
Antariksa ke :

(022) 6012 602

daftar isi

- 3 Angin Matahari
- 4 Pengamatan Bintik Matahari
menggunakan Directed-draw
Sunspot Sketch Telescope (DSST) di
LAPAN Pasuruan
- 7 Mengenal Lapisan Ionosfer :
Fenomena Spread F dan Dampaknya
- 9 Dampak Gerhana Matahari Terhadap
Lapisan Ionosfer (Bagian 2)
- 11 Lubang Ionosfer Pada Saat Tsunami
- 13 Belajar Komunikasi Astronomi dari
Masyarakat di Negeri Sakura
- 24 Festival Science, Technology,
Engineering, Arts and Mathematics
(STEAM) 2018
- 25 Planetarium Mini Pussainsa LAPAN
Meramaikan Indonesia Science Day
2018
- 26 Kalender Astronomi
- 28 TTS Berhadiah

Cuaca Antariksa

- 16 Aktivitas Matahari
- 17 Aktivitas Geomagnet
- 19 Aktivitas Sintilasi Ionosfer di
Atas Bandung dan Biak
- 20 Koneksitas Jaringan ALE-
LAPAN dan Indeks T Regional
- 21 Cuaca Antariksa

Salam Redaksi

Memasuki triwulan tiga tahun 2018 kondisi cuaca antariksa semakin tenang dan menurun, akan tetapi aktivitas keantariksaan tidak sepi dari fenomena. Setiap hari, fenomena antariksa yang dipengaruhi cuaca antariksa pasti terjadi, seringkali juga bisa tampak dalam panjang gelombang optik, sehingga ada banyak fenomena cuaca antariksa yang bisa diamati dalam kondisi yang memungkinkan. Dalam terbitan ini akan dibahas berbagai fenomena antariksa yang disebabkan cuaca antariksa yang tampak dalam optik.

Pada penerbitan ini juga ditampilkan beberapa artikel menarik, yang terkait antariksa seperti lubang ionosfer pada saat tsunami, metode pengamatan bintik Matahari optik dari pengamatan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan LAPAN, serta kegiatan terkait yang berkait pelayanan dan edukasi di lingkungan Pusat Sains Antariksa, seperti pelayanan edukasi STEAM di Kupang,

planetarium di TMII, dan keikut-sertaan seorang staf peneliti LAPAN dalam kegiatan konferensi internasional di Jepang.

Sebagai wadah informasi cuaca antariksa, hasil pelayanan Pusat Sains Antariksa berupa informasi cuaca antariksa terkini ditampilkan dalam beberapa laporan kondisi dari berbagai aspek cuaca antariksa. Akhir kata, selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Salam redaksi.

ISSN 2303-2707

Angin Matahari

Oleh :

A. G. Admiranto

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

Beberapa peristiwa eruptif di Matahari, misalnya flare atau lontaran massa korona (*Coronal Mass Ejection* – CME), dapat menyebabkan berbagai pengaruh di lingkungan sekitar Bumi. Namun, selain kejadian di Matahari tersebut, terdapat fenomena lain di Matahari yang juga berkontribusi terhadap cuaca antariksa. Bila CME adalah terlepasnya sebagian atmosfer Matahari dengan kecepatan tinggi dan hanya berlangsung sesaat saja, maka di Matahari juga terdapat peristiwa terlepasnya atmosfer Matahari secara terus menerus dan terpancar ke segala arah dengan kecepatan yang jauh lebih rendah. Fenomena ini dinamakan angin Matahari.

Adanya aliran partikel dari Matahari pertama kali disampaikan oleh Richard Carrington yang melihat bahwa setelah terjadi flare di Matahari akan terjadi badai medan magnet Bumi sehari kemudian. Ia berpendapat bahwa flare itulah yang mengakibatkan adanya aliran partikel yang kemudian mengakibatkan adanya badai medan

magnet Bumi. Peneliti lain bernama George Fitzgerald menyatakan bahwa partikel-partikel ini dipancarkan secara terus menerus oleh Matahari yang kemudian sampai di Bumi dalam beberapa hari.

Sejak itu pemahaman tentang adanya aliran partikel dari Matahari mulai berkembang, tetapi belum secara keseluruhan, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Eddington pada tahun 1910 tentang adanya aliran elektron dari Matahari yang mengakibatkan munculnya ekor pada sebuah komet. Selanjutnya, peneliti-peneliti lain bernama Kristian Birkeland dan Frederick Lindemann mengatakan bahwa partikel-partikel itu tidak hanya berupa elektron, tetapi juga ion-ion positif.

Pada tahun 1958 seorang peneliti Inggris bernama Eugene Parker menyampaikan bahwa walaupun korona mengalami pengaruh gravitasi Matahari, temperatur korona yang sangat tinggi membuatnya menjadi penghantar panas yang sangat baik sehingga partikel-partikel ini bisa terlepas dari gravitasi Matahari.

Selain itu, semakin jauh dari Matahari pengaruh gravitasi

semakin lemah maka partikel-partikel di lapisan atas korona akan dengan mudah terlepas dengan kecepatan tinggi (melebihi kecepatan suara) ke luar angkasa. Karena partikel-partikel ini dilepaskan secara terus menerus dari seluruh permukaan Matahari, maka Parker mengusulkan istilah angin Matahari bagi fenomena ini.

Pada awalnya pandangan Parker ini tidak disetujui para ahli lain karena mereka berpendapat bahwa partikel-partikel yang terlempar dari Matahari tidak mungkin bergerak dengan kecepatan melebihi kecepatan suara. Kemudian pada tahun-tahun 1950-1960 Rusia dan Amerika Serikat meluncurkan berbagai wahana antariksa untuk melakukan berbagai penelitian ruang angkasa dan salah satunya adalah mengukur kecepatan angin Matahari sebagaimana diramalkan Parker.

Bukti pengamatan pertama tentang adanya angin Matahari muncul pada tahun 1962 saat wahana Mariner 2 yang bergerak menuju Venus berhasil merekam adanya aliran partikel dari Matahari yang diyakini adalah angin Matahari. Beberapa peluncuran pesawat lain kemudian mengkonfirmasi bahwa partikel-partikel yang menyusun angin Matahari ini adalah elektron, proton, dan beberapa unsur lain dalam jumlah yang sangat sedikit. Wahana-wahana ini juga mengamati bahwa medan magnet Matahari meluas ke daerah ruang

Gambar 1 : Pembentukan *corotating interaction region* akibat interaksi angin Matahari cepat dengan angin Matahari lambat.

Gambar 2 : Pola spiral pada pancaran angin Matahari.

antarplanet dan menjadi medan magnet antarplanet.

Dilihat dari kecepatannya, angin Matahari terbagi atas angin Matahari yang lambat dengan kecepatan 400 km/detik dan angin Matahari cepat dengan kecepatan 750 km/detik. Angin Matahari lambat tersusun dari materi yang terdapat di korona dan berasal dari daerah ekuator Matahari. Sementara angin Matahari cepat tersusun dari materi yang hampir serupa dengan materi fotosfer dan berasal dari lubang korona, di mana garis-garis gaya medan magnetnya dalam keadaan terbuka.

Dua jenis angin Matahari yang memiliki perbedaan kecepatan mengakibatkan munculnya fenomena yang diberi nama *corotating interaction region* (CIR). Saat angin Matahari dengan kecepatan tinggi bergerak mendahului yang memiliki kecepatan rendah, terjadilah interaksi dan menghasilkan angin Matahari dengan kecepatan berkisar di antara kecepatan angin matahari lambat dan angin Matahari cepat.

Arah pancaran angin Matahari yang meninggalkan Matahari tidak radial. Ini karena Matahari berotasi dan angin Matahari bergerak mengikuti garis-garis gaya medan magnet Matahari ke ruang antarplanet yang menjadi medan magnet antarplanet. Pola pergerakan

angin Matahari menjadi berbentuk spiral dan kemudian diberi nama spiral Parker. Arah pergerakan angin Matahari ini sangat mirip dengan pancaran air yang keluar dari *sprinkler* berputar yang dipakai membasahi lapangan rumput.

Selain itu, karena sumbu rotasi Matahari tidak berimpit dengan sumbu medan magnet Matahari, maka secara tiga dimensi bentuk pancaran angin Matahari ini akan berbentuk seperti rok balerina yang sedang menari (Gambar 3). Bila menggunakan analogi *sprinkler*, pola ini seperti *sprinkler* terpasang miring yang berputar sambil menyemburkan air.

CIR juga bisa mengakibatkan pengaruh sampai di lingkungan Bumi berupa peningkatan aktivitas medan magnet Bumi. Karena daerah CIR ini berotasi mengikuti rotasi Matahari, maka peningkatan aktivitas medan magnet Bumi ini ada yang berulang dengan lama periode rotasi Matahari, yaitu 27 hari.

Pola angin Matahari pada Gambar 3 terbentuk ketika Matahari dalam keadaan tenang, di mana tidak terjadi CME. Akan tetapi, bila ada CME, maka pancaran angin Matahari mengalami pemampatan dan bentuknya berubah menjadi seperti Gambar 4.

Bersama angin Matahari, medan magnet antarplanet ini merupakan

medium yang membawa berbagai radiasi dan partikel dari Matahari yang pengaruhnya sampai di seluruh planet di Tata Surya, dinamakan heliosfer. ■

Gambar 3 : Pola rok balerina pada pancaran angin Matahari yang bergerak keluar dari Sun.

Gambar 4 : Pemampatan angin Matahari akibat desakan oleh materi yang datang dari lontaran massa korona (CME).

Pengamatan Bintik Matahari menggunakan *Directed-draw Sunspot Sketch Telescope* (DSST) di LAPAN Pasuruan

Oleh :

B. Setiajadi

S. Filawati

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

Directed-draw Sunspot Sketch Telescope (DSST) merupakan teleskop yang berfungsi untuk menggambar dan mensketsa bintik matahari (*sunspot*) setiap hari.

Teleskop ini memanfaatkan lensa akromatik yaitu penggabungan lensa cembung dan cekung. Lensa cembung memiliki sifat menyebarkan berkas cahaya dan lensa cekung mengumpulkan berkas cahaya. Cahaya Matahari akan dipendarkan oleh lensa cembung

menjadi beberapa panjang gelombang dan akan difokuskan kembali oleh lensa cekung agar berkas cahaya Matahari tersebut dapat diteruskan pada lensa proyektor. Diameter yang digunakan pada lensa akromatik adalah 15 cm.

Lensa proyektor yang berfungsi

untuk memproyeksikan cahaya Matahari berjarak 225 cm dari lensa akromatik, selanjutnya cahaya Matahari akan ditampilkan pada papan sket *sunspot* yang berdiameter 12 cm. Pengaturan jarak 225 cm sebagai panjang DSST berfungsi untuk mendapatkan nilai perbandingan fokus (*focal ratio*) 1/15

Gambar 1 : Sketsa DSST.

Gambar 2 : Teleskop *Sunspot*.

agar *flatness* bayangan Matahari di papan sket jauh lebih baik.

Penempatan DSST berdasarkan lokasi stasiun yang berada di 7,5 LS, sehingga teleskop dibangun dengan kemiringan 7,5 dari permukaan air laut agar posisinya sejajar dengan

arah sumbu putar Bumi. Selain itu, bidang teleskop juga dibuat sejajar dengan arah meridian setempat.

Pengolahan data hingga menghasilkan data dalam bentuk ASCII berlangsung cukup lama. Oleh karena itu dalam artikel ini akan

Gambar 3 : Koordinat Heliografik.

```
@01 2452000.5 0257 CLOUDY 223 -26.17 -6.54 111.74 111.12 NP BS 076
#10 0123 120 F -55.4+12.6 -43.6+15.9 -32.0+17.7
0131 22 C -28.9+19.1 -22.6+21.3 -19.2+23.0
0148 4 A -6.1+8.0
0143 11 J +26.4+24.0
0142 5 J +21.4+10.0
0124 7 J -37.0 -10.0 -34.4 -11.3 -32.5 -13.0
0132 41 D -31.2 -10.4 -21.9 -9.1 -14.2 -9.3
0140 42 D -12.2 -9.0 -5.0 -9.3 +1.0 -10.3
0141 17 C +4.6 -5.3 +8.0 -5.0 +11.0 -4.9
0149 4 A +61.0 -14.0
```

Gambar 4 : Kode ASCII.

Kode	Keterangan
@01	Penanggalan dalam satu bulan
2452000.5	Julian Date
0257	Jam menit (jjmm) dalam UT
CLOUDY	Kondisi cuaca
223	seeing scintillation image (dalam indeks 1 hingga 5)
-26.17	P
-6.54	Bo
111.74	Lo
111.12	L
NP	No Photograph
BS	inisial pengamat
076	nomor pengamatan dari awal tahun
#10	Jumlah grup sunspot
0123	Nomor grup
120	Jumlah titik
F	Jenis grup
-55.4 +12.6 -43.6 +15.9 -32.0 +17.7	Letak koordinat grup (bujur lintang) (bujur lintang) sisi kiri grup (bujur lintang) rata-rata (bujur lintang) sisi kanan grup Jika grup <i>sunspot</i> kecil (kurang dari 5) tidak menggunakan nilai (bujur lintang) rata-rata

Keterangan Gambar 4

dijabarkan bagian pentingnya saja. Kertas sket *sunspot* yang digunakan pada saat menggambar *sunspot* menggunakan koordinat geografik sedangkan pada pengkodean ASCII menggunakan koordinat heliografik. Besaran yang digunakan adalah:

P : perputaran Matahari terhadap sumbu x.

Bo : perputaran Matahari terhadap sumbu y.

Lo : perputaran Matahari terhadap sumbu z.

ΔL : ketelitian perputaran matahari terhadap sumbu z.

L : diambil $Lo - \Delta L$

Besaran tersebut telah tersedia di tabel berdasarkan hari dan waktu. Proses selanjutnya adalah mengarsipkannya dalam kode ASCII.

Nilai G, F, dan R yang dibedakan berdasarkan *North* (utara) dan *South* (selatan) dalam Gambar 5 menunjukkan jumlah grup *sunspot*, jumlah titik *sunspot*, dan *wolf number* yang merupakan nilai perhitungan grup dan banyaknya *sunspot* yang dikalikan dengan konstanta. Nilai *wolf number* setara dengan $K(10G+F)$ dengan $K=0,62$ yang merupakan konstanta internasional yang diambil berdasarkan letak stasiun pengamatan.

Pengamatan bintang matahari telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun sejak tanggal 26 Oktober 1987 hingga saat ini, yang artinya DSST telah mengamati tiga siklus Matahari. Berdasarkan data bintang matahari, kita bisa mengetahui banyaknya bintang matahari yang terjadi pada lintang tertentu berdasarkan tahun, yang dipresentasikan dalam *butterfly* diagram. Selain itu, dinamika Matahari dapat diketahui dari data ini. ■

21 MARCH 2012			
TIME	:	01:10 (UT)	
WEATHER	:	CLOUDY	
SEEING	:	2/5	
SCINTIL	:	2/5	
IMAGE	:	3/5	
P	:	-25.30	
B	:	-7.01	
Lo	:	144.07	
dL	:	-0.64	
L	:	143.43	
JD	:	245 6007.55	
SPOT	G	F	R
NORTH	2	5	15.6
SOUTH	4	13	33.07
TOTAL	6	18	48.67
NOTE::			
No photograph			
OBSR : Nanang Widodo

Gambar 5 : Hasil Pengkodean ASCII.

Gambar 6 : *Butterfly* Diagram Berdasarkan Data DSST LAPAN Pasuruan.

Gambar 7 : Diagram Lokasi Bintang Matahari Berdasarkan di Belahan Matahari Utara dan Selatan.

Mengenal Lapisan Ionosfer : Fenomena Spread F dan Dampaknya

Oleh :

Jiyo

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

1. Fenomena Spread F dan Sekilas Tentang Pembentukannya.

Spread F adalah gejala atau fenomena di lapisan *F* ionosfer yang ditandai dengan menyebarnya jejak lapisan *F* pada ionogram (Gambar 1). *Spread F* merupakan salah satu bentuk taknormal yang menunjukkan ketidakaturan lapisan *F* yang lazimnya terjadi pada malam hari. Fenomena ketidakaturan ini pertama kali diamati menggunakan ionosonda, radar HF yang bekerja pada frekuensi ~2 MHz hingga ~22 MHz, di Huancayo, Peru pada 70 tahun yang lalu. Namun mekanisme fisis yang bertanggung jawab atas fenomena taknormal ini mulai diketahui sejak sekitar tahun 2000 meskipun hingga kini pemahamannya belum paripurna. Selain menggunakan ionosonda, beberapa teknik pengamatan tambahan telah dikembangkan, antara lain teknik sintilasi radio dari bintang, radar *backscatter*, pengukuran secara *in situ* menggunakan roket dan satelit, dan pencitraan (*imaging*) menggunakan kamera khusus.

Spread F adalah manifestasi dari pergerakan vertikal (*vertical drift*) lapisan ionosfer (*plasma*) yang memiliki kerapatan elektron lebih rendah, disebut juga sebagai *Plasma Bubble*. Pemahaman yang ada hingga saat ini, penyebab fenomena ketidakaturan tersebut adalah ketidakstabilan *Rayleigh-Taylor* (*Rayleigh-Taylor Instability*, **RTI**). Untuk lapisan ionosfer di daerah ekuator (atau lintang rendah), medan listrik (**E**) di lapisan *E* ke arah timur

dan arus plasma vertikal yang dihasilkan oleh $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ sering meningkat pada saat Matahari terbenam. Peningkatan medan listrik tersebut dapat menaikkan ketinggian lapisan ionosfer sebesar 100 km atau bahkan bisa mencapai ketinggian

(a)

(b)

(c)

Gambar 1 : Jejak Spread F pada ionogram: (a) tipe range spreading, (b) tipe frequency spreading, dan (c) tipe campuran.

500 km. Kemudian pada medan listrik *E* berbalik arah menuju ke barat dan lapisan ionosfer bergerak ke bawah selama rentang waktu berikutnya. Peristiwa fisis ini dikenal dengan *Pre-Reversal Enhancement* (**PRE**). Meski riset untuk mengungkap penyebab fenomena *Spread F* yang sesungguhnya masih terus dikembangkan, setidaknya sudah diusulkan bahwa gelombang gravitasi (*gravity wave*) dari atmosfer netral adalah sumber awal dari ketidakaturan tersebut. Dugaan ini diperkuat oleh hasil pengamatan radar yang menunjukkan bahwa pergerakan horizontal dari plasma di lapisan ionosfer bagian bawah yang disebabkan angin netral menjadi pemicu terjadinya **RTI**.

2. Tipe Spread F dan Kemunculannya.

Bentuk jejak fenomena *Spread F* pada ionogram ditunjukkan oleh Gambar 1. Berdasarkan bentuk penyebaran jejak lapisan *F* pada ionogram, terdapat 2 tipe *Spread F*, yaitu tipe *range spreading* dan tipe *frequency spreading*. Jejak *Spread F* tipe *range spreading* menunjukkan adanya penyebaran jejak secara vertikal pada frekuensi tertentu yang nilainya lebih rendah dari frekuensi kritis lapisan *F* (f_oF_2) (Lihat Gambar 1(a)). *Spread F* tipe *range spreading* ini lazim muncul di daerah lintang rendah dekat ekuator geomagnet. Sedangkan jejak *Spread F* tipe *frequency spreading* memperlihatkan penyebaran jejak secara horizontal atau bercabangnya jejak yang kabur/tidak tegas di ujung kanan ionogram (Lihat Gambar 1(b)). *Spread F* tipe ini lazim muncul di daerah lintang yang lebih tinggi. Di Indonesia sering muncul *Spread F* bertipe campuran (Lihat Gambar 1(c)).

Contoh fenomena *Spread F* diperoleh dari hasil pengamatan menggunakan ionosonda CADI

(*Canadian Advanced Digital Ionosonde*) di Stasiun Pengamatan Manado-Tomohon ($1,34^{\circ}\text{LU}$, $124,82^{\circ}\text{BT}$). *Spread F* tipe *range spreading* yang teramati di Stasiun Manado-Tomohon pada tanggal 23 Februari 2013 pukul 03.30 WITA (UT+8) seperti pada Gambar 2(a), menunjukkan penyebaran jejak secara vertikal. Dari Gambar 2(a) ini terlihat bahwa pada frekuensi ~ 4 MHz terjadi penyebaran jejak lapisan *F* dari ketinggian ~ 300 km hingga ketinggian 400 km. Kemudian Gambar 2(b) menunjukkan penyebaran jejak secara horizontal pada ionogram hasil pengamatan di tempat dan tanggal yang sama pada pukul 04.30 WITA, yang menunjukkan “pelebaran” frekuensi lebih dari 1 MHz. Ionogram ini menunjukkan terjadinya *Spread F* tipe *frequency spreading* di atas Manado.

Spread F yang muncul di daerah ekuator (geomagnet) dan lintang rendah sering disebut sebagai *Equatorial Spread F (ESF)* karena memiliki karakter khusus dan mekanisme pembentukannya agak berbeda dibandingkan dengan *Spread F* yang terjadi di tempat lainnya. Mekanisme pembentukan *ESF* diduga juga dipengaruhi oleh fenomena di atmosfer netral dan ini masih menjadi tantangan bagi para peneliti untuk mengungkap lebih jelas. Dugaan hubungan antara *ESF* dengan dinamika atmosfer netral menjadi latar belakang penelitian tentang proses kopling antara atmosfer dengan antariksa.

3. Dampak *Spread F* Terhadap Propagasi Gelombang Radio

Spread F, yang merupakan gejala ketidakaturan lapisan ionosfer, memberikan dampak terhadap gelombang radio. Demikian juga fenomena *Plasma Bubble* yang berasosiasi dengannya. Gelombang radio HF akan mengalami gejala

fading yang disebabkan oleh perubahan ketinggian lapisan pada saat terjadi *Spread F*. *Fading* adalah gejala fluktuasi kuat sinyal gelombang radio secara berulang-ulang, yakni sinyal menguat dan melemah secara bergantian. *Fading* yang fluktuasinya kuat dan waktunya cepat adalah gangguan terhadap komunikasi radio. Dalam kondisi *fading* yang kuat, kuat sinyal gelombang radio akan turun hingga di bawah batas toleransi derau (*noise*) sehinggasinyalnya menghilang.

Plasma Bubble yang terjadi di lapisan ionosfer juga akan mengakibatkan *fading* terhadap sinyal gelombang radio yang digunakan dalam sistem navigasi modern berbasis satelit. Sinyal gelombang radio pada pita UHF (300 – 3000 MHz) yang dipancarkan oleh sistem satelit navigasi global (*Global Navigation Satellite System*, GNSS) akan mengalami *fading* ketika melintasi lapisan ionosfer yang

sedang terjadi *Plasma Bubble*. Peristiwa *fading* pada sinyal satelit lazim disebut *sintilasi*. Peristiwa *fading* pada sinyal satelit navigasi akan menyebabkan pengukuran posisi (dan juga waktu) mengalami kesalahan yang pada akhirnya akan menyebabkan kegagalan aplikasi GNSS untuk berbagai kegiatan.

4. Pengaruh Fenomena *Spread F* Terhadap Proses *Scaling*.

Scaling adalah proses membaca dan menginterpretasikan ionogram sehingga diperoleh nilai parameter lapisan ionosfer (misalnya f_{min} , f_oF_2 , $h'F_2$). Berdasarkan konvensi internasional, nilai parameter hasil *scaling* harus disertai informasi tentang tingkat ketelitian baca dan penjelasan/deskripsi tentang alasan dari tingkat ketelitian yang diperoleh. Tingkat ketelitian dan deskripsi dinyatakan dalam huruf-huruf tertentu sesuai dengan aturan

Gambar 3 : Ilustrasi tingkat kesulitan dalam menentukan (*scaling*) ketinggian lapisan: (a) ketika terjadi *Spread F* tipe *range spreading*, (b) ketika terjadi *Spread F* tipe selain *range spreading*.

scaling. Gambar ionogram yang tidak tegas (kabur) ketika terjadi *Spread F* akan menyebabkan proses *scaling* tidak akurat.

Ketika terjadi *Spread F* tipe *range spreading*, seperti pada Gambar 1(a), pembacaan ketinggian lapisan (misalnya $h'F$) akan sulit dilakukan karena jeaknya menyebar secara vertikal. Ketinggian lapisan ditentukan dengan cara menarik garis lurus horizontal sehingga menyinggung jejak terbawah dari ionogram. Penentuan titik singgung akan sulit dilakukan pada jejak yang tidak tegas seperti pada Gambar 3(a). Dalam gambar tersebut ketinggian lapisan dapat ditentukan dengan garis mendatar yang berada di bawah ($h'F \sim 360$ km) atau di atas ($h'F \sim 420$ km). Sebaliknya, penentuan nilai ketinggian lapisan ionosfer pada Gambar 3(b) dapat dilakukan dengan mudah menggunakan garis mendatar yang menyinggung jejak lapisan yang tegas (tidak menyebar).

Spread F tipe *frequency spreading* (Gambar 4(a)) akan menimbulkan kesulitan dalam menentukan nilai frekuensi (misalnya $foF2$). Frekuensi lapisan ditentukan dengan cara menarik garis vertikal yang menyinggung jejak ionogram pada ujung kanan. Jejak yang menyebar di

ujung kanan ionogram menyebabkan kesulitan dalam menentukan nilai frekuensi. Dari Gambar 4(a) nilai frekuensi dapat ditentukan dengan garis sebelah kiri ($foF2 \sim 5,1$ MHz) atau kanan ($foF2 \sim 5,8$ MHz). Sebaliknya, dalam ionogram normal seperti Gambar 4(b), nilai frekuensi dapat ditentukan dengan mudah menggunakan garis vertikal yang menyinggung ujung kanan jejak lapisan ($foF2 \sim 5,2$ MHz).

5. Waktu Kemunculan Spread F

Telah dijelaskan pada awal tulisan ini bahwa *Spread F* adalah fenomena di lapisan ionosfer yang terjadi pada malam hari. Penelitian secara statistik yang telah dilakukan para peneliti terhadap distribusi kemunculan fenomena ketidakaturan ini menunjukkan bahwa ia memiliki variasi musiman (*seasonal*), variasi skala siklus Matahari (*decadal*), dan variasi berdasarkan lintang (*latitudinal*).

Spread F lebih banyak terjadi pada saat *equinox* bulan Maret dan September, begitu pula pada saat tingkat aktivitas Matahari rendah. Variasi *decadal* masih menjadi pertanyaan bagi para peneliti karena variasi ini berbanding terbalik dengan variasi sintilasi yang juga berkaitan erat dengan *Spread F* dan *Plasma Bubble*. Salah satu alternatif

jawabannya adalah bahwa pada saat aktivitas Matahari maksimum, *Spread F* kemungkinan terjadi pada ketinggian di atas puncak kerapatan elektron lapisan ionosfer sehingga fenomenanya tidak terekam dalam ionogram hasil *bottomside-sounding*. ▀

(Bersambung)

(a)

(b)

Gambar 3 : Ilustrasi tingkat kesulitan dalam menentukan (*scaling*) frekuensi lapisan: (a) ketika terjadi *Spread F* tipe *frequency spreading*, (b) ionogram normal.

Dampak Gerhana Matahari Terhadap Lapisan Ionosfer (Bagian 2)

Oleh :

D. R. Martiningrum

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

Pada Buletin Cuaca Antariksa edisi sebelumnya, kita sudah membahas mengenai dampak gerhana Matahari terhadap lapisan D ionosfer. Tulisan kali ini akan menambah wawasan lebih jauh tentang dampak gerhana Matahari

terhadap lapisan ionosfer lainnya. Namun sebelum membahas dampak gerhana Matahari terhadap lapisan E dan F_1 ionosfer, terlebih dulu akan ditinjau kembali bagaimana secara umum mekanisme fisis yang terjadi dalam lapisan ionosfer.

Seperti kita ketahui, lapisan ionosfer terdiri dari beberapa lapisan yang dibedakan berdasarkan

kerapatan elektronnya. Hal paling mendasar yang dapat memberi gambaran tentang fisis lapisan ionosfer dapat kita lihat dari persamaan kontinuitas dalam lapisan ionosfer seperti berikut :

$$\frac{\partial N}{\partial t} = q - l(N) - \nabla(N \nabla) \quad (1)$$

dimana q adalah suku produksi, $l(N)$ adalah suku *loss*, dan $\nabla(N \nabla)$ adalah suku *transport*. Jadi perubahan kerapatan elektron pada lapisan ionosfer ditentukan oleh faktor-faktor produksi dalam fotoionisasi, kehilangan (*loss*) dalam

fotodisosiasi, dan perpindahan (*transport*). Pada lapisan D, E dan F₁, faktor *transport* tidaklah terlalu penting sehingga dapat diabaikan. Sedang pada lapisan F₂ faktor *transport* mempunyai peranan yang penting.

Dampak Terhadap Lapisan E dan F₁

Rishbeth, seorang peneliti dari Inggris, pada tahun 1968 menggunakan persamaan kontinuitas (1) untuk kasus kejadian gerhana Matahari, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\frac{dN}{dt} = E(t) q(t) - \alpha N^2 \quad (2)$$

$$\frac{dN}{dt} = E(t) q(t) - \beta N \quad (3)$$

di mana N adalah kerapatan elektron, $E(t) q(t)$ adalah laju produksi yang bervariasi terhadap waktu saat terjadi gerhana Matahari, α adalah koefisien rekombinasi, dan β adalah koefisien *loss*. Perlu dicatat bahwa semua suku dalam persamaan (2) dan (3) adalah fungsi dari ketinggian. Persamaan (2) berlaku untuk lapisan E dan F₁, sedangkan persamaan (3) berlaku untuk lapisan F₂.

Dengan mengamati perubahan kerapatan elektron setiap saat, Rishbeth mendapat gambaran bagaimana laju produksi akan terpengaruh oleh kejadian gerhana Matahari sebagian 19 April 1958. Secara teoritis laju produksi akan terlambat sebesar $1/2 \alpha N^2$ untuk lapisan E dan F₁, serta $1/\beta N$ untuk lapisan F₂ seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Gambar 1 menunjukkan perubahan kerapatan elektron saat sebelum (B), sedang (M), dan sesudah gerhana Matahari (E) untuk lapisan E dan F₁. Terlihat dengan jelas terjadi *lag* sekaligus penurunan kerapatan elektron pada saat terjadi gerhana matahari. Selain itu, dari Gambar 1 juga teramati bahwa lapisan ionosfer yang lebih rendah mengalami pemulihan lebih lambat dibandingkan dengan lapisan ionosfer yang lebih tinggi.

Tahun 2008, Le dkk. meneliti respon lapisan E dan F₁ terhadap kejadian gerhana Matahari total 11 Agustus 1999 dengan memanfaatkan data dari 16 stasiun pengamatan ionosonde dan model *Theoretical Ionospheric Model of the Earth in the Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences* (TIME-IGGCAS). Dari 16 stasiun

ionosonde tersebut kemudian dilakukan analisis statistik variasi data frekuensi kritis lapisan E (foE) dan frekuensi kritis lapisan F₁ (foF₁) sebagai fungsi dari magnitudo gerhana Matahari. Kemudian didefinisikan suatu faktor revisi radiasi matahari sebagai efek dari gerhana ke dalam masukan model. Faktor revisi radiasi Matahari tersebut merupakan fungsi dari waktu universal, ketinggian, bujur, dan lintang.

Selanjutnya dilakukan simulasi dengan menggunakan model TIME-IGGCAS, hasilnya menunjukkan bagaimana perubahan kerapatan elektron atau perbandingan kerapatan elektron antara hari saat terjadi gerhana dengan hari lain tanpa gerhana (Gambar 2a), perbandingan temperatur elektron saat gerhana dan saat tidak ada gerhana (Gambar 2b), serta perbandingan kecepatan drift dari ion O⁺ saat gerhana dengan saat tidak ada gerhana (Gambar 2c). Dua lingkaran kecil pada bagian bawah panel di Gambar 2 menunjukkan waktu totalitas gerhana terjadi dan waktu gerhana berakhir.

Dari hasil pengamatan dan simulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- Terjadi penurunan kerapatan elektron baik di lapisan E maupun lapisan F₁ saat gerhana

Gambar 1 : Variasi kerapatan elektron di lapisan E dan F₁ saat gerhana matahari.

Gambar 2 : Hasil simulasi model TIME-IGGCAS.

Matahari di wilayah lintang tengah maupun lintang rendah dengan penurunan kerapatan elektron lebih besar terjadi di lapisan F_1 dibandingkan dengan lapisan E.

- Akurasi model hanya bagus untuk ketinggian di atas 500 km dan di bawah 2000 km.
- Saat gerhana Matahari mempengaruhi wilayah tertentu di belahan Bumi utara, maka gangguan terhadap lapisan ionosfer juga dirasakan pada daerah konjugatnya (di belahan Bumi lainnya).

Dampak Terhadap Lapisan F_2

Respon lapisan F_2 terhadap kejadian gerhana Matahari berbeda dengan respon lapisan E dan F_1 , karena pada lapisan F_2 , faktor *transport*/perpindahan juga berperan selain faktor reaksi fotokimia dan elektrodinamik, sehingga harus ikut diperhitungkan dalam menentukan

efek gerhana tersebut. Adekoya dkk (2012) melakukan penelitian respon lapisan F_2 terhadap gerhana Matahari total, memanfaatkan data frekuensi kritis lapisan F_2 dengan melakukan normalisasi simpangan frekuensi kritis lapisan F_2 sebagai berikut:

$$D(foF_2) = \frac{foF_2 - (foF_2)_{ave}}{(foF_2)_{ave}} \times 100\%$$

dengan $(foF_2)_{ave}$ adalah nilai rata-rata frekuensi kritis lapisan F_2 setiap 5 menit yang dirata-ratakan selama 3 hari pengamatan dalam selang waktu kejadian gerhana Matahari. Hasilnya menunjukkan bahwa respon lapisan F_2 terjadi beberapa saat sebelum atau sesudah totalitas gerhana berupa penurunan kerapatan elektron, seperti diperlihatkan oleh Gambar 3. Karena ada hubungan linier antara frekuensi kritis lapisan F_2 dan kerapatan elektron, maka fluktuasi nilai normalisasi dari simpangan

frekuensi kritis lapisan F_2 dapat juga dijadikan indikator nilai parameter kerapatan elektron. Untuk penelitian lebih lanjut bisa dicoba memanfaatkan data keluaran peralatan pengamatan ionosfer lain seperti *Incoherent Scatter Radar* (ISR) dan satelit GPS/RO. ■

Gambar 3 : Normalisasi simpangan frekuensi kritis lapisan F_2 saat kejadian gerhana Matahari total. Blok garis tegak adalah waktu totalitas gerhana Matahari di stasiun pengamatan.

Lubang Ionosfer Pada Saat Tsunami

Oleh :

B. Muslim

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

Tsunami adalah gelombang laut yang bisa disebabkan oleh gempa bumi, jatuhnya meteor atau benda lain di laut, tanah longsor di tebing pantai, dan lain-lain. Pada saat gempa bumi, dorongan patahan lempeng ke bawah atau ke atas dapat memindahkan sejumlah volume air laut yang sangat besar dan dapat menimbulkan gelombang laut yang menjalar dengan kecepatan lebih dari 600 km/jam secara horizontal dan radial dari episentrum. Penurunan permukaan laut dalam skala beberapa meter di episentrum dapat terjadi pada fase awal tsunami. Hal ini dapat menimbulkan lubang ionosfer dalam skala ratusan meter.

Mekanisme terbentuknya lubang ionosfer pada saat tsunami diungkapkan oleh Kakinami dkk. (2012), diilustrasikan pada Gambar 1. Dorongan air laut ke atas menimbulkan kompresi kerapatan atmosfer di atasnya. Kompresi kerapatan atmosfer secara mendadak ini dapat menimbulkan gelombang akustik di atmosfer yang menjalar ke atas. Karena profil vertikal

kerapatan atmosfer yang semakin kecil dengan bertambahnya ketinggian, amplitudo gelombang akustik semakin membesar selama propagasinya ke atas untuk mempertahankan energinya. Pada ketinggian ionosfer, gelombang akustik tersebut memengaruhi kerapatan elektron ionosfer. Beberapa saat setelah tsunami bergerak, permukaan laut di atas episentrum bisa turun karena terbawa propagasi gelombang tsunami ke segala arah. Hal tersebut menimbulkan turunnya kerapatan atmosfer dan ionosfer atau, dengan kata lain, terjadinya peregangkan atmosfer dan ionosfer. Pada saat terjadi penurunan kerapatan elektron ke arah bawah, elektron-elektron tersebut berada pada daerah rekombinasi yang lebih besar dibandingkan dengan proses ionisasi ionosfer oleh radiasi Matahari. Alhasil, kerapatan elektron di ionosfer mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan penurunan kerapatan

ionosfer yang berpusat di sekitar episentrum yang signifikan dibandingkan dengan kerapatan elektron di luar episentrum. Hal inilah yang menimbulkan lubang ionosfer di atas episentrum, diperkenalkan sebagai *tsunamigenic ionospheric hole* (TIH).

Hasil pengamatan penurunan Sant Total Electron Content (STEC) untuk kasus tsunami Tohoku 11 Maret 2011 ditunjukkan oleh Gambar 2. Distribusi spasial dari perbedaan STEC (satelit 15, 18, dan 26) antara STEC saat terjadi gempa bumi dan STEC pada hari lain yang dijadikan referensi pada pukul 5.46 UT (tepat sebelum gempa utama), pukul 5.55 UT (9 menit setelah gempa) ketika gelombang akustik mencapai ionosfer, pukul 5.56,5 UT ketika gelombang akustik mulai menjalar, dan pukul 6.11 UT ketika lubang ionosfer jelas muncul. Tanda bintang dan garis abu-abu menunjukkan episentrum dan daerah sumber tsunami. Bagian bawah kanan dari panel ketiga menunjukkan deret waktu dari perbedaan STEC dari tipe A (pada saat terjadi kenaikan STEC) dan tipe B (pada saat terjadi penurunan STEC).

Kakinami dkk. (2012) juga menemukan TIH pada saat tsunami Aceh tanggal 26 Desember 2004 dan tsunami Chili tanggal

27 Februari 2010. Oleh karena itu, Kakinami dkk. (2012) menyimpulkan bahwa TIH disebabkan oleh turunnya permukaan laut dalam skala meter di daerah sumber tsunami yang dapat mengakibatkan turunnya plasma ionosfer dalam skala seratus kilometer dan penipisan plasma akibat rekombinasi plasma yang tinggi pada termosfer bawah melalui proses kimia.

Nilai maksimum penurunan kerapatan ionosfer di atas episentrum dapat dikaitkan dengan tinggi awal tsunami. Berdasarkan 7 kejadian tsunami, Kamogawa dkk. (2016) telah dapat menghubungkan TIH dengan ketinggian awal tsunami seperti ditunjukkan pada Gambar 3. A, B, C, D, E, F dan G masing-masing menunjukkan gempa bumi berkekuatan M 8,0 di Tokachi-oki tahun 2003, M 7,4 di dekat Kii Peninsula tahun 2004, M 6,6 tahun 2007 di Niigataken Chuetsu-oki, M 8,8 tahun 2010 di Maule, M 7,0 tahun 2011 di Sanriku, M 9,0 tahun 2011 di Tohoku, dan M 8,3 tahun 2015 di Illapel. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan data GNSS untuk 7 gempa bumi tersebut, Kamogawa dkk. (2016) menyimpulkan bahwa temuan mereka menyiratkan pengukuran TEC Ionosfer menggunakan jaringan GNSS dapat digunakan dalam sistem peringatan dini tsunami di sekitar daerah yang memakan waktu lebih dari 20 menit untuk tiba di daerah pantai. ■

Gambar 1 : Proses terjadinya gelombang akustik dan pembentukan lubang di ionosfer akibat tsunami (Kakinami dkk., 2012).

Gambar 2 : (a) Perkembangan lubang ionosfer tsunami pada gempa bumi Tohoku 11 Maret 2011, mulai saat terjadinya gempa bumi sampai lubang ionosfer terlihat jelas dan (b) perbedaan STEC satu menit dan 15 menit setelah gempa bumi yang menimbulkan tsunami (Kakinami dkk., 2012).

Gambar 3 : Hubungan antara persentase penurunan TEC dari lubang ionosfer dengan ketinggian awal tsunami (Kamogawa dkk., 2016).

Belajar Komunikasi Astronomi dari Masyarakat di Negeri Sakura

Oleh :

F. Mumtahana

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

Dalam tulisan kali ini, saya akan berbagi pengalaman dan informasi setelah mengikuti kegiatan konferensi CAP (*Communicating Astronomy with the Public*) 2018. CAP merupakan acara dua tahunan yang diselenggarakan oleh *International Astronomical Union (IAU), Commission 2 – Communicating Astronomy with the Public*. Pada tahun 2018 ini, konferensi CAP yang bertema “*Communicating Astronomy in Today's World: Purpose & Methods*” diadakan di *Fukuoka City Science Museum*, Fukuoka, Jepang, dengan menggandeng *National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ)* dan *Fukuoka City* dalam koordinasinya. Panitia, sponsor, dan kolaborator dalam kegiatan ini terdiri atas b e b e r a p a institusi/universitas/komunitas dari berbagai negara. Keseluruhan acara CAP diadakan dari tanggal 23 hingga 29 Maret 2018 dengan acara inti pada 24-28 Maret 2018. Rentang waktu tersebut sengaja dipilih oleh panitia karena bertepatan dengan mekarnya bunga sakura di kota Fukuoka untuk menyambut para peserta konferensi (Gambar 1). Kegiatan ini dihadiri oleh 455 peserta dari 53 negara yang terdiri dari 5 pembicara utamai, 24 pembicara pleno, 165 pembicara sesi paralel, dan 106 pembicara poster. Topik-topik yang dibawa oleh peserta hampir tidak ada yang membosankan karena bahasanya menarik.

Subtema kegiatan konferensi CAP tahun ini antara lain: Tantangan terkini dalam komunikasi astronomi; Praktik *public outreach* yang baik; Komunikasi astronomi dalam keanekaragaman, inklusi,

keadilan, dan empati; Komunikasi astronomi untuk dunia yang lebih baik; Peran media dalam komunikasi astronomi; Menggunakan multimedia, media sosial, dan teknologi untuk keterlibatan publik dengan astronomi; serta topik khusus mengenai perayaan 100 tahun IAU. Dengan keluasan tema tersebut, target peserta dari konferensi ini pun sangat luas, mulai dari komunikator sains, petugas *public outreach*, pengajar informal, astronom profesional, astronom amatir, petugas planetarium, museum dan pusat sains, peneliti ilmu alam dan sosial, jurnalis dan penulis, hingga tim kreatif dan seniman. Peserta yang hadir dari Indonesia sendiri cukup banyak, antara lain perwakilan dari Langit Selatan, Astronomi ITB, Planetarium Jakarta/HAAJ, Observatorium Bosscha, Klub

Gambar 1 : Bunga Sakura yang mulai bermekaran pada permulaan acara konferensi CAP. (Sumber: Pussainsa)

Gambar 2 : Pertunjukan Teater NOH play dan persiapan kegiatan pengamatan bintang. (Sumber: Pussainsa LAPAN dan konferensi CAP)

Gambar 3 : Proyektor dan Teater Planetarium Fukuoka City Science Museum. (Sumber: Pussainsa)

Astrogeologi UGM, Himastron ITB, Pendidikan Fisika UAD, dansaya sendiri mewakili LAPAN. Panitia menyediakan dana terbatas untuk membiayai peserta yang mendaftar khususnya dari negara-negara berkembang dan untuk komunikator sains. Skema bantuan yang ditawarkan terbagi menjadi dua jenis, yaitu *IAU travel grant* dari IAU dan *Japanese travel grant* dari NAOJ dan *Japanese crowdfunding campaign*, dengan persyaratan tertentu untuk memperolehnya.

Konferensi CAP yang diadakan saat musim semi tersebut memiliki keunikan dan konsep yang berbeda dengan konferensi-konferensi lainnya yang pernah saya ikuti. Dengan durasi waktu yang cukup lama, peserta tidak hanya sekedar mendengarkan dan mempresentasikan hasil penelitian atau pengalaman satu sama lain, namun dapat juga menikmati pertunjukan planetarium baru dan menjelajahi *Fukuoka City Science Museum* ketika registrasi satu hari

sebelumnya, menikmati pertunjukan tradisional Jepang, *NOH play*, pengamatan bintang di taman Ohori (Gambar 2), mengikuti pesta penyambutan, serta minum teh sore bersama. Kegiatan lain dengan biaya tambahan juga tersedia, seperti perjamuan resmi dan ekskursi keliling kota Fukuoka dan sekitarnya. Keunikan lain dari konferensi ini adalah konsep presentasi yang tersedia juga dalam format *full-dome* untuk ditampilkan di dalam kubah planetarium seperti pada Gambar 3.

Selain kegiatan konferensi seperti pada umumnya, peserta juga diberi kesempatan untuk mengadakan dan mengikuti maksimal 4 dari total 24 kegiatan lokakarya yang cukup interaktif dengan tema-tema menarik, seperti mengatasi hoaks dalam astronomi, membuat komik astronomi, akses jarak jauh teleskop raksasa untuk publik, menghubungkan sains dan seni, belajar *podcast*, membuat alat peraga astronomi untuk tunanetra,

dan lain-lain.

Dengan keberuntungan memperoleh *Japanese travel grant*, saya berangkat bersama dua kawan dari Indonesia, yaitu perwakilan dari Observatorium Bosscha dan UAD. Kami menyewa apartemen mini untuk kami tinggal bersama selama berada di sana. Motivasi saya mengikuti kegiatan ini, selain mencari pengalaman baru, adalah ingin mempelajari cara berkomunikasi yang baik dengan publik/wartawan, mendengarkan pengalaman-pengalaman dari para komunikator sains, terutama dalam bidang sains antariksa dan astronomi, serta ingin berbagi mengenai pekerjaan saya. Dalam konferensi tersebut, saya membawa dua materi untuk dipresentasikan (Gambar 5). Materi pertama berjudul "*How an MPV gain Traction for A National Observatory of Indonesia? Sharing the Experience*" dibawakan dalam bentuk presentasi oral

Gambar 4 : Berbagai kegiatan lokakarya pada konferensi CAP 2018. (Sumber: Pussainsa)

Gambar 5 : Presentasi sesi paralel mengenai Observatorium Nasional di ruangan Lab II (kiri) dan presentasi Poster mengenai Analemma (kanan). (Sumber: Konferensi CAP)

mewakili Dr. Emanuel Sungging. Pokok bahasan materi ini dimulai dari pengenalan Observatorium Nasional (Obnas) hingga kegiatan planetarium mini yang dikemas dalam sebuah modifikasi *Multi-purpose Vehicle* (MPV) untuk mendukung pembangunan Obnas. Materi kedua disajikan dalam format poster selama tiga hari dengan judul “*Learning Astronomy through the Photograph of Solar Analemma*”. Dalam poster tersebut dipaparkan

Gambar 6 : Tugas pembuatan video pada lokakarya dan informasi kegiatan lokakarya pada media jejaring sosial Twitter. (Sumber: Akun Twitter peserta konferensi CAP dengan tagar #CAP2018)

pemanfaatan dari hasil pembuatan fotografi Analemma dengan Gerhana Matahari 2016 untuk bahan pengajaran edukasi astronomi. Hasil fotografi yang dibuat bersama tim Tutulemma telah diterbitkan di beberapa media, seperti majalah populer, makalah prosiding internasional, buku Eksplorasi Tata Surya karya A. Gunawan Admiranto, dan didistribusikan kepada beberapa pengajar sebagai referensi edukasi astronomi orisinal karya anak bangsa. Hal menarik yang dapat diambil sebagai pelajaran pada sesi poster yaitu bentuk penyajian poster. Beberapa peserta menyajikan poster dalam bentuk yang lebih interaktif, seperti gambar timbul 3-dimensi, penggunaan alat peraga, pembagian cendera mata, penggunaan multimedia, dan lain-lain. Hal tersebut belum pernah saya temui sebelumnya pada sesi poster di konferensi atau seminar yang pernah saya ikuti.

Selama acara konferensi berlangsung, para peserta juga diimbau untuk memantau dan aktif di media jejaring sosial terutama Facebook dan Twitter untuk saling berbagi informasi dan foto-foto kegiatan CAP dengan tagar #CAP2018. Dalam lokakarya

tertentu peserta bahkan ditugaskan untuk mengunggah video di Twitter untuk belajar *elevator pitch* dan komunikasi astronomi melalui media jejaring sosial (Gambar 4). Di samping itu, kegiatan konferensi ini dapat menjadi ajang reuni internasional. Banyak peserta yang sudah saling mengenal dari kegiatan *short school* atau konferensi lain dalam lingkup astronomi karena, dapat dikatakan, komunitasnya tidak terlalu besar. Saya sendiri tidak menyangka akan bertemu teman-teman dari kegiatan *International Astronomy Youth Camp* (IAYC) tahun 2011 silam.

Sebagai penutup, kegiatan konferensi CAP ini sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk terus diikuti terutama oleh perwakilan dari LAPAN yang berorientasi pada layanan publik. Konferensi ini dapat menjadi sarana yang tepat untuk menimba ilmu dan mempraktikkan komunikasi astronomi secara langsung karena peneliti LAPAN sering berhadapan dengan publik dan wartawan. Dari acara tersebut kita juga dapat berbagi pengalaman, memperluas jaringan, dan mengetahui perkembangan popularisasi serta edukasi astronomi di dunia. ■

Gambar 7 : Foto bersama seluruh peserta konferensi CAP 2018. (Sumber: Konferensi CAP)

Aktivitas Matahari

Maret - Mei 2018

Oleh :

F. Mumtahana

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

Aktivitas Matahari dari bulan Maret hingga Mei 2018 cenderung tenang dengan beberapa kejadian eruptif. Seperti yang terlihat pada Tabel 1, aktivitas Matahari tergolong sepi dari kejadian lontaran masa korona (CME) dan *flare*. Selama periode tiga bulan tersebut, pada piringan Matahari tercatat 12 daerah aktif yaitu NOAA 12700 hingga 12712.

Sepanjang bulan Maret 2018, tidak banyak daerah aktif dan aktivitas yang terjadi pada permukaan Matahari. Dengan menghilangnya NOAA 12700 di awal bulan, kondisi Matahari

berangsur tanpa bintik (*spotless*) hingga pertengahan bulan. NOAA 12701 dan 12702 kemudian muncul meskipun hanya 1-2 hari saja. Permukaan Matahari kembali dalam keadaan bersih dari bintik hingga di penghujung bulan Maret 2018.

Aktivitas Matahari yang terekam sepanjang bulan Maret hanya dua peristiwa *flare* kelas C. *Flare* terkuat C4.6, terjadi di akhir bulan pada tanggal 30 Maret 2018 dengan puncaknya pukul 09:04 UT dari NOAA 12703. Kejadian tersebut disertai oleh semburan radio tipe II pada pukul 08:04-08:28 UT. Meskipun tidak ada CME halo parsial yang terjadi, terdapat beberapa CME dengan kecepatan dan sudut kecil yang terjadi terutama pada minggu terakhir bulan Maret.

Kondisi *spotless* bertahan cukup lama di permukaan Matahari hingga kemunculan NOAA 12704 yang

Tabel 1 : Daftar Kejadian Flare dan CME Halo Parsial Periode Maret - Mei 2018.

Flare Bulan	Flare			CME Halo Parsial
	C	M	X	
Maret	2	-	-	-
April	-	-	-	-
Mei	2	-	-	1

sedehana pada tanggal 12 April 2018. Daerah aktif NOAA 12706 kemudian muncul cukup terang dari tepi Timur piringan Matahari (Gambar 2), dengan kelas *Hale* Beta, klasifikasi *McIntosh* Bxo, jumlah bintik 4, dan luasan area 20 *millionth* (per sejuta hemisfer / mh). Meskipun demikian, seperti yang terlihat pada Tabel 1, tidak ada kejadian baik *flare* maupun CME pada bulan April 2018.

Tidak jauh berbeda dari dua bulan sebelumnya, aktivitas Matahari pada awal bulan Mei 2018

Tabel 2 : Prediksi Bilangan Sunspot Bulanan Periode April 2018 - Mei 2018

Bulan	Prediksi Bilangan Sunspot
April 2018	6.81 ± 1
Mei 2018	5.99 ± 2
Juni 2018	5.58 ± 2
Juli 2018	5.5 ± 2
Agustus 2018	5.5 ± 3
September 2018	5.25 ± 3
Oktober 2018	4.84 ± 3
November 2018	4.51 ± 3
Desember 2018	4.27 ± 3
Januari 2019	3.2 ± 2
Februari 2019	3.12 ± 2
Maret 2019	4.19 ± 3
April 2019	5.83 ± 85

(metode filter Kalman adaptif pada metode McNish & Lincoln (WDC-SILSO, Royal Observatory of Belgium, Brussels)

Gambar 1 : Daerah aktif Matahari bulan Maret 2018: NOAA 12701 dan 12702. (Sumber: Pussainsa)

Gambar 2 : Kemunculan daerah Aktif NOAA 12706 pada tanggal 20 April 2018 (Sumber: solarmonitor)

Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang (6°54'10" S, 107°50'24" E)			
03 May 2018			
TIME (UT)	00:05		
WEATHER	Fine		
SEEING	4/5		
SCINTILLATION	4/5		
IMAGE	5/5		
P	- 23,78		
B ₀	- 3,99		
L ₀	177,88		
ΔL	0,05		
L	177,83		
JD	2458241,5		
SPOT	g	F	R
NORTH	0	0	0
SOUTH	0	0	0
TOTAL	0	0	0
NO	POSITION	CLASS	AREA
-	-	-	-
NOTE Experimental flare prediction: - % C, - % M, - % X			
OBSERVER: DASIMUN

Gambar 3 : Permukaan Matahari tanpa bintik hampir sepanjang bulan Mei 2018 (Sumber: BPAA LAPAN Sumedang)

Gambar 4 : CME halo parsial 3 Mei 2018 (Sumber: CACTUS)

masih rendah. Daerah aktif yang mendiami piringan Matahari hingga pertengahan bulan tersebut hanyalah NOAA 12708 dan 12709.

Meskipun tidak ada kejadian *flare* di awal bulan, pada tanggal 3 Mei 2018 pukul 17:00 UT terdapat peristiwa CME halo parsial dengan kecepatan 374 km/detik dan lebar sudut 128° (Gambar 4). CME terjadi di sekitar belahan timur Matahari dan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Bumi.

Aktivitas Matahari kemudian sedikit meningkat di pertengahan hingga akhir bulan Mei dengan kemunculan beberapa *flare* kelas B dan dua *flare* kelas C yaitu C2.3 pada tanggal 23 Mei 2018 dan C2.7 pada tanggal 27 Mei 2018 yang berasal dari NOAA 12712. ■

Gambar 5 : Kemunculan daerah aktif NOAA 12712 pada tanggal 23 Mei 2018 (Sumber: Solarham)

Aktivitas Geomagnet Maret – Mei 2018

Oleh :

M. Juangsih

C. E. Haryanto

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

Selama bulan Maret hingga Mei 2018 kondisi aktivitas geomagnet cukup beragam, mulai dari tenang, aktif, sampai kejadian badai lemah. Aktivitas geomagnet pada bulan Maret 2018 mengalami kondisi aktif sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 10, 16, dan 19 Maret 2018. Kondisi ini

terlihat dari nilai indeks K dari Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (BPAA) Sumedang yang mencapai 4. Indeks Dst terendah pada tanggal tersebut masing-masing mencapai -40, -39, dan -50 nT. Indeks Kp maksimum bernilai 4 pada tanggal 10 dan 16 Maret 2018.

Akan tetapi untuk tanggal 18 Maret 2018, indeks Kp maksimum bernilai 6. Peningkatan aktivitas geomagnet tersebut disebabkan oleh aliran plasma berkecepatan tinggi dari lubang korona yang geoeftif. Aktivitas *substorm* terbesar terjadi pada tanggal 18 Maret 2018 dengan intensitasnya maksimum mencapai sekitar 1700 nT.

Pada bulan April 2018, aktivitas geomagnet mengalami kondisi aktif dan badai lemah. Kondisi aktif terjadi pada tanggal 10 April 2018 dengan indeks Dst terendah mencapai -29 nT, indeks K

maksimum bernilai 4 dari BPAA Sumedang, dan indeks Kp maksimum juga bernilai 4. Kondisi badai lemah terjadi pada tanggal 20 April 2018 dengan indeks Dst terendah mencapai -69 nT, indeks K maksimum bernilai 5 dari BPAA Sumedang, dan indeks Kp maksimum bernilai 6. Peningkatan aktivitas geomagnet baik aktif maupun badai lemah ini disebabkan oleh aliran plasma berkecepatan tinggi dari lubang korona yang geoeftif. Ketika terjadi badai lemah, aktivitas *substorm* mulai aktif sejak 20 April yang dimulai sekitar pukul 02.00 UT, intensitas maksimum mencapai sekitar 1500 nT pada pukul 10.00 UT. Pada saat terjadi peningkatan aktivitas geomagnet, keadaan fluks elektron mengalami penurunan menjadi rendah kemudian naik sampai ke tingkat sangat tinggi.

Bulan Mei 2018, aktivitas geomagnet mengalami beberapa kali kejadian aktif berdasarkan K indeks yang diperoleh menggunakan data geomagnet dari stasiun kerjasama Pussainsa, LAPAN dengan BMKG di Kupang.. Kondisi aktif pertama terjadi pada tanggal 6 Mei 2018 dengan indeks K yang mencapai 4, indeks Dst terendah -57 nT, dan indeks Kp mencapai 6. Kondisi aktif kedua terjadi pada tanggal 9 Mei 2018 dengan indeks K yang mencapai 4, indeks Dst terendah -27 nT, dan indeks Kp mencapai 4. Kondisi aktif terakhir terjadi pada tanggal 11 Mei 2018 dengan indeks K yang mencapai 4, indeks Dst terendah -33 nT, dan indeks Kp mencapai 3. Semua kejadian aktif tersebut disebabkan oleh aliran plasma berkecepatan tinggi dari lubang korona yang memanjang di ekuator Matahari sehingga geoeftif untuk waktu cukup lama. Kejadian aktif ini seiring dengan peningkatan aktivitas *substorm* yang mencapai 1000 nT.

Semua gangguan geomagnet

Gambar 1 : Indeks Dst Maret 2018 (http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_realtime/201803/index.html)

Gambar 2 : Indeks K bulan Maret 2018 dari BPAA Sumedang

Gambar 3 : Indeks Dst bulan April 2018 (http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_realtime/201804/index.html)

Gambar 4: Indeks K bulan April 2018 BPAA Sumedang

sepanjang bulan Maret - Mei 2018 disebabkan oleh lontaran massa korona yang geoeftif. Lubang korona yang berada di ekuator Matahari dan cukup besar akan meloloskan partikel yang menyebabkan terganggunya magnetosfer beberapa hari kemudian. Sehingga kondisi geomagnet menjadi aktif ataupun badai lemah. ■

Gambar 5 : Indeks Dst bulan Mei 2018 (http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_realtime/201805/index.html)

Gambar 6 : Indeks K bulan Mei 2018 dari Stasiun Geofisika Kupang BMKG

Aktivitas Sintilasi Ionosfer di Atas Bandung dan Biak Maret – Mei 2018

Oleh :

S. Anggarani

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

Kejadian sintilasi ionosfer di Pusat Sains Antariksa diamati setiap harinya menggunakan perangkat *GPS Ionospheric Scintillation and TEC Monitoring (GISTM)*. Kejadian sintilasi ionosfer menggambarkan bahwa ada fenomena ketidakaturan yang terjadi di ionosfer berupa fluktuasi cepat dari amplitudo dan/atau fase sinyal satelit yang melalui ionosfer. Kondisi ini dapat mempengaruhi sinyal radio yang melewati ionosfer (*trans-ionospheric*) pada frekuensi hingga beberapa GHz sehingga mempunyai dampak yang merugikan pada komunikasi berbasis satelit dan sistem navigasi berbasis GPS. Untuk mengetahui kejadian sintilasi ionosfer, digunakan parameter berupa indeks S4 yang merupakan perbandingan standar deviasi intensitas

sinyal terhadap rata-rata intensitas sinyal tersebut. Indeks S4 ini bernilai 0 hingga 1 dan dikelompokkan menjadi beberapa skala seperti yang tertera pada Tabel 1. Dalam Tabel 1 juga terdapat informasi skala S4 yang diamati di atas Bandung pada periode Maret hingga Mei 2018.

Secara umum, pada bulan Maret hingga Mei kemunculan sintilasi ionosfer tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Sintilasi yang terjadi berkisar pada kondisi tenang dan rendah (*minor*). Gangguan sintilasi ionosfer pada skala minor selama 3 bulan tersebut mengalami penurunan. Dari bulan

Maret hingga Mei presentase kemunculan sintilasi ionosfer pada skala minor setiap bulannya berturut-turut adalah 23%, 10%, dan 0%. Pada bulan Mei keseluruhan sintilasi ionosfer berada pada kondisi tenang. Meskipun pada umumnya ketika berada pada bulan ekuinoks (sekitar 21-22 Maret) kemunculan sintilasi ionosfer cenderung lebih intens, tetapi pada periode ini tidak terjadi sintilasi yang cukup tinggi. Keadaan sintilasi yang tenang disebabkan oleh kondisi matahari pada periode ini mengalami aktivitas yang rendah. ■

Tabel 1 : Aktivitas Sintilasi Ionosfer Maret - Mei 2018

TAHUN	BULAN	TANGGAL																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2018	MARET																																
	APRIL																																
	MEI																																

Keterangan :

■	: QUIET	($S4 \leq 0,25$)
■	: MINOR	($S4 > 0,25$ dengan durasi < 10 menit)
■	: MODERATE	($0,25 < S4 \leq 0,5$ dengan durasi 10 menit - 1 jam)
■	: STRONG	($0,5 < S4 \leq 1$ dengan durasi 10 menit - 1 jam)
■	: SEVERE	($0,5 < S4 \leq 1$ dengan durasi 1 - 2 jam)
■	: EXTREME	($0,5 < S4 \leq 1$ dengan durasi 2 - 4 jam)
■	: NO DATA/DATA ERROR	

Koneksitas Jaringan ALE-LAPAN dan Indeks T Regional

Oleh :

A. S. Mardiani

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

Dari pengamatan jaringan komunikasi *Automatic Link Establishment* (ALE) sirkit komunikasi Watukosek – Bandung (jarak 571 km) selama bulan Maret 2018, frekuensi 7 MHz dan 10 MHz tercatat memiliki keberhasilan tinggi (lihat tabel 1). Untuk frekuensi 7 MHz, keberhasilan tinggi terjadi sekitar pukul 7.00 – 23.59 WIB dan pukul 00.00 WIB – 00.59 WIB sedangkan frekuensi 10 MHz tercatat memiliki keberhasilan tinggi pada pukul 10.00 – 19.59 WIB. Selama bulan April 2018, frekuensi 7 MHz memiliki keberhasilan tinggi pada pukul 6.00 – 20.59 WIB sedangkan frekuensi 10 MHz tercatat memiliki keberhasilan tinggi pada pukul 9.00 – 18.59 WIB. Pada bulan April ini frekuensi 14 MHz juga memiliki keberhasilan tinggi mulai pukul 11.00 – 15.59 dan keberhasilan rendah pada sore hari yaitu 16.00 – 17.59 WIB. Selama bulan Mei 2018, keberhasilan komunikasi pada frekuensi 7 MHz dan 10 MHz masih sama dengan bulan sebelumnya, namun penurunan keberhasilan komunikasi terjadi pada frekuensi 14 MHz dimana durasi keberhasilan komunikasi tinggi hanya mencapai 2 jam (pukul 12.00 – 13.59 WIB).

Untuk rekomendasi frekuensi terbaik dalam komunikasi HF, dapat dilihat pada buku prediksi edisi triwulan III tahun 2018 yang diterbitkan LAPAN. LAPAN juga melayani prediksi frekuensi komunikasi HF dengan sirkit yang lebih spesifik, sesuai permintaan pengguna. Tabel 4 memuat indeks T Regional Indonesia untuk bulan Juli 2018 – Juni 2019. ■

Tabel 1 : Keberhasilan komunikasi sirkit Watukosek - Bandung selama September - November 2017

SIRKUIT/FREKUENSI	WAKTU (WIB)																							
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
WATUKOSEK - BANDUNG																								
7.0495	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
7.102	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
10.1455	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
14.109	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
WATUKOSEK - BANDUNG																								
April 2018																								
7.0495	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
7.102	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
10.1455	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
14.109	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
WATUKOSEK - BANDUNG																								
Mei 2018																								
7.0495	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
7.102	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
10.1455	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
14.109	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆

Keterangan : ☆ Keberhasilan komunikasi tinggi
☆ Keberhasilan komunikasi rendah
☆ Keberhasilan tidak berhasil

Tabel 2 : Indeks T Regional Indonesia periode Juli 2018 - Juli 2019

INDEKS T Regional		
Th. 2018	JULI	6
	AGUSTUS	5
	SEPTEMBER	5
	OKTOBER	4
	NOVEMBER	4
	DESEMBER	3
Th. 2019	JANUARI	3
	FEBRUARI	3
	MARET	3
	APRIL	4
	MEI	4
	JUNI	5

Cuaca Antariksa

Oleh :

R. Kesumaningrum

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

Selama periode Maret - Mei 2018 Matahari berada pada fase minimum siklus 24. Aktivitas Matahari berada pada level erupatif dengan kejadian beberapa *flare* C selama bulan Februari dan menjadi tenang pada bulan April tanpa peristiwa *flare* kuat maupun lontaran massa korona (*Coronal Mass Ejection-CME*) yang signifikan. Selama periode ini permukaan Matahari lebih banyak mengalami hari-hari tanpa bintik. Daerah aktif yang muncul pun hanya berupa bintik yang sederhana dan berukuran kecil.

Pengamatan Matahari bulan Februari 2018 menunjukkan hanya ada dua daerah aktif yang muncul, yaitu NOAA 12699 dan 12700. Kondisi erupatif terjadi pada periode 6-12 Februari 2018 ketika terjadi 6 *flare* kelas C yang bersumber dari NOAA 12699. *Flare* terkuat

diklasifikasikan sebagai C8,1, terjadi tanggal 7 April 2018 dan tidak berasosiasi dengan CME yang mengarah ke Bumi.

Pada 12 Februari 2018 terjadi *flare* C1,5 berdurasi panjang pukul 00.15-03.21 UT yang menghasilkan CME cukup besar dengan lebar sudut 104 derajat dan kecepatan awal 425 km/det. CME tersebut mengarah ke Bumi kemudian bersama dengan angin Matahari yang berasal dari lubang korona tanggal 12 Februari 2018 (Gambar 2) mengakibatkan badai geomagnet di lintang tinggi sekitar tanggal 15-17 Februari 2018. Pada periode badai ini diamati adanya aurora di negara-negara pada lintang tinggi (Gambar 4).

Beberapa *flare* kelas C pada 6-12 Februari 2018 ini tidak menyebabkan gangguan di ionosfer

meskipun terjadi penurunan nilai frekuensi kritis lapisan F2 (f_oF2) selama 2 jam 15 menit pada 7 Februari, selama 2 jam pada 9 Februari, dan selama 30 menit pada 13 Februari 2018. Adanya penurunan nilai f_oF2 ini juga tidak menyebabkan gangguan *Short Wave Fadeout* (SWF) pada komunikasi radio.

Aktivitas Matahari bulan Maret 2018 umumnya tenang dengan banyak hari tanpa bintik. Kondisi menjadi erupatif pada akhir Maret ketika terjadi *flare* C4,6 pukul 07.57-08.08 UT tanggal 30 Maret 2018 yang berasosiasi dengan semburan tipe III dan II, diikuti oleh CME pada pukul 08.48 UT dengan

Gambar 2 : Daerah aktif NOAA 12699 yang menghasilkan 6 *flare* pada 6-12 Februari 2018 (atas) dan *flare* terkuat C8,1 tanggal 7 Februari 2018 yang terdeteksi pukul 13.31-13.54 UT, diamati oleh SDO/AIA pada panjang gelombang 171 Å (bawah). (Sumber: <https://solarmonitor.org>).

ISES Solar Cycle Sunspot Number Progression

Observed data through Apr 2018

Gambar 1 : Fase minimum siklus Matahari 24 (lingkaran hijau). (Sumber: <https://www.swpc.noaa.gov>)

Gambar 3 : Flare C1,5 berdurasi lebih dari 3 jam tanggal 12 Februari 2018 dari daerah aktif NOAA 12699 pada panjang gelombang 304 Å (atas), yang memicu CME geoeftif (tengah), dan lubang korona tanggal 13 Februari 2018 (bawah) yang mengalirkan arus plasma dan dibawa angin Matahari ke arah Bumi, menyebabkan terjadinya badai geomagnet di lintang tinggi pada 17- 19 Februari 2018. (Sumber : <https://sdo.gsfc.nasa.gov>, <http://sidc.oma.be/cactus/catalog.php>, dan <http://spaceweather.com>)

Gambar 4 : Aurora yang terlihat dari Swedia ketika badai geomagnet tanggal 15-17 Februari 2018.

Gambar 5 : Atas: CME yang berasosiasi dengan flare C4,6 tanggal 30 Maret 2018 di atas daerah aktif NOAA 12703. Bawah: Flare C4,6 di atas daerah aktif NOAA 12703, diamati SDO/AIA pada panjang gelombang 193 Å. (Sumber: <http://sidc.oma.be/cactus/catalog> / dan <https://sdo.gsfc.nasa.gov/>).

Gambar 6 : Pengamatan SDO/AIA pada panjang gelombang 193 Å yang menunjukkan lubang korona geoeftif pada tanggal 8 (atas), 14 (tengah), dan 16 Maret 2018 (bawah) yang menyebabkan badai geomagnet pada tanggal 10, 16, dan 18 Maret 2018 (Sumber: <http://spaceweather.com>).

kecepatan 343 km/det dan lebar sudut 46 derajat. CME berada pada posisi tidak geoeftif di timur piringan Matahari sehingga tidak menyebabkan adanya gangguan di lingkungan Bumi. *Flare* berasal dari daerah aktif NOAA 12703 yang baru terlihat bintiknya pada 31 Maret 2018, merupakan satu-satunya daerah aktif yang muncul di permukaan Matahari pada bulan ini.

Adapun pada Maret 2018, lubang korona geoeftif (Gambar 6) meningkatkan aliran plasma angin Matahari dan mengakibatkan kondisi aktif pada aktivitas geomagnet yaitu pada tanggal 10, 16, dan 18 Maret 2018. Indeks Dst terendah pada tanggal tersebut masing-masing mencapai -40, -39, dan -50 nT. Sementara ionosfer berada pada kondisi tenang untuk periode ini.

Aktivitas matahari kembali ke level tenang selama bulan April, ditandai oleh tidak adanya deteksi erupsi *flare*. Dari pengamatan SOHO/LASCO tercatat beberapa semburan dari korona Matahari dengan lebar sudut kecil dan kecepatan rendah yang tidak signifikan. Pada umumnya pengamatan fotosfer Matahari menunjukkan permukaan tanpa bintik, dengan kemunculan empat daerah aktif berukuran sangat kecil dan sederhana yaitu NOAA 12703, 12704, 12706, dan 12707. Tidak

tercatat adanya aktivitas eruptif yang berasal dari daerah aktif tersebut.

Berlawanan dengan kondisi tenang di Matahari, adanya lubang korona geoeftif menyebabkan badai geomagnet terutama pada 20 April 2018 (Gambar 7).

Peningkatan aktivitas geomagnet baik aktif maupun badai lemah ini disebabkan oleh aliran angin Matahari berkecepatan tinggi dari lubang korona yang geoeftif. Aktivitas *substorm* terjadi ketika badai lemah, dan pada saat terjadi peningkatan aktivitas geomagnet, keadaan fluks elektron mengalami penurunan menjadi rendah kemudian naik sampai ke tingkat sangat tinggi.

Badai menengah yang diakibatkan oleh lubang korona juga terjadi pada tanggal 6 Mei 2018 dengan nilai Dst minimum mencapai -57 nT. Badai ini ditandai

oleh adanya *shock* atau peningkatan nilai Dst yang diikuti oleh turunnya nilai Dst hingga ke level badai menengah.

Aktivitas Matahari tenang masih berlanjut hingga Mei 2018. Kondisi menjadi eruptif pada tanggal 23 dan 24 Mei 2018 masing-masing dengan adanya *flare* C2,0 dan C2,7 dari NOAA 12712. Daerah aktif ini mulai tercatat di permukaan Matahari pada 25 Mei 2018 dan telah melepaskan *flare* ketika masih berada di balik tepi timur piringan Matahari. NOAA 12712 berukuran kecil dengan kelas magnetik sederhana, beta, dan melepaskan banyak *flare* kelas B selama kemunculannya di piringan Matahari. Berdasarkan kondisi Matahari yang berada pada fase minimum, maka kondisi cuaca antariksa pada periode berikutnya diperkirakan lebih didominasi oleh adanya lubang korona geoeftif. ■

Gambar 7 : Penurunan indeks Dst mencapai -69 nT pada tanggal 20 April 2018 yang diakibatkan oleh adanya lubang korona geoeftif. (Sumber: http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_realtime/index.html)

Gambar 8 : Penurunan indeks Dst hingga -57 nT pada tanggal 6 Mei 2018 (atas) yang diakibatkan oleh aliran angin Matahari dari lubang korona geoeftif (bawah). (Sumber: http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_realtime/index.html dan <https://www.spaceweather.com>)

Festival *Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics* (STEAM) 2018

Oleh :

M. Ferdhiansyah

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

Pada tanggal 1 Mei 2018 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, LAPAN bekerja sama dengan Yayasan Ganesha ITB '83, Universitas Nusa Cendana (Undana), Observatorium Bosscha ITB, dan UNawe Indonesia mengadakan Festival *Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics* (STEAM), dimulai dari pukul 08.00 – 16.00 WITA di Pusat Sains Center LAPAN, Tilong, Kabupaten Kupang.

Dalam sambutannya Kepala Pusat Sains Antariksa LAPAN, Dra. Clara Y Yatini, M.Sc menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kupang atas dukungannya sehingga terlaksananya kegiatan Festival

STEAM 2018. Ibu Clara berharap dengan adanya kegiatan ini masyarakat Kupang dapat lebih tertarik mempelajari sains khususnya tentang astronomi.

Plt. Kepala Dinas Kabupaten Kupang, Joni Nomeso secara resmi membuka Festival STEAM 2018 menggantikan Bupati Kupang yang berhalangan datang, dalam sambutannya beliau mengatakan, “Kami siap memberikan dukungan ke LAPAN secara administratif dan infrastruktur dalam pembangunan Observatorium Nasional Timau.

Antusiasme dan semangat para generasi muda pada kegiatan ini terlihat saat mereka mengunjungi tenda LAPAN yang menampilkan

planetarium mini dan teleskop Matahari. Tidak hanya itu, LAPAN juga mengenalkan satelit LAPAN-A2/ORARI, satelit LAPAN-A3/IPB, Sistem Embaran Maritim (SEMAR), Roket RX1220, Pesawat Transport Nasional N219 Nurtanio, UAV LSU-02 dan infografis mengenai pembangunan observatorium nasional terbesar se-Asia Tenggara yang akan dibangun di Timau, Nusa Tenggara Timur.

Pada kegiatan ini LAPAN memberikan pembekalan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi generasi muda dalam rangka menggapai kemandirian teknologi di Indonesia khususnya generasi muda Kupang. ■

Planetarium Mini Pussainsa LAPAN Meramaikan Indonesia Science Day 2018

Oleh :

M. Ferdhiansyah

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

Pada tanggal 20-22 April 2018, Pusat Sains Antariksa LAPAN ikut serta dalam meramaikan Indonesia Science Day 2018 yang diselenggarakan di Pusat Peragaan Iptek (PP-IPTEK), Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Acara yang diselenggarakan dalam rangka merayakan ulang tahun TMII tersebut diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke TMII dan sekaligus dapat mempopulerkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas. Dalam kesempatan itu, Pussainsa LAPAN menghadirkan planetarium mini untuk memberikan edukasi keantariiksaan kepada masyarakat.

Indonesia Science Day 2018 dibuka oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak. Acara ini menghadirkan berbagai produk hasil riset, baik dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, BUMN, maupun perusahaan swasta yang aktif terlibat dalam pengembangan teknologi di Indonesia.

Planetarium mini Pussainsa LAPAN merupakan kegiatan edukasi publik yang selalu menarik perhatian pengunjung sehingga diangkat menjadi salah satu ikon kunjungan di Indonesia Science Day 2018. Pada acara tersebut,

planetarium mini Pussainsa LAPAN menjadi salah satu magnet yang bisa menyedot perhatian pengunjung, tidak hanya dari dalam, tetapi juga dari luar negeri. Materi edukasi yang disampaikan melalui planetarium mini Pussainsa LAPAN diharapkan dapat memberikan wawasan dan inspirasi keantariiksaan kepada masyarakat luas. ■

KALENDER astronomi

Juli - Agustus 2018

Oleh :

A. G. Admiranto

Pusat Sains Antariksa - LAPAN

12 Juli – Merkurius di Elongasi Timur Maksimum.

Planet Merkurius mencapai elongasi timur maksimum dari Matahari dengan sudut sebesar 26,4 derajat. Saat ini adalah saat terbaik untuk mengamati Merkurius karena ia akan berada di titik tertingginya di atas cakrawala langit senja. Carilah planet ini di langit bagian barat dekat cakrawala beberapa saat setelah Matahari terbenam.

27 Juli – Bulan Purnama.

Bulan dan Matahari berada di bagian langit yang berlawanan bila dilihat dari Bumi dan seluruh permukaannya akan disinari cahaya Matahari. Fase ini terjadi pada pukul 03:22 WIB. Penduduk asli Amerika Serikat menjuluki Bulan purnama ini sebagai *Full Buck Moon* karena kijang jantan akan mulai tumbuh tanduknya di sekitar waktu ini. Bulan purnama ini juga dikenal sebagai *Full Thunder Moon* dan *Full Hay Moon*.

27 Juli – Oposisi Mars.

Si planet merah akan berada pada posisi terdekatnya dengan Bumi dan seluruh permukaannya akan seluruhnya disinari cahaya Matahari. Saat itu ia berada dalam keadaan paling terang dan berada di atas cakrawala sepanjang malam. Saat ini adalah saat terbaik untuk mengamati dan memotret. Dengan menggunakan sebuah teleskop kelas menengah Anda bisa melihat bagian-bagian gelap yang terdapat di permukaan Mars yang berwarna jingga.

28-29 Juli – Hujan Meteor Delta Aquarids.

Hujan meteor Delta Aquarids adalah hujan meteor dengan intensitas di atas rata-rata dan mampu menghasilkan lebih dari 20 meteor perjamnya pada saat puncak.. Hujan meteor ini berasal dari partikel-partikel debu yang ditinggalkan komet Marsden dan Kracht. Hujan meteor ini muncul setiap tahunnya dari 12 Juli sampai 23 Agustus. Puncaknya dalam tahun ini terjadi pada malam tanggal 28 Juli sampai dinihari tanggal 29 Juli. Bulan yang menuju purnama membuat meteor yang lemah menjadi sulit teramati, tetapi jika Anda cukup sabar, meteor yang cukup terang akan tampak, dan akan mudah teramati dari tempat yang cukup gelap. Radiant meteor adalah konstelasi Aquarius, tetapi bisa muncul dari mana saja di langit.

J U L I

A G U S T U S

13 Juli – Bulan Baru.

Bulan dan Matahari berada di bagian langit yang sama bila dilihat dari Bumi dan tidak kelihatan di malam hari. Fase ini terjadi pada pukul 09:48 WIB. Ini adalah saat terbaik untuk mengamati obyek-obyek yang lemah seperti galaksi-galaksi dan gugus-gugus bintang karena tidak ada gangguan cahaya Bulan.

13 Juli – Gerhana Matahari sebagian.

Gerhana Matahari sebagian terjadi ketika Bulan menutupi sebagian piringan Matahari, mirip sebuah biskuit yang dipotong sedikit. Gerhana Matahari sebagian hanya bisa diamati dengan aman menggunakan penyaring cahaya Matahari khusus atau dengan melihat pantulan cahaya Matahari ini. Gerhana Matahari parsial ini hanya bisa dilihat di Australia paling selatan dan Antarktika.

11 Agustus – Bulan Baru.

Bulan dan Matahari berada di bagian langit yang sama bila dilihat dari Bumi dan tidak kelihatan di malam hari. Fase ini terjadi pada pukul 16:48 WIB. Ini adalah saat terbaik untuk mengamati obyek-obyek yang lemah seperti galaksi-galaksi dan gugus-gugus bintang karena tidak ada gangguan cahaya Bulan.

27 Juli – Gerhana Bulan Total.

Sebuah gerhana Bulan total berlangsung ketika Bulan seluruhnya melewati bayangan atau umbra Bumi. Pada saat ini secara perlahan-lahan Bulan akan tampak makin gelap dan menjadi berwarna merah darah. Gerhana ini akan tampak dari sebagian besar Eropa, Afrika, Asia Barat dan Tengah, Samudera Hindia, dan Australia Barat.

26 Agustus – Merkurius di Elongasi Barat Maksimum.

Planet Merkurius mencapai elongasi barat maksimum dari Matahari dengan sudut sebesar 18,3 derajat. Saat ini adalah saat terbaik untuk mengamati Venus karena ia akan berada di titik tertingginya di atas cakrawala langit fajar. Carilah planet terang ini di langit bagian timur dekat cakrawala sebelum Matahari terbit.

26 Agustus – Bulan Purnama.

Bulan dan Matahari berada di bagian langit yang berlawanan bila dilihat dari Bumi dan seluruh permukaannya akan disinari cahaya Matahari. Fase ini terjadi pada pukul 18:57 WIB. Penduduk asli Amerika Serikat menjuluki Bulan purnama ini sebagai *Full Sturgeon Moon* karena iken-ikan sturgeon di Danau-Danau Besar Amerika Serikat mudah sekali ditangkap pada tanggal ini. Bulan purnama ini dikenal juga dengan nama *Green Corn Moon* dan *Grain Moon*.

12-13 Agustus – Hujan Meteor Perseids.

Hujan meteor Perseids adalah salah satu hujan meteor terbaik yang bisa diamati yang mampu mencapai 60 meteor perjamnya pada saat puncak.. Hujan meteor ini berasal dari partikel-partikel debu yang ditinggalkan komet Swift-Tuttle yang ditemukan pada tahun 1862. Hujan meteor ini muncul setiap tahunnya dari 17 Juli sampai 24 Agustus. Puncaknya dalam tahun ini terjadi pada malam tanggal 12 Agustus sampai dinihari tanggal 13 Agustus. Bulan sabit tipis akan tenggelam di awal senja sehingga langit akan cukup gelap sehingga kita bisa menikmati pemandangan yang sangat indah. Radiant meteor adalah konstelasi Perseus, tetapi bisa muncul dari mana saja di langit.

9 September – Bulan Baru.

Bulan dan Matahari berada di bagian langit yang sama bila dilihat dari Bumi dan tidak kelihatan di malam hari. Fase ini terjadi pada pukul 01:01 WIB. Ini adalah saat terbaik untuk mengamati obyek-obyek yang lemah seperti galaksi-galaksi dan gugus-gugus bintang karena tidak ada gangguan cahaya Bulan.

23 September – Ekuinoks September.

Ekuinoks September berlangsung pada pukul 08:54 WIB. Cahaya Matahari akan jatuh langsung di ekuator dan panjang siang dan malam akan sama di seluruh dunia. Ini adalah hari pertama musim gugur (*autumnal equinox*) di belahan Bumi utara dan hari pertama musim semi (*vernal equinox*) di belahan Bumi selatan.

25 September – Bulan Purnama.

Bulan dan Matahari berada di bagian langit yang berlawanan bila dilihat dari Bumi dan seluruh permukaannya akan disinari cahaya Matahari. Fase ini terjadi pada pukul 19:53 WIB. Penduduk asli Amerika Serikat menjuluki Bulan purnama ini sebagai *Full Corn Moon* karena mereka memanen jagung di sekitar waktu ini. Bulan pada saat ini juga dikenal sebagai *harvest moon*, yaitu Bulan purnama yang waktunya paling dekat dengan ekuinoks Bulan September.

S E P T E M B E R

11 Agustus – Gerhana Matahari Sebagian.

Gerhana Matahari sebagian terjadi ketika Bulan menutupi sebagian piringan Matahari, mirip sebuah biskuit yang dipotong sedikit. Gerhana Matahari sebagian hanya bisa diamati dengan aman menggunakan penyaring cahaya Matahari khusus atau dengan melihat pantulan cahaya Matahari ini. Gerhana Matahari sebagian ini hanya bisa dilihat di Kanada timur laut, Tanah Hijau, Eropa utara paling utara, serta Asia utara dan timur. Gerhana ini paling bagus diamati di Rusia utara di mana 68% piringan Matahari akan tertutupi oleh Bulan.

7 September – Oposisi Neptunus.

Planet raksasa biru ini akan berada pada posisi terdekatnya dengan Bumi dan seluruh permukaannya akan seluruhnya disinari cahaya Matahari. Saat itu ia berada dalam keadaan paling terang dan berada di atas cakrawala sepanjang malam. Saat ini adalah saat terbaik untuk mengamati dan memotret Neptunus. Karena jaraknya yang sangat jauh dari Bumi, jika tidak menggunakan teleskop yang sangat kuat planet ini hanya akan tampak sebagai sebuah titik biru kecil.

17 Agustus – Venus di Elongasi Timur Maksimum.

Planet Venus mencapai elongasi timur maksimum dari Matahari dengan sudut sebesar 45,9 derajat. Saat ini adalah saat terbaik untuk mengamati Venus karena ia akan berada di titik tertingginya di atas cakrawala langit senja. Carilah planet terang ini di langit bagian barat setelah Matahari terbenam.

25 September – Bulan Purnama.

Bulan dan Matahari berada di bagian langit yang berlawanan bila dilihat dari Bumi dan seluruh permukaannya akan disinari cahaya Matahari. Fase ini terjadi pada pukul 19:53 WIB. Penduduk asli Amerika Serikat menjuluki Bulan purnama ini sebagai *Full Corn Moon* karena mereka memanen jagung di sekitar waktu ini. Bulan pada saat ini juga dikenal sebagai *harvest moon*, yaitu Bulan purnama yang waktunya paling dekat dengan ekuinoks Bulan September.

TEKA TEKI SILANG

Vol.7 / No.3 Juli - September 2018

Oleh :
V. Dear
Pusat Sains Antariksa - LAPAN

Menurun

- 1 Penjalaran
- 2 Variasi kemunculan Spread-F
- 3 Serikat Astronomi Internasional
- 4 Lensa yang memiliki sifat mengumpulkan berkas cahaya
- 5 Mekanisme fisis terjadinya Spread-F
- 6 Dampak peristiwa Plasma Buble terhadap propagasi gelombang radio
- 7 Proses terurainya lapisan ionosfer
- 8 Atom yang mempengaruhi warna Aurora
- 11 Dampak peristiwa Plasma Buble terhadap sistem navigasi satelit
- 13 Jenis Transient Luminous Events
- 14 Penggabungan lensa cembung dan cekung
- 16 Jenis TLE yang dipicu oleh sambaran petir dari awan positif
- 18 Polar Lights

Jawaban TTS

Vol.7 / No.2 April - Juni 2018

Mendatar

- 6 Tipe Spread-F yang menunjukkan sebaran jejak ionogram secara horisontal
- 9 Fase pada aurora yang terjadi selama 10 hingga 30 menit
- 10 Peristiwa cuaca antariksa yang terkait dengan fenomena Aurora
- 12 Lensa yang memiliki sifat menyebarkan berkas cahaya
- 15 Peristiwa pada lapisan ionosfer yang diduga terjadi setelah Tsunami
- 17 Spread F yang pembentukannya juga dipengaruhi fenomena atmosfer netral
- 19 Lokasi terjadinya gempa bumi dipermukaan bumi
- 20 Tipe Spread-F yang menunjukkan sebaran jejak ionogram secara vertikal
- 21 Fenomena optik yang terkait dengan cuaca antariksa

Gunting dan Kirimkan Jawaban Anda melalui POS ke alamat :

Redaksi Buletin Cuaca Antariksa
Pusat Sains Antariksa - LAPAN

Jl. Dr Djunjuran 133, Bandung 40173

atau melalui faksimili 022-6014 998 / 6038 005

Jawaban kami terima paling lambat tanggal 15 Mei 2018

Disediakan 3 hadiah menarik untuk pengirim dengan jawaban yang benar. Nama pemenang diumumkan pada Buletin Cuaca Antariksa edisi Januari - Maret 2018

ISSN 2303-2707

9 772303 270008