Pentingnya Tindakan Precaution Oleh Perawat Dalam Rangka Mengurangi Risiko Penyebaran Infeksi Di Rumah Sakit

Fitri Rahmadani Siregar

danisiregar1001@gmail.com

Latar Belakang

Kegiatan pencegahan penularan infeksi di rumah sakit melibatkan semua petugas kesehatan yang berada di lingkungan rumah sakit termasuk perawat. Perawat adalah petugas kesehatan yang paling sering berhubungan dengan pasien, sehingga dari semua petugas kesehatan perawatlah yang paling beresiko terpapar infeksi berbagai penyakit. Seperti pernyataan Efsthio yang dikutip dalam Sahara (2011) mengatakan bahwa, secara global lebih dari tiga puluh lima juta petugas kesehatan beresiko terpajan infeksi penyakit dan setelah diobservasi diantara semua petugas kesehatan tersebut yang paling tinggi risiko terpajan infeksi adalah perawat.

Dasar tindakan universal precaution ini meliputi mencuci tangan guna mencegah infeksi silang, pemakaian alat pelindung diri diantaranya sarung tangan untuk mencegah kontak dengan darah serta cairan infeksius lain, pengelolaan alat kesehatan, pengelolaan jarum dan alat tajam untuk mencegah perlukaan, serta pengelolaan limbah (Depkes RI dalam Syahrizal, dkk, 2014). Dalam menggunakan prinsip universal precaution, petugas kesehatan memberi perlakuan yang sama pada semua pasien tanpa memandang penyakit atau diagnosanya, yaitu dengan asumsi bahwa setiap pasien memiliki resiko untuk menularkan penyakit yang berbahaya. Petugas harus memiliki pengetahuan yang baik tentang pencegahan transmisi infeksi, bersikap dan bertindak yang benar dalam melakukan setiap tindakan. Hal ini sangat perlu di perhatikan karena setiap individu yang bekerja di lingkungan rumah sakit maupun pusat pelayanan kesehatan lainnya merupakan kelompok orang yang sangat rawan untuk tertular atau menularkan infeksi (Spiritia dalam Syahrizal, dkk, 2014).

Untuk melindungi perawat dan pasien dari resiko tertular penyakit infeksi tersebut maka dalam melaksanakan tindakan keperawatan, perawat harus selalu memperhatikan metode Universal Precaution (Kewaspadaan Universal) yang telah ditetapkan oleh Centers For Disease Control And Prevention (CDC) pada tahun 1988 di Amerika Serikat (Kirkland dalam Syahrizal, dkk, 2014). Menurut Kusmiyati (2009), faktor yang mempengaruhi rendahnya

perilaku perawat dalam tindakan universal precautions yaitu : Pengetahuan, sikap, ketersediaan sarana alat pelindung diri dan motivasi perawat. Ketidak patuhan atau keengganan petugas untuk melakukan prosedur universal precautions adalah karena dianggap terlalu merepotkan dan tidak nyaman. Tugas perawat yang sangat banyak juga menjadi faktor lain menyebabkan perawat sulit untuk menerapkan universal precautions.

Terjadinya infeksi nosokomial di pengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor yang ada didalam diri (badan/tubuh) penderita sendiri maupun faktor yang ada disekitarnya. Selain itu ada faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya infeksi nosokomial yaitu faktor instrinsik yang meliputi umur, jenis kelamin, dan dari faktor keperawatan yang meliputi lamanya hari rawatan, menurunnya standar perawat dan banyaknya penderita, kondisi umum, resiko terapi, adanya penyakit lain serta faktor mikroba patogen juga memberi kontribusi terhadap terjadinya infeksi nosokomial disuatu rumah sakit (Darmadi,2008).

Metode

Pada pengkajian ini digunakan metode kualitatif, yang dimana metode ini lebih cenderung bersifat memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis berdasarkan landasan teori dan juga dengan metode membaca dan literasi data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, ebook, artikel ilmiah, dan karya tulis ilmiah yang berfokus pada pentingnya tindakan precaution oleh perawat dalam rangka mengurangi risiko penyebaran infeksi di Rumah Sakit. Metode dari penulisan ini juga dilakukan untuk menjelaskan lebih mendalam terkait tindakan precaution seorang perawat di lingkungan kerja seperti rumah sakit saat melakukan tindakan keperawatan.

Hasil

Hasil dari pengkajian menggunakan metode penulisan kualitatif adalah menghasilkan suatu pembelajaran tentang pentingnya tindakan precaution oleh petugas kesehatan yang paling sering berhubungan dengan pasien terutama seorang perawat dalam rangka mengurangi risiko penyebaran infeksi di Rumah Sakit melalui pengumpulan data berdasarkan buku teks, jurnal atau karya tulis ilmiah.

Setiap tahun ratusan juta pasien di seluruh dunia terjangkit infeksi terkait perawatan kesehatan. Hal ini signifikan mengarah pada fisik dan psikologis dan kadang-kadang mengakibatkan kematian pada pasien dan kerugian keuangan bagi sistem kesehatan. Lebih dari setengah infeksi ini dapat dicegah dengan perawat benar-benar membersihkan tangan

mereka pada saat-saat penting dalam perawatan pasien. Infeksi terkait perawatan kesehatan biasanya terjadi ketika kuman yang di transfer oleh tangan penyedia layanan kesehatan menyentuh pasien (WHO, 2013). Penyebaran infeksi rumah sakit di rumah sakit umumnya terjadi melalui tiga cara yaitu melalui udara, percikan dan kontak langsung dengan pasien. Hal ini dapat dicegah melalui perilaku cuci tangan (hand hygiene) petugas kesehatan di rumah sakit.

Infeksi yang diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan adalah salah satu penyebab utama kematian dan peningkatan morbiditas pada pasien. Mengingat asal mula infeksi yang tidak hanya didapatkan di rumah sakit, istilah infeksi nosokomial diperluas dengan istilah Healthcare-Associated Infections (HAIs). Prevalensi HAIs diperkirakan 1,4 juta di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan 50.000 kematian yang disebabkan dan 2 juta morbiditas disebabkan oleh HAIs di negara-negara maju setiap tahunnya, serta menghasilkan tambahan 14 hari tinggal di rumah sakit dan tambahan biaya tahunan kesehatan.

Prosedur tindakan pencegahan universal precaution mutlak harus diterapkan di semua pusat pelayanan kesehatan, seperti ruang gawat darurat, ruang tindakan, ruang triase, ruang observasi dan laboratorium. Berbagai prosedur tindakan keperawatan, baik tindakan invasif maupun non invasif memungkinkan perawat terpapar dengan kuman yang berasal dari pasien melalui cairan tubuh yang mengandung darah. Semua perawat harus menerapkan prosedur tindakan pencegahan universal yang tepat dan konsisten pada setiap saat menjalankan tindakan keperawatan terhadap semua pasien.

Pembahasan

Rumah sakit merupakan salah satu tempat pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama untuk masyarakat yang sedang sakit. Tujuan utama rumah sakit adalah memberikan pelayanan berkualitas demi tercapainya kepuasan pasien yang ditandai dengan berkurangnya keluhan dari pasien, sehingga menunjukkan kinerja perusahaan yang tinggi. Pelayanan rumah sakit saat ini tidak saja bersifat kuratif (penyembuhan) tetapi juga pemulihan rehabilitatif). Oleh karena itu, harapan utama masyarakat datang ke rumah sakit adalah untuk mencapai keseimbangan dan kesehatan. (Juwita dalam Hayulita dan Pija, 2014). Tingginya angka kejadian infeksi nosokomial dapat menyebabkan turunnya kualitas mutu pelayanan medis, sehingga perlu adanya pencegahan dan pengendalian (Darmadi, 2008). Salah satu strategi yang sudah terbukti bermanfaat dalam upaya pengendalian infeksi nosokomial adalah dengan meningkatkan kemampuan petugas kesehatan dalam menjalankan

metode universal precaution atau yang dalam istilah Indonesia dikenal dengan kewaspadaan universal (Yulianti, dkk, 2011).

Mutu pelayanan sebuah rumah sakit dapat dinilai melalui berbagai indikator, salah satunya melalui upaya rumah sakit terhadap pencegahan dan pengendalian infeksi. Kejadian infeksi nosokomial, atau yang biasa disebut HAIs, menyebabkan mutu pelayanan rumah sakit tidak optimal, sehingga diperlukan tindakan yang tepat untuk mencegah ataupun mengurangi angka kejadian infeksi nosokomial (Zulkarnain, 2018). Perawat dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kompeten dibidangnya karena resiko pekerjaan perawat menyangkut kesehatan dan keselamatan pasien selaku penerima pelayanan kesehatan. Salah satu resiko serius yang dihadapi perawat dalam menjalankan tugasnya adalah tertular atau menularkan penyakit Infeksi (Sahara, 2011).

a. Kebersihan Tangan/Hand hygiene

Menurut Linda dkk.(2010), menyebutkan bahwa kesehatan dan kebersihantangan secara bermakna mengurangi jumlah mikroorganisme penyebab penyakit pada kedua tangan dan lengan serta meminimalisasi kontaminasi silang (misalnya dari petugas kesehatan ke pasien). Kegagalan untuk melakukan kebersihan dan kesehatan tangan yang tepat dianggap sebagai sebab utama infeksi nosokomial yang menular di pelayanan kesehatan dan menyebarkan mikroorganisme multiresisten dan telah diakui sebagai kontributor yang penting terhadap timbulnya wabah.

Menurut Hidayat (2005) mencuci tangan bertujuan untuk: mencegah terjadinya infeksi melalui tangan dan membantu menghilangkan mikroorganisme yang ada di kulit atau tangan. Banyak penyakit yang ditularkan melalui tangan karena tangan merupakan salah satu faktor penularan berbagai jenis penyakit menular, seperti infeksi saluran pernafasan, penyakit kulit, penyakit untuk gangguan pencernaan (diare, muntah) dan berbagai penyakit lainnya yang dapat berpotensi membawa kearah kematian.

Hand hygiene menjadi salah satu langkah yang efektif untuk memutuskan rantai transmisi infeksi, sehingga insidensi nosokomial dapat berkurang. Pencegahan dan pengendalian infeksi wajib dilakukan oleh perawat, dokter dan seluruh orang yang terlibat dalam perawatan pasien (Fauziah & Rachmawati, 2018). Hasibuan (2012) menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati semua peraturan dan norma-norma yang berlaku. Kepatuhan yang baik

mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Tenaga kesehatan khususnya perawat merupakan salah satu tenaga di rumah sakit yang secara langsung berinteraksi dengan pasien. Kepatuhan mencuci tangan perawat merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan perawat dan pasien dalam pencegahan terjadinya HAIs. Kegagalan untuk melakukan kebersihan tangan dan kesehatan tangan yang tepat dianggap sebagai sebab utama terjadinya infeksi rumah sakit.

b. Penggunaan APD

APD terdiri dari sarung tangan, masker/Respirator Partikulat, pelindung mata (goggle), perisai/pelindung wajah, kap penutup kepala, gaun pelindung/apron, sandal/sepatu tertutup (Sepatu Boot) yang perlu digunakan perawat atau dokter saat berhadapan dengan pasien yang memungkinkan dapat terjadinya penularan. Tujuan Pemakaian APD adalah sebagai melindungi kulit dan membran mukosa dari resiko paparan darah, cairan tubuh, sekret, ekskreta, kulit yang tidak utuh dan selaput lendir dari pasien ke petugas dan sebaliknya. Indikasi penggunaan APD adalah jika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau kemungkinan pasien terkontaminasi dari perawat atau dokter.

c. Kebersihan Peralatan Perawatan

peralatan perawatan pasien dilakukan penatalaksanaan peralatan bekas pakai perawatan pasien yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh (pre-cleaning, cleaning, disinfeksi, dan sterilisasi) sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) sebagai berikut:

- Rendam peralatan bekas pakai dalam air dan detergen atau enzyme lalu dibersihkan dengan menggunakan spons sebelum dilakukan disinfeksi tingkat tinggi (DTT) atau sterilisasi.
- Peralatan yang telah dipakai untuk pasien infeksius harus didekontaminasi terlebih dulu sebelum digunakan untuk pasien lainnya.
- Pastikan peralatan sekali pakai dibuang dan dimusnahkan sesuai prinsip pembuangan sampah dan limbah yang benar. Hal ini juga berlaku untuk alat yang dipakai berulang, jika akan dibuang.

- Untuk alat bekas pakai yang akan di pakai ulang, setelah dibersihkan dengan menggunakan spons, di DTT dengan klorin 0,5% selama 10 menit.
- Peralatan nonkritikal yang terkontaminasi, dapat didisinfeksi menggunakan alkohol 70%. Peralatan semikritikal didisinfeksi atau disterilisasi, sedangkan peralatan kritikal harus didisinfeksi dan disterilisasi.
- Untuk peralatan yang besar seperti USG dan X-Ray, dapat didekontaminasi permukaannya setelah digunakan di ruangan isolasi.

d. Pengelolaan Limbah

Fasilitas pelayanan kesehatan harus mampu melakukan minimalisasi limbah yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dengan cara mengurangi bahan (reduce), menggunakan kembali limbah (reuse) dan daur ulang limbah (recycle). Tujuan pengelolaan limbah ini adalah sebagai melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan dari penyebaran infeksi dan membuang bahan-bahan berbahaya (sitotoksik, radioaktif, gas, limbah infeksius, limbah kimiawi dan farmasi dengan aman. Proses pengelolaan limbah dimulai dari identifikasi, pemisahan, labeling, pengangkutan, penyimpanan hingga pembuangan/pemusnahan.

Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, maka diperlukan pelayanan kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan adalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu sarana pelayanan kesehatan yang strategis dan terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan mutu fasilitas kesehatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan bidang kesehatan. Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan diperlukan tenaga kesehatan yang berkualitas, karena tenaga kesehatan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan yang berkualitas tidak hanya memiliki etika dan moral yang tinggi tetapi juga upaya untuk meningkatkan keahliannya secara terus menerus melalui peningkatan pendidikan salah satunya. Pendidikan yang tinggi diharapkan mampu membuat tenaga kesehatan berperilaku positif dalam memahami dan melaksanakan prosedur universal precaution, selain ditunjang oleh sarana dan prasarana, serta Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur langkah langkah tindakan universal precaution.

Penutup

Dapat diketahui bahwa dengan melakukan tindakan precaution atau tindakan pengendalian infeksi sederhana yang digunakan oleh seluruh petugas kesehatan terutama perawat seperti kebersihan tangan/Hand Hygiene, penggunaan APD dengan benar, kebersihan peralatan perawatan pasien, dan pengelolaan limbah dari fasilitas pelayanan yang apabila diterapkan oleh petugas di setiap pelayanan kesehatan maka akan mencegah atau mengurangi terjadi infeksi nosokomial atau HAIs. Tindakan precaution ini juga tidak lepas dari peran masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya seperti pelaksana pelayanan dan para pengguna jasa, yaitu pasien dan pengunjungnya. Untuk dapat bekerja secara maksimal, tenaga kesehatan harus selalu mendapatkan perlindungan dari risiko tertular penyakit.

Referensi

Alvadri, Z. (2015). Hubungan pelaksanaan Tindakan Cuci Tangan Perawat dengan Kejadian Infeksi Rumah Sakit di Rumah Sakit Sumber Waras Grogol. *Jurnal Penelitian Ilmu Keperawatan Universitas Esa Unggul*, pp. 1-4.

Ananingsih, P. D., & Rosa, E. M. (2016). Kepatuhan 5 Momen Hand Hygiene pada Petugas di Klinik Cito Yogyakarta. *Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit*, 5(1), pp. 16-24.

Basuni, Haris., dkk. (2019). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Praktik Perawat Dalam Pelaksanaan Universal Precaution di RSUD Brebes. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, Volume 7, Nomor 2.

Hapsari, A., P., dkk. (2018). Pengetahuan Petugas Surveilans Tentang Identifikasi Healthcare-Associated Infections di Surabaya. *JURNAL BERKALA EPIDEMIOLOGI*, Volume 6 Nomor 2, 130-138.

Mau, Y. A., dkk. (2018). Hubungan Motivasi Perawat dengan Kepatuhan Perawat dalam Penerapan Universal Precaution di RSU Rajawali Citra Yogyakarta. *CARING*, Vol 7, No2, 34- 41.

Nana, Noviana. (2017). Universal Precaution : Pemahaman Tenaga Kesehatan Terhadap Pencegahan HIV/AIDS. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, Vol 8, No 2.

Runtu, L. G., dkk. (2013). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Perawat dalam Penerapan Universal Precautions di RSUP Prof. R. D. Kandou Manado. *JUIPERDO*, Vol 2, No 1.

Satiti, A. B., dkk. (2017). Analisis Penerapan Standart Precautions dalam Pencegahan dan Pengendalian HAIs (Healthcare Associated Infections) di RSUD RAA Soewondo Pati. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-journal)*, Volume 5, Nomor 1.

Siregar, S. D. (2019). Hubungan Pengetahuan Perawat Dengan Penerapan Universal Precaution dalam Tindakan Pemasangan Infus diruang Rawat Inap RSUD. DR. PIRNGADI Kota Medan Tahun 2018. *Jurnal Mutiara Ners*, Volume 2, Nomor 1, 144-149.

Suarnianti. (2017). Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Terhadap Penerapan Standart Precautions Mahasiswa Ners STIKES NANI Hasanuddin di Makassar. *Global Health Science*, Volume 2, Issue 2.

Simamora, R. H. (2019). Pengaruh Penyuluhan Identifikasi Pasien dengan Menggunakan Media Audiovisual terhadap Pengetahuan Pasien Rawat Inap. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 3(1), 342-351.

Simamora, R. H. (2020). Learning of Patient Identification in Patient Safety Programs Through Clinical Preceptor Models. *Medico Legal Update*, 20(3), 553-556.