Estrés, Ansiedad e Insomnio: Asociación de enemigos ocultos que destruyen nuestro equilibrio mental. Reporte de caso.

Constanza Ballesteros Ospina,¹ Rafael Lobelo García²

Corresponding Author: Constanza Ballesteros Ospina, connieb72@gmail.com

¹ CAYRE, Coordinadora de unidad de sueño pediátrica | connieb72@gmail.com

² CAYRE, Director clinica de sueño | ralobelo@gmail.com

Abstract

Paciente de 46 años de edad que acude por cuadro de mas de 10 años de evolución con trastorno de sueño que consiste en dificultad para iniciar y de mantener el sueño. Esto asociado a trastorno de personalidad tipo ansioso. El caso clínico que traigo muestra la asociación entre estrés, ansiedad e insomnio, enemigos ocultos y cómo esta asociación deteriora la calidad de vida e impacta negativamente en el desempeño físico y mental de mi paciente y como con un manejo biorregulador podemos intervenir y cambiar favorablemente su condición de salud generando bienestar, recuperando su autoestima y nivelando su condición bio-psico-social. Durante el caso encontrarán el manejo farmacológico convencional que se le prescribió a la paciente por parte de sus especialistas y los efectos secundarios que estos generaron sin lograr control de la enfermedad y cómo la intervención con medicamentos biorreguladores con un equilibrio entre lo convencional y lo alopático lograron un éxito terapéutico sin efectos indeseables y recuperando su calidad de vida

Keywords: case report, stress, anxiety, insomnia, sleep disorder

Introduction

El insomnio es uno de los síntomas más prevalentes en la población general, estando entre un 25-70% de acuerdo al grupo poblacional evaluado. Es más frecuente en mujeres con una relación 3:1, y se exacerba durante la menopausia. En Colombia, se han documentado estudios donde la prevalencia general está en un 25%, pero llega a ser del 50% en poblaciones mayores de 50 años. El insomnio esporádico o situacional es muy frecuente y llega a estar presente en algún momento en la vida con una probabilidad del 70%. El 6-9% de los pacientes con síntomas de Insomnio, realmente presenta la enfermedad. La ansiedad puede tener una prevalencia entre el 25 al 44%. La asociación entre estrés-ansiedad e insomnio tienen mayor riesgo de presentación con OR 2,97 a 4,60.

Los niveles de estrés se han documentado entre un 30 a 70% de los pacientes evaluados, dependiendo de factores situacionales. La asociación entre insomnio y depresión es muy frecuente, de doble vía, con prevalencia hasta del 50%, con mayor predominio en mujeres y personas mayores de 65 años. En la actualidad hay escasa evidencia de manejo del insomnio con medicina

bioreguladora, hay series de casos descritas con fitoterapia y algunos productos homeopáticos, sin embargo, cada vez es mayor la búsqueda por parte de los pacientes de soluciones no tradicionales, especialmente por los efectos secundarios de los tratamientos.

Timeline

2020-08-16

Paciente que acude a consulta por presentar mal patron de sueño con afectación en su calidad de vida, con historia de multiples medicamentos convencionales sin adecuada respuesta. Se ordena diario de sueño. Se inicia terapia detox, hepeel y traumel.

2020-08-30

Se revisa diario de sueño y se mide escala de calidad de vida la que muestra deterioro importante en la escala mental y fisica. Se añade neurexan y nervoheel.

2020-09-21

Acude a control refiriendo mejoría de la ansiedad con discreta mejoría en calidad de vida y aumento en numero de horas de sueño (4-5h). Refiere mejoría del 40% de sus síntomas iniciales. Se añade mirtazapina media tab en la noche.

2020-10-19

Refiere franca mejoría en la calidad de sueño, en promedio 7 horas, desaparece el cuadro depresivo y de estres, considera que sus síntomas mejoraron en un 90%. Se disminuye mirtazapina a 1/4 de tableta.

2020-11-22

Mantiene buena calidad de sueño, franca mejoría en la calidad de vida y mejoría en el diario de sueño y en la escala SF- 12. Refiere que sus sintomas mejoraron en mas del 98% de sus sintomas iniciales.

Narrative

Se trata de una mujer de 46 años, natural de Cali, casada, con unión matrimonial estable, de profesión médica, Madre de dos hijos adolescentes y que labora en el área administrativa de una prestigiosa empresa de medicina prepagada.

Llega a nuestra consulta por insomnio. Refiere que tiene un cuadro de más de 10 años de evolución en donde presenta periodos intermitentes de cambios en la cantidad y calidad de sueño, en donde no logra dormir más de 3 horas. Los momentos de crisis pueden llegar a durar hasta 6 meses sin lograr mantener el sueño. Siempre ha estado asociado a su nivel de estrés laboral, ya que dirige los proyectos de expansión de una prestigiosa prepagada, en donde el nivel de exigencia es muy elevado. Ha sido valorada y tratada por psiquiatría y psicología, por lo que ha recibido múltiples

tratamientos para el manejo de la ansiedad e insomnio con respuesta parcial y con efectos de letargia y somnolencia en el día. Consulta por una nueva crisis en la que lleva 10 meses, con latencia de sueño de 2 horas, no mantiene el sueño, duerme 2 a 3 horas por noche, no tiene sueño reparador, en el día hay cansancio extremo, sin somnolencia diurna, con alteración en la concentración, cambios en su memoria, llanto frecuente, inestabilidad emocional y desde hace un mes ideas de desesperanza e incluso de no querer vivir, aunque no ha pensado en actos suicidas. Venía recibiendo manejo con sertralina, benzodiazepinas (clonazepam), levomepromacina, quetiapina, duloxetine, con lo que no mejoraba su condición de insomnio, permanecía con letargia lo que afectaba su desempeño laboral, le producía más depresión y estaba entrando en problemas en su relación matrimonial. No tiene antecedentes cardiovasculares, pulmonares ni metabólicos. No hay antecedentes de insomnio en su familia. Niega tabaquismo. Peso adecuado (IMC 23,4 mt²/kg). Es activa laboralmente, se considera una mujer exitosa, líder de grupo laboral, tiene una personalidad ansiosa y está sometida a alta carga de estrés laboral por logros de indicadores.

Características del Sueño

Se acuesta a las 10 pm, latencia de sueño de 1 a 2 horas, se despierta 2 a 3 veces por noche, duerme en promedio 2-3 horas, sueño no reparador, cefalea y embotamiento durante el día, no refiere pesadillas y no hay síntomas de MPP.

Higiene de Sueño

Se acuesta usualmente a la misma hora, ve TV hasta el momento que logra dormirse en la cama, suele trabajar en la noche “eso me cansa y me puede dar sueño”, se da un baño en la noche lo cual la relaja, no toma bebidas estimulantes después de las 3 pm, buen hábito alimentario en la noche, suele ser desordenada a la hora de tomar el almuerzo, y realiza caminatas diarias en la mañana o en la tarde de 40 minutos. Evaluada por psiquiatría durante varios años por trastorno de ansiedad y estrés crónico, depresión asociada al trastorno de insomnio secundario. Buen soporte y acompañamiento familiar. Está sometida a alto nivel de estrés laboral. Medicada con sertralina, clonazepam, duloxetine y le habían iniciado levomepromacina y posteriormente quetiapina.

La paciente en vista de la no mejoría decide suspender estos medicamentos e intentar con valeriana, pasiflora, té relajante. Suspende las consultas por psiquiatría por la sensación de somnolencia diurna con los medicamentos. Consulta por somnología después de haber suspendido la terapia farmacológica convencional. En nuestra evaluación encontramos un claro trastorno de estrés y ansiedad, depresión asociada al insomnio, higiene de sueño deficiente, ideas de minusvalía y de no querer vivir. Paciente con uso crónico de medicamentos citotóxicos y hepatotóxicos con taquifilaxia secundaria a la cronicidad y abuso. Impacto negativo en su calidad de vida en la esfera mental y física. Hay deterioro en su desempeño laboral y su esposo refiere un ambiente agresivo permanente asociado al trastorno de insomnio que viene deteriorando su relación, cambios con disminución de la libido.

Se hace una evaluación utilizando escalas de calidad de vida y medición de somnolencia diurna excesiva y se solicitan laboratorios de inicio. •Escala de somnolencia diurna de Epworth: 6/24 (normal) •Escala de calidad de vida-Cuestionario de salud SF12: Salud Mental: 24%, Salud Física: 50%, Total Score: 34% •Niveles de TSH, T4 libre normales, •Hemograma, PCR, perfil lipídico,

función renal, glicemia normales, Perfil hepático normal, Cortisol: 8 am: 24 mcg/dl, 5 pm: 18 mcg/dl. Niveles de vitamina D: 32 ng/dl.

Enfoque terapeutico: Se interviene generando un ambiente de confianza, tranquilidad y paciencia. No se busca un efecto directo sobre el sueño. Se plantea Detoxificar y Biorregular en primera instancia. Se evitar el uso de medicamentos hipnóticos y benzodicepinas e inmediatamente se trabaja en optimizar higiene de sueño.

El plan terapéutica instaurado fue el siguiente:

Detoxificación: Detox durante 8 semanas: Lymphomyosot, nuxel-homaccord, berberis-homaccord, Adicionamos Hepeel: tabletas 3 veces diarias, Neurexan: tabletas 3 veces diarias, Traumel: tabletas 3 veces diarias, esto durante 8 semanas Control a las 2 semanas: Refiere mantener el trastorno de sueño pero refiere franca mejoría en los niveles de ansiedad y de estrés, se mantiene terapia détox más hepeel, neurexan igual y nervoheel por asociación con depresión. Se realiz nuevo control a las 4 semanas con mejoría notoria en la calidad de vida y ya duerme en promedio 4 horas. Desaparece la depresión, se mantiene la terapia instaurada y se inicia Mirtazapina 1/2 tableta en la noche.

Se realiza control a las 6 semanas: La paciente esta feliz, sin ansiedad ni depresión, duerme en promedio 7 horas, sueño reparador y en total control de su funcionamiento bio-psico-social. Se mantiene la terapia biorreguladora y bajo la dosis de mirtazapina a ¼ de tableta En el control a las 8 semanas completa la terapia détox, se mantiene por 4 semanas la terapia con hepeel, mantengo neurexan y nervoheel. Duerme en promedio 7 horas y hay cambio total en su calidad de vida En la actualidad, repite terapia détox después de 8 semanas de haber terminado la primera terapia, se dio por 6 semanas junto con hepeel. Mantenemos neurexan con periodos de suspensión de un mes (3:1), ya se susepde el nervoheel y no toma mirtazapina. Mantiene 8 horas de sueño de muy buena calidad y esta totalmente activa sin trastorno depresivo ni de ansiedad.

Diagnostics

DATE	TYPE	VALUE	UNIT
2020-08-08	Cholesterol, total	173	mg/dL
2020-08-08	Lymphocytes	30	%
2020-08-08	Triglycerides	82	mg/dL
2020-08-08	TSH (thyroid-stimulating hormone)	3.55	U/mL
2020-08-08	WBC (total white blood cells)	5.6	M/mm ³

2020-08-08	Eosinophils	1	%
2020-08-08	Cholesterol, LDL	89	mg/dL
2020-08-08	Neutrophils	66	%
2020-08-08	T4, free (thyroxine)	1.14	ng/dL
2020-08-08	Cholesterol, HDL	68	mg/dL
2020-08-08	Hb (hemoglobin)	14.3	g/dL
2020-08-08	AST (aspartate aminotransferase)	16	U/L
2020-08-08	Hct (hematocrit)	43.9	%

Perspective

Apreciados doctores: “Ha sido una gran fortuna su presencia en mi vida, hace 8 meses (agosto del 2020) tenia una recaída en sueño, trastorno que padezco desde que termine mi año rural en 1.996 y que lo había manejado con inductores de sueño, medicamentos ansiolíticos e hipnóticos, pero coyunturalmente en el año pasado estaba en el peor de mis escenarios, solo dormía 3-4 horas, estaba totalmente deprimida y con deterioro en mi vida personal, sentimental y sexual. Con la medicación que usted me recetó y que juiciosamente cumplí y que he ido desescalando, estoy durmiendo al rededor de 8 horas entre semana y el fin de semana descanso de corrido hasta las 8 am. Me levanto vital y recuperada, sin sensación de malestar ni cefalea. Mi vida personal y familiar han cambiado sustancialmente, tengo deseos de vivir y de trabajar y mi relación sentimental ha cambiado muy positivamente. Mi esposo los adora, y esta plenamente agradecido con ustedes. Como se los he dicho personal y telefónicamente, mil y mil gracias, bendiciones infinitas por su vocación, conocimiento y su ayuda. Cambiaron mi vida totalmente. Dios los bendiga”

Discussion

Se trata de una paciente joven, con trastorno crónico de personalidad ansiosa, altamente exigente consigo misma y con su entorno con un nivel de estrés elevado que afecta su desempeño social. Se encuentra en la evaluación con un trastorno de sueño: Insomnio secundario, depresión como consecuencia del trastorno de sueño crónico, afectación de su rol social y psicosocial, con impacto negativo en su actividad familiar y laboral además con uso y abuso crónico de medicamentos ansiolíticos, antidepresivos e hipnóticos, con efectos citotóxicos y hepatotóxicos, taquifilaxia por uso crónico de medicamentos para el insomnio. Dado lo anterior se realiza un enfoque terapeutico

diferente realizando un trabajo de regulación por sistemas que finalmente llevara a un equilibrio metabólico, mental y emocional que finalmente controlara el problema de sueño de la paciente. A diferencia de los tratamientos previos recibidos por la paciente este enfoque biorregulador no se concentró en inducir exclusivamente el sueño, sino en modular la respuesta inflamatoria crónica y en buscar un drenaje de la matrix celular. Existe muy poca evidencia de manejo con medicina biorreguladora de pacientes con insomnio sin embargo este caso nos enseña que el trastorno de sueño es una consecuencia del bloqueo metabólico y cómo con una intervención multinivel con medicamentos alopáticos se logra equilibrar la esfera mental, física, emocional y metabólica.

Conclusion

Los trastornos de sueño especialmente el insomnio es muy frecuente en todos los grupos poblacionales. Tiene una relación estrecha con los trastornos de personalidad en especial la ansiedad y depresión que tienen un detonante claro como es el estrés. Cada vez mas los pacientes buscan opciones terapéuticas diferentes de la medicina tradicional en especial por los efectos indeseables como son somnolencia y letargia residual, pérdida del autocontrol y en los casos mas graves sindromes de abstinencia. El inducir directamente el sueño con intervenciones farmacológicas, sin una preparación adecuada del organismo ha llevado a fracasos terapéuticos a través del tiempo. El uso de medicina biorreguladora permite de manera integral modular diferentes sistemas involucrados en la genesis de los trastornos emocionales que finalmente se manifiestan con trastornos de sueño, con la ventaja de ser terapias con mínimos efectos secundarios a pesar de su uso por periodos prolongados. Para este caso pudimos identificar como como en un periodo de 5 meses, con una intervención integral, la paciente mejora de manera importante y lo pudimos medir en el cuestionario de calidad de vida que previo a la intervención los resultados muestran como los porcentajes estaban por debajo del 50% y 5 meses después mejoraron con niveles superiores al 85%. Parte importante del éxito de estas terapias está en la comunicación con el paciente, la confianza que se le brinde y la paciencia en el logro de los resultados.

Acknowledgements

Agradezco a todo mi equipo de trabajo porque me brindaron todo el apoyo para poder tener los resultados que tuvimos con esta paciente, en especial al Dr. Lobelo que con su experiencia, conocimiento y trabajo conjunto logramos sacar adelante este difícil caso de insomnio crónico.

References

1. Medrano-Martínez P Alteraciones cognitivas y emocionales en el insomnio crónico. MJ.Rev Neurol. 16 de febrero de 2016; 62 (4): 170-8.
2. Mallorca. Torrens Prevalencia de insomnio y características de pacientes con insomnio en un area de salud de Mallorca. Aten Primaria. Diciembre de 2019; 51 (10): 617-625. doi: 10.1016 / j.aprim.2018.02.014. Epub 2019 8 de marzo.
- 3 Peñuela-Epalza ME Prevalencia de insomnio en adultos de 18 a 60 años y exposición a campos electromagneticos en hogares de Barranquilla, Colombia. Biomedica. Agosto de 2015; Especificación 35: 120-9.

4 Insomnio. Un problema de salud severo. Sanchez-Cárdenas, Rev Med Inst Mex Seguro Soc.
Noviembre-diciembre de 2016; 54 (6): 760-769

Attachments

ESCALA DE SOMNOLENCIA DE EPWORTH

Por favor conteste con una **X**, que tan probable es que usted se siente somnoliento o se duerma en las siguientes situaciones:

SITUACIÓN	0. Nunca se queda dormido	1. Escasa probabilidad de quedarse dormido	2. Moderada probabilidad de quedarse dormido	3. Alta probabilidad de quedarse dormido
Sentado leyendo			x	
Mirando televisión			x	
Sentado e inactivo en un lugar público	x			
Como pasajero en un carro/bus durante una hora de marcha continua		x		
Acostado, descansando en la tarde	x			
Sentado y conversando con alguien	x			
Sentado, tranquilo, después de un almuerzo sin alcohol		x		
En el carro, mientras se detiene unos minutos en un trancón	x

primera escala de Epworth realizada a la paciente en Agosto del 2020 mostrando un resultado de 6/24

en la columna de acuerdo a la respuesta apropiada por cada pregunta (solo marque una respuesta por pregunta)																		
	excelente	muy buena	buena	regular	mala													
1. En general, usted diría que su salud es:					x													
Su salud actual le limita hacer estas actividades o cosas?	Si, me limita mucho	Si, me limita un poco	No, no me limita nada															
2. Esfuerzos Moderados, como mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de 1 hora.			x															
3. Subir varios pisos por la escalera.	Si, me limita mucho	Si, me limita un poco	No, no me limita nada															
Durante la últimas 04 semanas ¿ha tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física?		x																
4. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer?	Si	No																
5. ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas?	x																	
Durante la últimas 04 semanas ¿ha tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de un problema emocional?	Si	No																
6. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, por algún problema emocional?	x	No																
7. ¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, por algún problema emocional?	x																	
8. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta que punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)?	Nada	Un poco	Regular	Bastante	Mucho													
9. Durante las últimas 4 semanas ¿cuanto tiempo Se sintió calmado y tranquilo?	Siempre	Casi siempre	muchas veces	Algunas veces	Solo alguna vez	Nunca												
10. Tuvo mucha energía?	Siempre	Casi siempre	muchas veces	Algunas veces	Solo alguna vez	Nunca												
11. Se sintió desanimado y triste?	Siempre	Casi siempre	muchas veces	Algunas veces	Solo alguna vez	Nunca												
12. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o familiares)?	Siempre	Casi siempre	x	Algunas veces	Solo alguna vez	Nunca												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>calculate</th> <th>result</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>data complete?</td> <td>Yes</td> </tr> <tr> <td>evaluation appropriate?</td> <td>Yes</td> </tr> <tr> <td>physical health subscore</td> <td>13 out of 20, or 65%</td> </tr> <tr> <td>mental health subscore</td> <td>11 out of 27, or 41%</td> </tr> <tr> <td>total score</td> <td>24 out of 47, or 51%</td> </tr> </tbody> </table>							calculate	result	data complete?	Yes	evaluation appropriate?	Yes	physical health subscore	13 out of 20, or 65%	mental health subscore	11 out of 27, or 41%	total score	24 out of 47, or 51%
calculate	result																	
data complete?	Yes																	
evaluation appropriate?	Yes																	
physical health subscore	13 out of 20, or 65%																	
mental health subscore	11 out of 27, or 41%																	
total score	24 out of 47, or 51%																	

Para la interpretación de este cuestionario de calidad de vida se debe tener en cuenta como línea de base 50 puntos y la mejor o peor percepción de calidad de vida se analiza con una desviación estándar de 10 puntos. Esta escala se le practica a la paciente previo a la intervención con medicina biorreguladora.

MS-FT-043 FORMATO DE DIARIO DE SUEÑO		CODIGO: MS-FT-043 FECHA DE APROBACION: 29/12/2015 VERSION: 001 PAGINA 1 de 1				
PRIMERA SEMANA								
	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	Observaciones primera semana:
HA	10	10:30	11:30	10	10:15	11	11:30	
HL	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:30	
LS	2 horas	2	2	1	2	4.5	2	
ND	2	2	2	2	2	3	2	
TD	1 hora	1 hora	2 horas	2 horas	1:30 horas	2 horas	1 hora	
NS	0	0	0	0	0	0	0	
TS								
CS	Mala	Mala	Mala	Mala	Mala	Mala	Mala	
SEGUNDA SEMANA								
	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	Observaciones segunda semana:
HA	11	11:30	10:30	11				
HL	6:00	6:00	6:00	6:00				
LS	2	2	2	1				
ND	2	2	2	2				
TD	1 hora	1:30 horas	1 hora	2.5 horas				
NS	0	0	0	0				
TS								
CS	Mala	Mala	Mala	Mala				
HA	¿A qué hora se acostó?							
HL	¿A qué hora se levantó en la mañana?							
LS	Tiempo (en minutos) aproximado que tardó en dormirse, una vez que apagó la luz y se dispuso a iniciar su sueño.							
ND	¿Cuántas veces se despertó en la noche?							
TD	¿Cuántas veces se despertó en el día?							
NS	¿Cuántas Siestas tomadas durante el día?							
TS	¿Cuánto tiempo durmió durante las siestas?							
CS	¿Qué tan bien o mal durmió la última noche?							

Primer diario de sueño realizado por la paciente en Agosto de 2020

en la columna de acuerdo a la respuesta que opta por cada pregunta (solo marque una respuesta por pregunta)		acuerdo				discrepancia				total			
		mucho		un poco		mucho		un poco		mucho		un poco	
1. En general, usted diría que su salud es:	Si, me limita mucho												
	Si, me limita un poco												
2. Esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar la aspiradora, pagar a los bancos o cualquier otra de 1 hora.	Si, me limita mucho												
	Si, me limita un poco												
3. Subir varias veces por la escalera.	Si, me limita mucho												
	Si, me limita un poco												
4. ¿Ha tenido alguna de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física?	Si, me limita mucho												
	Si, me limita un poco												
5. ¿Tiene que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas?	Si, me limita mucho												
	Si, me limita un poco												
6. ¿Ha tenido alguna de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de un problema emocional?	Si, me limita mucho												
	Si, me limita un poco												
7. ¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, por algún problema emocional?	Si, me limita mucho												
	Si, me limita un poco												
8. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuántas veces el dolor le ha dificultado su trabajo físico (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)?	Si, me limita mucho												
	Si, me limita un poco												
9. Se sintió cansado y tranquilo?	Si, me limita mucho												
	Si, me limita un poco												
10. Tiene mucha energía?	Si, me limita mucho												
	Si, me limita un poco												
11. Se sintió desanimado y triste?	Si, me limita mucho												
	Si, me limita un poco												
12. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o familiares)?	Si, me limita mucho												
	Si, me limita un poco												
Resumen ¿satisfecho? ☒ Yes ¿satisfecho? ☒ Yes physical health subscore 15 out of 20, or 65% of optimal mental health subscore 25 out of 27, or 90% of optimal total score 43 out of 47, or 85% of optimal													

Segundo cuestionario de calidad de vida posterior a intervención con medicina biorreguladora. Diciembre 2020.

NOVIEMBRE 2020

MS-FT-043 FORMATO DE DIARIO DE SUEÑO

CÓDIGO: MS-FT-043
FECHA DE ATRIBUCIÓN: 25/12/2015
VERSIÓN: 001
PÁGINA: 1 de 1

PRIMERA SEMANA

	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
HA	10:00	10:15	10:00	10:30	10:00	10:30	10:30
HL	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	7:30	8:00
LS	20min	20min	20min	20min	20min	20min	20min
NO	1	1	1	1	1	1	1
TD	20min	20min	20min	20min	20min	20min	20min
NS	1	1	1	1	1	1	1
TS	10min	10min	10min	10min	10min	10min	10min
CS	General	General	General	General	General	General	General

SEGUNDA SEMANA

	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
HA	10:00	10:00	10:30	10:15	10:30	10:30	10:30
HL	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	8:00	8:00
LS	20min	20min	20min	20min	20min	20min	20min
NO	1	1	1	1	1	1	1
TD	20min	20min	20min	20min	20min	20min	20min
NS	1	1	1	1	1	1	1
TS	10min	10min	10min	10min	10min	10min	10min
CS	General	General	General	General	General	General	General

Observaciones primera semana:

Observaciones segunda semana:

Legend:

- HA: Hora de acostarse
- HL: Hora de levantarse de la cama
- LS: Latencia de sueño
- NO: Número de despertares
- TD: Tiempo de despertares
- NS: Número de veces en el día
- TS: Tiempo de la siesta
- CS: Calidad del sueño

¿A qué hora se acostó?

¿A qué hora se levantó en la mañana?

¿Cuánto tiempo aproximadamente fue tarde en dormirse, una vez que se apagó la luz y se dispuso a iniciar su sueño?

¿Cuántas veces se despertó en la noche?

¿Cuánto tiempo aproximado en minutos, en el día estuvo despierto una vez que inició su sueño?

¿Cuánto tiempo duró durante las siestas?

¿Qué tan bien o mal durmió la última noche?

Diario de sueño posterior a intervención con medicina biorreguladora, Noviembre 2020